

HOVID BETASONE CREAM

Betamethasone-17 Valerate (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid Betasone Cream.
2. Bagaimana Hovid Betasone Cream berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Hovid Betasone Cream.
4. Cara menggunakan Hovid Betasone Cream.
5. Semasa menggunakan Hovid Betasone Cream.
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Betasone Cream.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hovid Betasone Cream

Hovid Betasone Cream digunakan untuk merawat pelbagai jenis keradangan kulit seperti psoriasis, ekzema dan alahan.

Bagaimana Hovid Betasone Cream berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah Betamethasone-17 Valerate iaitu sejenis kortikosteroid (steroid). Kortikosteroid topikal digunakan untuk membantu mengurangkan keradangan di kawasan yang terjejas dan membantu mengurangkan kemerahan dan kegatalan yang disebabkan oleh penyakit kulit.

Sebelum menggunakan Hovid Betasone Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika anda alah terhadap betamethasone atau sebarang bahan kandungannya yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

- Sebelum menggunakan Hovid Betasone Cream

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai jangkitan di kawasan rawatan atau jangkitan tuberkulosis pada kulit.

Mengandung dan penyusuan

Penggunaan berlebihan atau berpanjangan semasa mengandung tidak digalakkan.

Tidak diketahui sama ada penggunaan kortikosteroid pada kulit boleh diserap ke dalam darah dan menghasilkan kuantiti yang boleh dikesan dalam susu ibu.

Oleh itu, berhati-hati apabila kortikosteroid topikal digunakan oleh ibu yang menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja, biasanya kurang mempengaruhi kesan ubat-ubat lain. Walau bagaimanapun, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jikalau anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Hovid Betasone Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Penggunaan topikal.
Sapukan lapisan nipis pada kawasan kulit yang terjejas.

- Bila perlu digunakan

Dewasa : Sapu satu hingga tiga kali sehari
Kanak- : Sapukan satu kali sehari.
Kanak

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Hubungi doktor atau ahli farmasi sekiranya anak anda masih menggunakan ubat ini melebihi 2 minggu.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda sapukan Hovid Betasone Cream dalam kuantiti yang banyak atau tertelan dalam kuantiti yang banyak, ia boleh menyebabkan anda tidak sihat.

Jika anda tertelan Hovid Betasone Cream, bilaskan mulut anda dengan air yang banyak dan hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk dapatkan nasihat.

Gejala dos berlebihan seperti:

Penipisan kulit, jangkitan lain, rasa terbakar, gatal-gatal, kerengsaan, kekeringan, keradangan pada folikel rambut, peningkatan pertumbuhan bulu, jerawat dan pigmentasi.

Semasa menggunakan Hovid Betasone Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna Hovid Betasone Cream mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovid Betasone Cream.

HOVID BETASONE CREAM

Betamethasone-17 Valerate (0.1% w/w)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Hovid Betasone Cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Hindari daripada terkena mata.

Tidak boleh disapukan pada permukaan ulser kaki.

Jangan membalut kawasan kulit yang dirawat melainkan diarahkan berbuat demikian oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, iritasi atau jangkitan, rujuk doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovid Betasone Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Antara kesan-kesan sampingan yang telah dilaporkan adalah seperti risiko terkena jangkitan; penggunaan dalam jangka waktu lama boleh menyebabkan terjadinya muka menjadi bengkak, glaucoma (peningkatan tekanan dalam mata), kulit menipis dan mudah lebam, peningkatan pertumbuhan bulu, keguguran rambut, garis ungu kemerahan pada lengan, kaki, badan atau pangkal paha.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web

npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Betasone Cream

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

15g : Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

500g : Simpan di bawah suhu 25°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih, legap.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Betamethasone (as 17-valerate)
0.1% w/w

- Bahan tidak aktif
 - Liquid Paraffin
 - Cetomacrogol Emulsifying Wax
 - White Soft Paraffin
 - Chlorocresol
 - Polyethylene Glycol 4000
 - Purified Water

- Nombor MAL

MAL19860148AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010, Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

06/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)040324/00026