

NEO BETASONE CREAM

(Betamethasone (sebagai 17-valerate) 0.1% w/w, Neomycin (sebagai Sulphate) 0.5% w/w/)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan krim Neo Betasone
2. Bagaimana krim Neo Betasone berfungsi
3. Sebelum menggunakan krim Neo Betasone
4. Cara menggunakan krim Neo Betasone
5. Semasa menggunakan krim Neo Betasone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan krim Neo Betasone
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah Kegunaan Neo Betasone

Krim Neo Betasone berguna dalam merawat jangkitan keradangan kulit akut atau kronik seperti:

- Dermatitis lokal (kulit gatal)
- Psoriasis (kulit timbul, merah, bersisik)
- Dermatitis atopik atau seborrhoeic (kulit kering, ruam gatal)
- Keradangan xerosis (kulit kering)
- Pruritus di kawasan alat kemaluan (kegatalan akut atau kronik, yang menjejaskan kawasan kemaluan)
- Discoid lupus erythematosus (Ruam bersisik yang berulang)
- Lichen planus (kulit gatal yang kronik dari sumber yang tidak diketahui)
- Granuloma annulare (kulit timbul kemerahan atau berwarna kulit dalam bentuk cincin)
- Psoriatic plaques (kulit kering, timbul dan merah)
- Jangkitan kulit yang disebabkan oleh alahan dan alahan yang gatal

Bagaimana Neo Betasone berfungsi

Krim ini mengandungi kortikosteroid topikal. Kortikosteroid topikal digunakan

untuk membantu mengurangkan keradangan di kawasan yang terjejas dan membantu mengurangkan kemerahan dan gatal disebabkan oleh penyakit kulit. Ia juga mengandungi bahan lain untuk membantu mencegah dan merawat jangkitan bakteria pada kulit.

Sebelum Menggunakan Neo Betasone

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika anda alah kepada kortikosteroid, neomycin atau mana-mana bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini seperti yang disenaraikan pada akhir risalah ini. Jangan gunakan pada luka dalam, luka terbakar yang serius kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini.

Sebelum menggunakan Neo Betasone

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada betamethasone, neomycin atau mana-mana bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini seperti yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan guna Neo Betasone jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung sebelum berbincang dengan doktor anda dahulu.

Jangan guna Neo Betasone jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Terapi topikal berterusan untuk jangka panjang harus dielakkan jika boleh terutamanya di kalangan kanak-kanak, walaupun tanpa balutan.

Jangan balut kawasan kulit yang dirawat kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuklah semua ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, supermarket, atau kedai makanan kesihatan lain.

Cara Menggunakan Neo Betasone

Sentiasa menggunakan ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menasihati anda berapa banyak yang perlu digunakan setiap hari, dan untuk berapa lama anda perlu menggunakan.

Kuantiti kecil disapukan dengan nipis di kawasan yang terjejas. Dewasa: Satu hingga tiga kali sehari. Kanak-kanak : Sekali sehari.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa menggunakan

Ikut arahan label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Gunakan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan guna ubat itu pada masa yang dijadualkan seterusnya. Jangan mengambil ubat tambahan untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan-kesan sampingan yang tidak diinginkan.

NEO BETASONE CREAM

(Betamethasone (sebagai 17-valerate) 0.1% w/w, Neomycin (sebagai Sulphate) 0.5% w/w/)

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda fikir anda telah menggunakan terlalu banyak ubat ini.

Oleh kerana ia adalah ubat topikal, pengambilan yang berlebihan hanya berlaku dengan penggunaan yang berpanjangan dengan gejala-gejala seperti perubahan atropik kulit, perasaan kulit membakar, gatal-gatal, kekeringan, jerawat dan pigmentasi. Rawatan termasuk pengeluaran perlahan penyediaan dan rawatan simptomatik dimulakan.. Rawatan termasuk pengeluaran beransuran penyediaan dan rawatan simptomatik dimulakan.

Jika anda secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak Neo Betasone, lap ubat yang berlebihan.

Semasa Menggunakan Neo Betasone

Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat ini pada jangka masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Ubat ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja.
- Beritahu doktor dan ahli farmasi anda jika anda alah kepada betamethasone, neomycin dan bahan lain dalam ubat ini.
- Beritahu doktor anda dan ahli farmasi apa ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi yang anda ambil.
- Sentiasa bersihkan tangan anda sebelum dan selepas menggunakan ubat ini.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Neo Betasone.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Elakkan ubat ini daripada masuk ke dalam mata anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berkongsi Neo Betasone dengan orang lain, walaupun tanda-tanda mereka kelihatan serupa dengan anda. Jangan menggunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor atau ahli farmasi memberitahu anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kerengsaan, pemekaan atau reaksi alahan berlaku, berhenti menggunakannya dan beritahu doktor anda.

Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau sedang menyusukan bayi, jangan gunakan ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Neo Betasone boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Neo Betasone biasanya diterima baik, tetapi jika tanda-tanda hipersensitiviti muncul, penggunaan hendaklah dihentikan serta merta.

Penggunaan yang berpanjangan dan intensif boleh menyebabkan muka bulan ('moon face'), glaukoma, penipisan kulit dan mudah lebam, peningkatan dalam pertumbuhan rambut, kehilangan rambut, garis ungu kemerahan di tangan, kaki, dan paha.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku di sesetengah pesakit. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda mungkin ada.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan

melalui laman web nprra.gov.my (Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Neo Betasone

Penyimpanan

Simpan semua ubat daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang diterterakan pada pek bungkusan.

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Krim legap putih.

Bahan bahan kandungan

Bahan Aktif

Betamethasone (as 17-valerate):

0.1% w/w

Neomycin (as *Sulphate*): 0.5% w/w

Bahan Tidak Aktif

Cetomacrogol Emulsifying Wax

Vaseline

Liquid Paraffin

Polyethylene Glycol 4000

Chlorocresol

Nombor MAL

MAL19860244A

NEO BETASONE CREAM

(Betamethasone (sebagai 17-valerate) 0.1% w/w, Neomycin (sebagai Sulphate) 0.5% w/w/)

Pengilang/ Pemegang Pendaftaran

Produk

Hovid Bhd., 121, Jalan Tunku Abdul
Rahman (Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

07/08/2020

Nombor siri

NPRA(R2/2)200519/441