

DIABETMIN

Diabetmin 250 mg Tablet, Diabetmin 500 mg Tablet, Diabetmin Retard Tablet, Diabetmin 850 mg Tablet, Diabetmin XR 500 mg Tablet, Diabetmin 1000mg Tablet

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Diabetmin
2. Bagaimana Diabetmin berfungsi
3. Sebelum mengambil Diabetmin
4. Cara menggunakan Diabetmin
5. Semasa menggunakan Diabetmin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Diabetmin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Kelulusan Pemasaran
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Diabetmin

Digunakan untuk merawat penyakit kencing manis jenis 2 atau dikenali sebagai 'non-insulin dependent diabetes mellitus' (NIDDM) bagi dewasa di mana kepekatan gula dalam darahnya tidak dapat dikawal melalui senaman atau dengan mengawal pengambilan makanan.

Bagaimana Diabetmin berfungsi

Ubat ini adalah biguanida yang mengurangkan kandungan gula dalam darah yang tinggi dalam badan. Ia berfungsi dengan:

- mengurangkan kandungan gula dalam darah yang dihasilkan oleh hati
- meningkatkan sensitiviti badan terhadap insulin dan cara badan menggunakan insulin
- memperlahankan kadar penyerapan glukosa ke dalam usus.

Sebelum mengambil Diabetmin

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- Jika anda mengalami penurunan fungsi buah pinggang dengan teruk.
- Jika anda menghidapi asidosis laktik [asid laktik terlalu banyak dalam darah (lihat "Risiko asidosis laktik" di bawah)] atau ketoasidosis. Ketoasidosis adalah keadaan di mana bahan yang dipanggil 'badan keton' terkumpul di dalam darah dan boleh menyebabkan pra-koma diabetik. Gejala asidosis mungkin termasuk sakit perut, pernafasan yang tidak normal dan mengantuk (jika teruk).

-Sebelum mula mengambil

Risiko asidosis laktik

Diabetmin boleh menyebabkan kesan sampingan yang jarang berlaku, tetapi sangat serius yang dipanggil asidosis laktik, terutamanya jika buah pinggang anda tidak berfungsi dengan baik. Risiko mendapat asidosis laktik juga meningkat dengan diabetes yang tidak terkawal, jangkitan serius, puasa berpanjangan atau pengambilan alkohol, dehidrasi, masalah hati dan sebarang keadaan perubatan di mana bahagian badan mengalami kekurangan bekalan oksigen (seperti penyakit jantung akut yang teruk). Jika mana-mana perkara di atas berlaku kepada anda, berbincang dengan doktor anda untuk mendapatkan arahan lanjut. Berhenti mengambil Diabetmin untuk masa yang singkat jika anda mempunyai keadaan yang mungkin dikaitkan dengan

dehidrasi (kehilangan cecair badan yang ketara) seperti muntah yang teruk, cirit-birit, demam, terdedah kepada haba atau jika anda minum kurang cecair daripada biasa. Bercakap dengan doktor anda untuk arahan lanjut.

Berhenti mengambil Diabetmin dan hubungi doktor atau hospital terdekat dengan segera jika anda mengalami beberapa simptom asidosis laktik, kerana keadaan ini boleh menyebabkan koma.

Gejala asidosis laktik termasuk:

- muntah
- sakit perut (sakit perut)
- kekejangan otot
- perasaan umum tidak sihat dengan keletihan yang teruk
- kesukaran bernafas

Asidosis laktik adalah kecemasan perubatan dan mesti dirawat di hospital.

Semasa rawatan dengan Diabetmin, doktor anda akan memeriksa fungsi buah pinggang anda sekurang-kurangnya sekali setahun atau lebih kerap jika anda sudah tua dan/atau jika anda mengalami fungsi buah pinggang yang semakin teruk.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi. Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi metformin hidroklorida. Ia termasuk:

- pengambilan alkohol yang akut atau kronik

DIABETMIN

Diabetmin 250 mg Tablet, Diabetmin 500 mg Tablet, Diabetmin Retard Tablet, Diabetmin 850 mg Tablet, Diabetmin XR 500 mg Tablet, Diabetmin 1000mg Tablet

- cimetidine atau ubat kationik lain yang dikumuh daripada tiub renal.
- furosemide
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan hiperglisemia dan hipoglisemia. Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang keseimbangan lain.

Cara menggunakan Diabetmin

-Berapa banyak harus diambil Dewasa

- Diabetmin 250 mg Tablet: Ambil 2 tablet, 2 hingga 3 kali sehari
- Diabetmin 500 mg Tablet: Ambil 1 tablet, 2 hingga 3 kali sehari
- Diabetmin Retard Tablet: Ambil 1 tablet, 2 kali sehari
- Diabetmin 850 mg Tablet: Ambil 1 tablet, 2 kali sehari
- Diabetmin XR 500 mg Tablet: Ambil 1 tablet sekali sehari – tidak melebihi 4 tablet sehari.
- Diabetmin 1000 mg Tablet: Ambil 1 tablet, 1 kali sehari

Diabetmin tidak disyorkan untuk kanak-kanak. Dos untuk orang tua akan diubahsuai berdasarkan fungsi buah pinggang dan kebarangkalian fungsi buah pinggang akan merosot. Telan tablet dengan meminum segelas air.

-Bila perlu digunakan

- Ambil: Diabetmin 250 mg Tablet dengan makanan
- Diabetmin 500 mg Tablet dengan atau tanpa makanan
 - Diabetmin Retard Tablet dengan atau tanpa makanan

- Diabetmin 850 mg Tablet dengan atau tanpa makanan
- Diabetmin XR 500 mg Tablet dengan makan malam anda.
- Diabetmin 1000 mg Tablet dengan atau tanpa makanan

-Berapa lama perlu diambil

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini seperti yang telah ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas. Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan segera sekiranya anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan. Anda mungkin mengalami tanda-tanda seperti berikut:

- kandungan gula dalam darah rendah
- asidosis laktik (tanda-tanda termasuk rasa mengantuk, sangat letih, rasa sakit, muntah, mengalami kesusahan untuk bernafas dan mengalami sakit sendi, sakit perut atau cirit-birit).

Semasa menggunakan Diabetmin

-Perkara yang perlu dilakukan

Kenal pasti tanda-tanda kandungan gula dalam darah yang rendah (hipoglikemia) dan kandungan gula dalam darah yang tinggi (hiperglikemia). Tanda-tanda awal hipoglikemia:

- lemah, menggeletar atau menggigil
- berpeluh

- pening, sakit kepala atau kurang tumpuan
- cepat marah atau menangis
- kelaparan
- sekitar kawasan bibir dan lidah menjadi kebas.

Ini mungkin akan membawa kepada:

- hilang koordinasi
 - pertuturan tidak jelas
 - kekeliruan
 - sawan atau hilang kesedaran.
- Tanda-tanda hiperglikemia:
- kerap membuang air kecil
 - rasa dahaga yang meningkat
 - selalu terasa lapar.

Beritahu doktor jika:

- anda jatuh sakit
- anda telah ternyahhidrat
- anda terluka
- anda demam atau mengalami jangkitan yang serius seperti demam selesema, jangkitan pada salur pernafasan, atau jangkitan saluran kencing
- anda akan menjalani pembedahan yang major.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda
- ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi
- berhenti dari mengambil ubat ini atau menukar dos yang telah ditetapkan dengan sesuka hati tanpa merujuk kepada doktor
- mengambil ubat ini tanpa makanan.

DIABETMIN

Diabetmin 250 mg Tablet, Diabetmin 500 mg Tablet, Diabetmin Retard Tablet, Diabetmin 850 mg Tablet, Diabetmin XR 500 mg Tablet, Diabetmin 1000mg Tablet

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati supaya tidak membiarkan paras gula dalam darah anda turun terlalu rendah apabila melakukan aktiviti-aktiviti seperti memandu dan mengendalikan mesin. Minuman beralkohol akan menyebabkan keadaan bertambah teruk. Berhati-hati akan pengambilannya.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang):

- Penurunan atau tahap vitamin B12 rendah dalam darah (gejala mungkin termasuk keletihan yang melampau (keletihan), lidah sakit dan merah (glossitis), pin dan jarum (paraesthesia) atau kulit pucat). Doktor anda mungkin membuat beberapa ujian untuk mengetahui punca gejala anda kerana sesetengah daripada ini mungkin juga disebabkan oleh diabetes atau disebabkan oleh masalah kesihatan lain yang tidak berkaitan.

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja. Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut Ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan yang sangat umum

- kesan buruk daripada gastrousus termasuk anoreksia, cirit-birit, dyspepsia, perut kembung, loya, muntah

- sakit kepala
- rasa kelogaman
- hilang berat badan
- anemia
- megaloblastik
- hipoglisemia
- asidosis laktik
- penurunan penyerapan vitamin B₁₂ dengan penurunan paras serum.

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Cara penyimpanan dan pelupusan Diabetmin

-Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Jauhkan dari cahaya dan kelembapan.

Simpan:

- Diabetmin 250 mg Tablet di bawah 30°C.
- Diabetmin 500 mg Tablet di bawah 25°C.
- Diabetmin XR 500 mg Tablet di bawah 30°C.
- Diabetmin Retard Tablet di bawah 25°C.
- Diabetmin 850 mg Tablet di bawah 25°C.
- Diabetmin 1000 mg Tablet di bawah 30°C.

-Pelupusan

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Diabetmin 250 mg Tablet:

Bulat, tablet putih yang disaluti filem, berpinggir serong, cembung dangkal dan goresan pada satu permukaan.

Diabetmin 500 mg Tablet :

Bulat, tablet putih bersaluti filem, berpinggir serong dengan cembung dangkal yang cetek.

Diabetmin Retard Tablet:

Bulat, tablet putih tanpa salutan filem dengan permukaan cembung.

Diabetmin 850 mg Tablet:

Bulat, tablet putih bersaluti filem dengan cembung dangkal yang dalam, dan cetakan timbul 'hovid' pada satu permukaan.

Diabetmin XR 500 mg Tablet:

Bujur, tablet putih tanpa salutan filem dengan cembung dangkal yang dalam dan cetakan timbul 'HD' pada satu permukaan.

Diabetmin 1000 mg Tablet:

Tablet bujur, bersalut filem putih, muka cembung dalam, berskor dalam dan "HD" timbul pada satu muka dan menjaringkan pada muka yang lain.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Setiap:

- **Diabetmin 250 mg Tablet** mengandungi 250 mg Metformin Hidroklorida

- **Diabetmin 500 mg Tablet** mengandungi 500 mg Metformin Hidroklorida

- **Diabetmin Retard Tablet** mengandungi 850 mg Metformin Hidroklorida (extended release)

- **Diabetmin 850 mg Tablet** mengandungi 850 mg Metformin Hidroklorida

- **Diabetmin XR 500 mg Tablet:**

mengandungi 500 mg Metformin Hidroklorida (extended release).

DIABETMIN

Diabetmin 250 mg Tablet, Diabetmin 500 mg Tablet, Diabetmin Retard Tablet, Diabetmin 850 mg Tablet, Diabetmin XR 500 mg Tablet, Diabetmin 1000mg Tablet

• **Diabetmin 1000 mg Tablet:**
mengandungi 1000 mg
Metformin Hidroklorida.

Pregelatinised Starch,
Isopropyl Alcohol (Ipa),
Kollidon K-30,
Microcrystalline Cellulose.

Bahan Tidak Aktif

• **Diabetmin 250 mg Tablet:**
Polyvinylpyrrolidone K-30,
Microcrystalline Cellulose,
Pregelatinised Starch,
Sodium Starch Glycolate,
Magnesium Stearate,
Hydropropyl Methylcellulose E-5,
Hydropropyl Methylcellulose E-15,
Isopropyl Alcohol (IPA),
Polyethylene Glycol 4000,
Purified Water.

-Nombor MAL:
MAL05051079A

Diabetmin XR 500 mg Tablet:
Hydropropyl Methylcellulose –
Methocel K100M CR,
Copovidone,
Carboxymethylcellulose
Sodium, Microcrystalline
Cellulose, Colloidal Silicon
Dioxide, Magnesium Stearate.

-Nombor MAL:
MAL11125006A

-Nombor MAL:
MAL11115018A

Diabetmin 500 mg Tablet:
Microcrystalline Cellulose
pH101, Hydropropyl
Methylcellulose E-5,
Hydropropyl Methylcellulose E-15,
Polyvinylpyrrolidone,
Pregelatinised Cornstarch,
Magnesium Stearate,
Sodium Starch Glycolate,
Isopropyl Alcohol,
Polyethylene Glycol 4000.

Diabetmin 1000 mg Tablet:

Polyvinylpyrrolidone
Microcrystalline Cellulose
Pregelatinised Starch
Microcrystalline Cellulose
Sodium Starch Glycolate
Magnesium Stearate
Hydroxypropyl Methylcellulose
Polyethylene Glycol
Purified Water

-Nombor MAL:
MAL19860193A

-Nombor MAL:
MAL13115199AZ

Diabetmin Retard Tablet:
Hydropropyl Methylcellulose,
Magnesium Stearate,
Colloidal Silicon Dioxide.

**Pemegang Kelulusan
Pemasaran**
HOVID Berhad
121, Jalan Tunku Abdul
Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

-Nombor MAL:
MAL19987376A

Pengilang
HOVID Berhad
Lot 56442, 7 1/2 Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Malaysia.

**Diabetmin 850mg Film-coated
Tablet**
Hydroxypropyl Methylcellulose
E15, Hydroxypropyl
Methylcellulose E5,
Magnesium Stearate,
Polyethylene Glycol 4000,
Sodium Starch Glycolate,

Tarikh kemaskini RIMUP
07/08/2024