

CLOXACAP CAPSULE

Cloxacillin Sodium (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cloxacap
2. Bagaimana Cloxacap berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cloxacap
4. Cara menggunakan Cloxacap
5. Semasa menggunakan Cloxacap
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cloxacap
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Cloxacap

Cloxacap digunakan untuk rawatan:

- Jangkitan yang disebabkan oleh staphylococci penghasil penisilinase
- Jangkitan saluran pernafasan
- Jangkitan kulit dan tisu lembut
- Jangkitan tersebar yang disebabkan oleh pneumococci, streptococci beta-hemolitik kumpulan A, dan staphylococci yang tahan terhadap penisilin G serta staphylococci yang sensitif terhadap penisilin G

Bagaimana Cloxacap berfungsi

Cloxacap Capsule merupakan sejenis antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai penisilin. Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Cloxacap

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini sekiranya:

- anda mempunyai alahan terhadap *cloxacillin sodium*, penisilin atau mana-mana bahan lain ubat ini (tersenarai di bahagian Maklumat Lanjut)

- Sebelum menggunakan Cloxacap

Jika anda mengalami keadaan-keadaan yang berikut:

- sejarah alahan seperti asma, ekzema, demam alergi dan gatal-gatal
- sejarah gangguan pendarahan
- sejarah masalah penghadaman
- demam akibat jangkitan virus
- reaksi hipersensitiviti terhadap

antibiotik yang lain seperti *cephalosporin*, *carbapenem* atau ubat kumpulan *beta-lactam*.

- masalah buah pinggang yang teruk.

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan sebelum mengambil ubat ini. *Cloxacillin* dirembeskan ke dalam susu ibu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- aspirin (ubat bagi mengurangkan sakit, demam dan keradangan)
- antibiotik yang lain seperti *sulphamethoxypyridazine*, *sulphathiazole*, *aminoglycoside*, *tetracycline*, *erythromycin* dan *polymyxin B-sulphate*

Cara menggunakan Cloxacap

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos bagi orang dewasa: 250-500 mg

Kanak-kanak yang mempunyai berat badan sehingga 20 kg: 12.5 hingga 25 mg bagi setiap kg berat badan

Kanak-kanak yang mempunyai berat 20kg atau lebih: gunakan dos bagi orang dewasa

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini setiap 6 jam setiap hari atau seperti arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Cloxacap Capsule bagi tempoh yang ditetapkan oleh doktor

anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan anda mengalami masalah pemakanan, muntah, ketidakselesaan di bahagian perut dan cirit-birit.

Semasa menggunakan Cloxacap

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Cloxacap.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Ambil Cloxacap Capsule hanya dengan preskripsi doktor.

Teruskan penggunaan ubat untuk tempoh yang ditetapkan walaupun anda telah sembuh. Jika jangkitan anda menjadi lebih teruk atau keadaan anda tidak bertambah baik dalam masa beberapa hari atau jangkitan baharu berlaku, berjumpa dengan doktor anda.

CLOXACAP CAPSULE

Cloxacillin Sodium (250mg, 500mg)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Cloxacap kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Berhati-hati sekiranya anda memandu atau sedang mengendalikan mesin sehingga anda tahu kesan-kesan pengambilan Cloxacap Capsule terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Cloxacap Capsule mungkin mengakibatkan kesan sampingan berikut walaupun tidak semua mendapatkannya:

- tidak balas pendarahan, yang mungkin menyebabkan sakit tekak dan demam terutama dengan dos yang tinggi dan kegagalan fungsi platlet yang menyebabkan pendarahan atau lebam.
- Demam, ruam, kemungkinan kekurangan kencing, protein dalam air kencing dan kencing berdarah.

Kesan sampingan yang paling kerap berlaku cirit-birit, mual dan muntah.

Jika sebarang reaksi alahan berlaku, penggunaan Cloxacap perlu diberhentikan secepatnya dan sila dapatkan rawatan.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi lebih serius, atau jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my
[Consumers→ Reporting Side Effects

to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Cloxacap

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cloxacap 250mg Capsule:
Kapsul berwarna kelabu dan jingga dengan “HD” dicetak di sebelah kapsul dan “CX 250” dicetak disebelah kapsul yang lain.

Cloxacap 500mg Capsule:
Kapsul berwarna jingga dan hitam dengan “HD” dicetak di sebelah kapsul dan “CX500” dicetak disebelah kapsul yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Cloxacillin Sodium

Bahan tidak aktif:

Cloxacap 250 mg Capsule:

Magnesium Stearate

Polyvinylpyrrolidone

Cloxacap 500 mg Capsule:

Magnesium Stearate

Talc

- Nombor MAL

Cloxacap 250 mg Capsule:
MAL19880037AZ

Cloxacap 500 mg Capsule:
MAL19950051AZ

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk
HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/08/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)300922/00081