

TINAZOL CREAM 2%

Miconazole nitrate (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Tinazol
2. Bagaimana Tinazol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Tinazol
4. Cara menggunakan Tinazol
5. Semasa menggunakan Tinazol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tinazol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Tinazol

Tinazol Cream mengandungi ubat yang dipanggil *Miconazole*. Ini tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai "antifungus".

Tinazol Cream digunakan untuk merawat jangkitan kulat termasuk yis dan sesetengah bakteria pada kulit dan kuku. Jangkitan akan terjadi pada :

- tangan atau kaki
- kulit kepala atau luar telinga
- pangkal paha

Tinazol berfungsi dengan memusnahkan kulat-kulat yang menyebabkan jangkitan dan sesetengah bakteria pada tempat jangkitan.

Bagaimana Tinazol berfungsi

Miconazole bertindak sebagai anti-kulat dengan mengubah penyerapan membran sel yang akan menyebabkan membran sel tidak dapat berfungsi sebagai penghalang selektif. Terdapat sedikit penyerapan sistemik apabila *miconazole* disapukan.

Sebelum menggunakan Tinazol

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda tahu bahawa anda mempunyai alahan terhadap *miconazole* atau ramuan-ramuan lain Krim Tinazol.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput atau jika bungkusan rosak.

Kehamilan dan penyusuan

Peringatan. Ubat ini boleh diambil semasa mengandung dan menyusukan bayi.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau pegawai farmasi sekiranya anda:

- alah kepada mana-mana bahan dalam ubat ini.
- sedang dalam rawatan menggunakan warfarin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Tinazol

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak

Tinea pedis, *Tinea cruris* (jangkitan kulat yang menjejaskan kulit kemaluan, paha dalaman dan punggung), *Tinea corporis*, *cutaneous candidiasis* (jangkitan kulat yang disebabkan oleh yis)

Digunakan secara topikal/disapu pada kulit, satu atau dua kali sehari selama 2 hingga 4 minggu.

Tinea versicolor (bintik-bintik putih pada kulit)

Topikal/disapu pada kulit, sekali sehari.

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor dan pegawai farmasi kepada anda dengan berhati-hati. Arahan doktor dan pegawai farmasi mungkin berbeza daripada maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, minta bantuan daripada doktor atau pegawai farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk terus menggunakan ubat ini selagi diberitahu oleh doktor anda untuk berhenti.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau pegawai farmasi anda mengenai apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Jika anda terlupa, untuk menggunakan krim anda pada sesetengah masa, gunakan krim anda dengan segera. Abaikan dos yang terlupa sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya. Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda mengambil terlalu banyak, ubat ini boleh menyebabkan kerengsaan membran, tiada selera makan, loya, muntah-muntah dan cirit-birit.

Semasa menggunakan Tinazol

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari sepertimana yang telah disarankan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Krim Tinazol.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat melainkan diberitahu oleh doktor anda

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Krim Tinazol kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda

Elakkan daripada terkena mata.

Jangan sapu terlalu pada kain *occlusive* kecuali diarahkan berbuat demikian oleh doktor anda.

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah usia 2 tahun kecuali di bawah nasihat dan pengawasan doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin.

Krim Tinazol tidak akan menjejaskan semasa memandu atau menggunakan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan kerengsaan biasa dan sesekali pemekaan boleh berlaku pada tempat yang disapukan ubat.

Beritahu doktor anda dengan cepat jika anda mengalami kesan sampingan selain daripada yang tersenarai.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) and Vaccine (AEFI))

Cara penyimpanan dan pelupusan Tinazol

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air kumbahan atau sisa buangan isi rumah. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih yang berkilau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Miconazole Nitrate 2% w/w

- Bahan Tidak Aktif

Chlorocresol

Vaseline

Polyethylene Glycol 8000

Liquid paraffin

Deionised water

Cetomacrogol Emulsifying Wax

- Nombor MAL

MAL19900252AZ

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan

Kuala Kangsar),

30010 Ipoh, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan

Kuala Kangsar),

30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/06/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/1)220719/00204