

DOXYCAP CAPSULE

Doxycycline (100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Doxycap
2. Bagaimana Doxycap berfungsi
3. Sebelum menggunakan Doxycap
4. Cara menggunakan Doxycap
5. Semasa menggunakan Doxycap
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Doxycap
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Doxycap

Digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan yang disebabkan oleh bakteria dalam sistem pernafasan, sistem gastrousus, saluran dan pundi kencing (termasuk jangkitan kelamin), kulit, mulut dan juga jangkitan dalam badan.

Tambahan, ia juga digunakan untuk merawat sesetengah jangkitan parasit.

Bagaimana Doxycap berfungsi

Ubat ini mengandungi doxycycline hydrochloride sebagai bahan aktif. Doxycycline tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai antibiotik tetracycline, yang berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Doxycap

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap doxycycline atau antibiotik tetracycline lain atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, bincanglah dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula mengambil

Penggunaan tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah umur 8 tahun kerana Doxycap mungkin menyebabkan perubahan warna gigi, kecacatan enamel dan memberi kesan terhadap pertumbuhan. Bincang dengan doktor anda atau ahli farmasi anda sebelum

mengambil Doxycap, jika anda mempunyai sebarang masalah seperti berikut.

- Masalah hati yang serius atau sedang menggunakan ubat yang mungkin menjejaskan fungsi hati
- Masalah buah pinggang
- Jika anda mengalami/ pernah mengalami cirit-birit selepas rawatan antibiotik
- Jika anda menghidapi *myasthenia gravis* (penyakit kelemahan otot)
- Jika anda menghidapi *systemic lupus erythematosus* (penyakit autoimun)

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Doxycap harus dielakkan selepas separuh tempoh kehamilan (20 minggu ke atas) kerana doxycycline mungkin menjejaskan bayi anda.

Doxycycline akan dirembes ke dalam susu ibu. Justeru, ia tidak disyorkan semasa menyusu kerana ia mungkin menyebabkan perubahan warna gigi atau membantutkan pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi yang menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi Doxycap.

Antaranya adalah:

- Warfarin atau ubat cair darah yang lain
- Penisilin (untuk merawat jangkitan bakteria)
- antasid atau mana-mana produk yang mengandungi aluminium, kalsium, magnesium atau zat besi atau garam bismuth

- Barbiturates, carbamazepine, phenytoin (digunakan untuk rawatan sawan)
- Methoxyflurane (ubat bius)
- Ciclosporin (digunakan untuk mencegah penolakan selepas pemindahan organ)
- Rifampicin (antibiotik untuk rawatan batuk kering)
- Ergotamine dan methysergide (digunakan dalam rawatan migrain)
- Methotrexate (digunakan dalam rawatan kanser dan penyakit autoimun)
- Kaolin dan sucralfate (digunakan untuk melegakan keadaan mulut yang bengkak dan sakit)
- Quinapril (digunakan untuk rawatan tekanan darah tinggi)
- Retinoids (digunakan untuk rawatan masalah kulit)
- Pil perancang
- Vaksin demam kepialu (diambil melalui mulut)

Cara menggunakan Doxycap

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Dewasa:

Ambil 2 kapsul pada hari pertama, kemudian 1 kapsul sekali sehari.

Telan kapsul dengan cecair yang secukupnya untuk mengurangkan risiko iritasi tekak.

Pertimbangan Khas:

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, doktor anda mungkin menyelaraskan dos anda mengikut keadaan.

- Bila perlu digunakan

Ambil sekali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- Loya
- Muntah dan hilang selera makan
- Cirit-birit
- Kegatalan di kawasan dubur
- Ruam kulit
- Demam
- Reaksi alahan yang serius
- Kerosakan hati

Semasa menggunakan Doxycap

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Doxycap.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan Doxycap hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mengambil apa-apa ubat-ubatan baharu tanpa berunding dengan doktor anda atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Doxycap kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika penglihatan anda kabur, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Elakkan pendedahan kepada cahaya matahari dalam jangka masa yang panjang sepanjang rawatan kerana doxycycline meningkatkan kepekaan terhadap cahaya dan boleh menyebabkan selaran matahari yang teruk. Jika kulit menjadi kemerahan, hentikan penggunaan ubat ini dan jumpa doktor secepat mungkin.

Jika cirit-birit atau sakit semasa menelan berlaku selepas anda mengambil ubat ini, hentikan penggunaan dan jumpa doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Doxycap boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Ada kemungkinan anda akan mengalami:

- Tindakbalas hipersensitiviti
- Jangkitan lain seperti jangkitan kulat dan radang
- Gangguan darah seperti penurunan kiraan sel darah
- Kelenjar tiroid menjadi gelap
- Sakit kepala, tekanan di dalam tengkorak, masalah penglihatan atau kehilangan penglihatan
- Bunyi berdering di telinga (*tinnitus*)
- Masalah sistem penghadaman seperti sakit, mual, atau cirit-birit, ketidakhadaman, ulser atau kesukaran menelan
- Masalah hati seperti radang atau kuning (*jaundis*)
- Ruam, kulit mengelupas, atau keadaan kulit yang teruk seperti sindrom Stevens-Johnson
- Sakit otot atau sendi
- Peningkatan tahap urea dalam darah
- Radang vagina
- Perubahan warna gigi (sementara), terutamanya pada kanak-kanak
- Tompok kemerahan dan bengkak pada kulit berbentuk bulat atau bujur yang berulang di tempat yang sama

setiap kali ubat diambil (erupsi tetap)

Doxycap mungkin menyebabkan reaksi Jarisch-Herxheimer yang kebiasaannya menyebabkan demam, rasa sejuk, sakit kepala, sakit otot dan ruam kulit. Reaksi ini timbul sejurus selepas menggunakan Doxycap untuk jangkitan spirochete dan biasanya akan pulih sendiri. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Doxycap

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul berwarna hijau muda dan merah jambu dengan "DXY 100" dicetak pada satu hujung dan "HD" yang dicetak di hujung yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Doxycycline hydrochloride
bersamaan dengan doxycycline 100 mg.

- Bahan Tidak Aktif

Colloidal silicon dioxide
Cornstarch
Magnesium Stearate

DOXYCAP CAPSULE

Doxycycline (100mg)

- *Nombor MAL:*
MAL19921000AZ

Pengilang

Hovid Berhad
Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan Ipoh/
Chemor, 31200 Chemor, Perak,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan
Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/01/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)251218/01592