

HORGESIC TABLET

Paracetamol / Orphenadrine citrate (450/35mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Horgestic Tablet
2. Bagaimana Horgestic Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Horgestic Tablet
4. Cara menggunakan Horgestic Tablet
5. Semasa menggunakan Horgestic Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Horgestic Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan Horgestic Tablet

Untuk melegakan sakit otot, sakit tulang, sakit sendi dan sakit kepala yang ringan hingga sederhana.

Bagaimana Horgestic Tablet berfungsi

Orphenadrine berfungsi melegakan ketegangan otot. Paracetamol pula berfungsi sebagai ubat tahan sakit dan boleh mengurangkan demam.

Sebelum menggunakan Horgestic Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini sekiranya:

- anda alah terhadap orphenadrine maleate, paracetamol atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).
- anda mempunyai penyakit akut porfiria (penyakit keturunan sel darah merah) dan asma yang disebabkan oleh aspirin.
- anda mempunyai glaukoma (tekanan tinggi dalam mata)

- Sebelum menggunakan Horgestic tablet

Beritahu doktor jika:

- anda mempunyai masalah hati, ulser perut atau penyakit buah pinggang
- anda mempunyai masalah jantung
- anda akan memandu atau mengendalikan mesin

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat, apabila diambil dengan Horgestic Tablet akan mengganggu fungsi bahan aktif ubat-ubatan yang lain. Antaranya ialah:

- ubat untuk merawat kemurungan
- ubat untuk merawat penyakit sawan

Interaksi lain yang tidak tersenarai mungkin akan berlaku. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika mempunyai sebarang keraguan.

Cara menggunakan Horgestic Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Ambil 1 hingga 2 tablet 3-4 kali sehari

Jangan melebihi 8 tablet sehari.

Warga emas dinasihati untuk mengambil dos yang lebih rendah kerana mereka lebih cenderung mengalami kesan sampingan pada dos biasa.

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom terlebih dos termasuk rasa loya, muntah atau perut tidak selesa selepas dua hari. Masalah hati dan buah pinggang mungkin akan berlaku selepas tiga hingga lima hari. Simptom terlebih dos juga termasuk rasa teruja dan kekeliruan yang akan menyebabkan koma. Sawan, denyutan jantung yang cepat dan masalah pembuangan air kencing mungkin juga berlaku.

Semasa menggunakan Horgestic Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan Horgestic Tablet hanya dengan preskripsi doktor.

Beritahu doktor anda sekiranya:

- anda akan mula mengambil ubat baru yang berlainan jenis semasa mengambil Horgestic Tablet
- anda mengandung
- keadaan anda tidak bertambah baik atau menjadi lebih teruk.

HORGESIC TABLET

Paracetamol / Orphenadrine citrate (450/35mg)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami gejala-gejala yang serupa seperti anda.

Jangan ambil ubat ini untuk merawat penyakit lain kecuali seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah dos tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Amaran alahan: Ubat ini mungkin akan menyebabkan reaksi kulit yang serius seperti ruam kulit, lepuh dan kulit menjadi merah. Reaksi tersebut mungkin adalah tanda-tanda keadaan yang serius. Anda harus berhenti mengambil ubat tersebut dan jumpa doktor anda dengan segera.

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Horgesic juga mungkin menyebabkan kekeringan mulut. Kekeringan mulut, jika berterusan boleh menyebabkan masalah gigi seperti, kerosakan gigi, penyakit gusi dan jangkitan kulat. Rujuk doktor jika keadaan ini berterusan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Horgesic tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan utama

- mulut kering
- pembesaran anak mata
- penglihatan kabur

- pembuangan air kencing tidak terkawal
- sembelit
- kekeliruan

Jarang

- gangguan darah
- keradangan hati
- reaksi alahan kulit seperti ruam, geligata dan gatal
- peningkatan tekanan dalam mata
- peningkatan kadar jantung
- gelisah
- kesukaran tidur
- khayalan
- pening
- pengsan

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Horgesic Tablet

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan ubat ini di bawah suhu 30°C. Jauhi dari cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Horgesic Tablet ialah tablet bulat, berwarna putih, tidak bersalut dengan permukaan rata, dan perkataan “HD”

dicetak timbul pada permukaan yang sama.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Paracetamol, orphenadrine citrate.
- Bahan tidak aktif
Colloidal silicon dioxide, partially pregelatinised starch, microcrystalline cellulose, crospovidone, stearic acid

- Nombor MAL:

MAL19920516AZ

Pengilang

Hovid Berhad
Lot 56442, 7^{1/2} Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/12/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/1)171220/00148