

FELXICAM 20MG CAPSULE

Piroxicam capsule 20 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Felxica
2. Bagaimana Felxica berfungsi
3. Sebelum menggunakan Felxica
4. Cara menggunakan Felxica
5. Semasa menggunakan Felxica
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Felxica
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Felxica

Digunakan untuk merawat gejala-gejala sakit dan keradangan dalam kalangan pesakit Osteoarthritis (penyakit sendi degeneratif), arthritis reumatoid dan ankylosing spondylitis (keradangan menyakitkan dan pengukuhan tulang belakang). Namun begitu, ubat ini tidak sepatutnya menjadi pilihan utama bagi rawatan yang menggunakan ubat anti-radang bukan steroid (NSAID).

Bagaimana Felxica berfungsi

Ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai bukan steroid ubat anti-inflamatory (NSAIDs). NSAID berhenti pengeluaran bahan kimia yang dipanggil prostaglandin. Bahan kimia yang dikeluarkan di dalam badan anda sebagai tindak balas kepada penyakit dan kecederaan. Mereka menyebabkan kesakitan dan keradangan (bengkak) dan apabila dikeluarkan di dalam otak anda boleh menyebabkan demam (suhu tinggi).

Sebelum mengambil Felxica

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika:

- anda hipersensitif kepada piroxicam atau mana-mana bahan-bahan lain produk ini.
- anda adalah sensitif kepada aspirin atau ubat-ubatan NSAID lain
- anda hamil, atau bercadang untuk hamil.
- anda sedang menyusukan bayi atau bercadang untuk menyusukan

- anda mempunyai atau telah mempunyai ulser peptik (ulser dalam perut atau duodenum)
- anda mempunyai atau telah mempunyai keradangan lapisan usus atau perut. Seperti penyakit Crohn dan kolitis ulser
- anda muntah darah
- anda pendarahan dari rektum (lalu belak), mempunyai gerakan usus melekit hitam (najis) atau cirit-birit berdarah

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika:

- anda alah kepada mana-mana ubat-ubatan lain, makanan, pewarna atau bahan pengawet.
- anda mengandung atau merancang untuk hamil
- anda menyusu atau ingin menyusukan
- anda mempunyai jangkitan
- anda merancang untuk mempunyai pembedahan
- anda mempunyai keadaan perubatan yang berikut:
- Tekanan darah tinggi (hipertensi) atau masalah jantung
- Asma
- Buah pinggang atau penyakit hati
- Bengkak kaki dan pergelangan kaki (edema)
- pendarahan yang berlebihan

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat mengganggu Piroxicam.

Mereka termasuk:

- aspirin dan lain-lain ubat-ubatan NSAID
- ubat-ubatan untuk menghentikan pembekuan darah seperti warfarin
- diuretik
- cimetidine (ubat yang digunakan untuk mengurangkan kesakitan ulser dan pedih ulu hati)
- litium yang digunakan untuk merawat beberapa jenis kemurungan

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Felxica

- Berapa banyak harus diambil

Doktor anda akan menentukan jumlah ubat yang anda perlu mengambil berdasarkan keterukan keadaan anda. Mengambil ubat ini dalam dos yang ditetapkan oleh doktor anda.

Dos yang berbeza-beza antara pesakit.

Dos yang biasa ialah 20 mg sehari diambil sebagai dos tunggal.

Menelan kapsul (s) dengan segelas penuh air sambil berdiri tegak.

- Bila perlu digunakan

Yang perlu diambil semasa atau sejurus selepas makan. Ini akan mengurangkan peluang yang sakit perut.

- Berapa lama perlu diambil

Anda dinasihatkan supaya mengambil selagi doktor anda memberitahu anda. Tempoh rawatan perlu 14 hari.

- Jika terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan segera sekiranya anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan.

Gejala berlebihan mungkin termasuk:

- Loya
- Muntah
- Sakit perut
- ulser peptik

FELXICAM 20MG CAPSULE

Piroxicam capsule 20 mg

- pendarahan gastrousus
- Mengantuk
- Hyperreflexia (refleks terlalu aktif atau overresponsive)
- Koma
- Sawan

Semasa menggunakan Felxicam

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil.
- Beritahu doktor anda jika anda membuat keputusan untuk menyusukan bayi anda.
- Jika anda akan menjalani pembedahan, pastikan pakar bedah dan pakar bius tahu anda mengambil Felxicam.
- Beritahu doktor anda jika anda mendapat jangkitan semasa menggunakan Felxicam.
- anda merancang untuk mempunyai apa-apa suntikan atau imunisasi.
- Sebelum memulakan sebarang ubat baru, beritahu doktor atau pegawai farmasi anda bahawa anda mengambil Felxicam.
- Pergi ke doktor anda secara berkala bagi apa-apa pemeriksaan atau ujian darah.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- Beri ubat ini kepada orang lain, walaupun tanda-tanda mereka kelihatan serupa dengan anda.
- Ambil ubat anda untuk merawat sebarang aduan lain melainkan anda diberitahu oleh doktor atau pegawai farmasi anda.
- Berhenti mengambil ubat atau menukar dos anda sendiri sebelum meminta doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Minum arak akan menjadi bertambah buruk. Perhatikan pengambilan anda.

Memandu dan mengendalikan mesin:
Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sebagai Felxicam boleh menyebabkan pening dan menjejaskan penglihatan anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati mana-mana yang berikut dan mereka bimbang anda:

- sakit perut, loya, muntah, senak
- sakit perut yang teruk atau kelembutan
- Sakit kepala
- Pening
- mata bengkak
- Masalah mata seperti penglihatan kabur dan kerengsaan mata
- kelesuan (rasa tidak selesa, sakit, atau kekurangan kesejahteraan)
- Rawatan (nada, sibuk di telinga)
- Ruam kulit
- Pruritus (gatal-gatal kulit)
- bengkak muka, bibir atau lidah yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan
- gejala anemia seperti pucat, keletihan, dan menjadi sesak nafas
- *Paraesthesia* (sensasi kulit yang tidak normal (seperti mencucuk atau menggeletek atau gatal-gatal atau terbakar)
- Kehilangan rambut

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccine (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Felxicam

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C. Jauhkan daripada haba dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk mekupakan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Amethyst legap / amethyst kapsul legap dengan "HD" yang dicetak pada satu hujung dan "XCM20" dicetak pada hujung kapsul

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap Felxicam 20 kapsul mengandungi *Piroxicam* 20 mg.

- Bahan Tidak Aktif

Sodium Starch Glycolate
Lactose Monohydrate
Colloidal Silicon Dioxide
Polysorbate 80
Magnesium Stearate
Cornstarch
Polyvinylpyrrolidone

- Nombor MAL:

MAL19920515AZ

Pengilang

HOVID Bhd.
Lot 56442, 7 ½ Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

13/04/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200522/444