

HOVID-CIMETIDINE FILM-COATED TABLET

Cimetidine (400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid-Cimetidine Film-Coated Tablet.
2. Bagaimana Hovid-Cimetidine berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovid-Cimetidine
4. Cara menggunakan Hovid-Cimetidine.
5. Semasa menggunakan Hovid-Cimetidine.
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Cimetidine.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hovid-Cimetidine Film-Coated Tablet

Hovid-Cimetidine digunakan untuk:

- mencegah dan merawat ulser duodenum (bahagian usus kecil)
- Rawatan jangka pendek untuk ulser aktif dalam perut.
- Merawat (GERD) akut (penyakit refluks gastroesofagus akut)
- Merawat keadaan pengeluaran asid perut berlebihan seperti Sindrom Zollinger-Ellison
- Merawat pendarahan di bahagian atas sistem pencernaan.

Bagaimana Hovid-Cimetidine Film-Coated Tablet berfungsi

Ubat ini mengandungi cimetidine sebagai bahan aktif, yang membantu mengurangkan asid dalam perut dengan menghalang histamin (bahan yang merangsang perembesan asid).

Sebelum menggunakan Hovid-Cimetidine Film-Coated Tablet

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan gunakan ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap cimetidine atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Anda seorang ibu yang menyusukan anak.

- Sebelum menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Hovid-Cimetidine jika anda:

- Menghidap penyakit hati, masalah buah pinggang, atau pernah mengalami

masalah berkaitan otak disebabkan oleh penyakit hati

- Pernah mengalami ulser perut atau duodenum sebelum ini, terutamanya jika anda warga emas.
- Sedang mengambil ubat atau menghidap penyakit yang boleh menyebabkan penurunan bilangan sel darah.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil:

- Ubat untuk sawan dan kegelisahan seperti diazepam
- Ubat jantung seperti propranolol, lidocaine, nifedipine, diltiazem, metoprolol, procainamide
- Ubat pencair darah seperti warfarin
- Ubat untuk sawan seperti phenytoin
- Ubat untuk asma seperti theophylline
- Ubat antidepresan seperti amitriptyline
- Ubat untuk kencing manis seperti glipizide, metformin
- Ubat penekan sistem imun seperti ciclosporin, tacrolimus
- Ubat antiviral seperti atazanavir
- Ubat antifungal seperti ketoconazole, itraconazole, posaconazole
- Ubat untuk kanser seperti carmustine, fluorouracil, epirubicin
- Ubat penahan sakit seperti morphine

Cara menggunakan Hovid-Cimetidine

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus diambil

Untuk ulser perut atau ulser duodenum
Anda boleh ambil ubat salah satu daripada pilihan berikut:

- 2 tablet pada waktu malam, atau
- 1 tablet pada waktu pagi + 1 tablet pada waktu malam, atau
- ½ tablet semasa setiap waktu makan (3 kali sehari) + 1 tablet pada waktu malam, atau
- 1 tablet semasa setiap waktu makan + 1 tablet pada waktu malam (4 kali sehari)

Untuk refluks asid (pedih ulu hati)

- 1 tablet, 4 kali sehari (semasa makan dan sebelum tidur)

Untuk keadaan terlalu banyak asid perut (contohnya sindrom Zollinger-Ellison)

- 1 tablet, 4 kali sehari. Jangan ambil lebih daripada 6 tablet sehari

Untuk kanak-kanak (berumur lebih 1 tahun)

- Dos bergantung kepada berat badan kanak-kanak
- Doktor akan tentukan jumlah dos dan kekerapan pengambilan

Nota:

- Dos mungkin perlu dikurangkan jika anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda boleh ambil ubat antacid untuk melegakan ketidakselesaan perut jika perlu

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

HOVID-CIMETIDINE FILM-COATED TABLET

Cimetidine (400mg)

Ulser duodenum dan perut: Ambil selama sekurang-kurangnya 4 minggu (6 minggu untuk ulser perut).

Penyakit refluks esofagus (masalah pedih ulu hati): Ambil ubat selama 4 hingga 8 minggu.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Kesan sampingan akibat penggunaan ubat ini secara berlebihan termasuk:

- Tindakan balas alahan
- denyutan jantung yang lambat atau cepat
- kesukaran bernafas
- kebingungan
- jumlah sel darah putih yang rendah
- gangguan darah lain
- demam.

Semasa menggunakan Hovid-Cimetidine

Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Hovid-Cimetidine.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandungi semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Hovid-Cimetidine kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini tidak dijangka untuk mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda berasa loya, pening atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovid-Cimetidine boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan mungkin termasuk:

- cirit-birit
- pening
- keletihan
- ruam
- kekeliruan yang bersifat sementara, terutamanya berlaku pada orang tua atau pesakit dengan masalah buah pinggang.
- Pembesaran payudara lelaki
- Mati pucuk

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Cimetidine Film-Coated Tablet.

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30 °C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berbentuk oblong dan berwarna kuning pudar, dengan permukaan cembung serta garis belah timbul pada satu sisi

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cimetidine

- Bahan tidak aktif

Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose E-15, Isopropyl alcohol, Microcrystalline cellulose PH101, Hydroxypropyl Methylcellulose E5, Iron Oxide Yellow (C.I. No. 77492), talc, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide (C. I. No. 77891), Cornstarch, Sodium Lauryl Sulphate, Pregelatinised Cornstarch

- Nombor MAL

MAL19930396AZ

Pengilang

HOVID Bhd.

Lot 56442, 7 ½ Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia

Tarikh kemas kini

31/07/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)230625/00047