

KETOTIFEN SYRUP

Ketotifen Fumarate (1mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ketotifen Syrup
2. Bagaimana Ketotifen Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ketotifen Syrup
4. Cara menggunakan Ketotifen Syrup
5. Semasa menggunakan Ketotifen Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ketotifen Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Ketotifen Syrup

Ia digunakan untuk mencegah asma dan juga untuk merawat alahan seperti rinitis dan konjunktivitis.

Bagaimana Ketotifen Syrup berfungsi

Ketotifen adalah sejenis antihistamin dengan kesan anti-alergi. Histamin adalah sejenis bahan kimia yang dikeluarkan di dalam badan semasa reaksi alergi. Ketotifen Syrup berfungsi dengan menghalang penghasilan dan kesan histamin di dalam badan.

Sebelum menggunakan Ketotifen Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan
 - Jika anda alergi kepada *ketotifen*, antihistamin lain dan sebarang bahan yang terkandung dalam Ketotifen Syrup.
 - Jika anda mengandung atau sedang menyusukan anak. *Ketotifen* akan dirembes dalam susu ibu.
 - Jika anda mempunyai serangan asma yang akut kerana ia akan menyebabkan keadaan asma bertambah teruk.
- Sebelum menggunakan Ketotifen Syrup
Anda harus beritahu doktor anda sekiranya anda alergi terhadap sebarang ubat yang anda pernah ambil untuk merawat keadaan semasa anda.
- Jika mengambil ubat-ubat lain
Ubat-ubat berikut mungkin berinteraksi dengan Ketotifen Syrup:

- Ubat penenang atau ubat bius
- Antihistamin
- Alkohol
- Ubat tahan sakit jenis narkotik
- Antibiotik tertentu
- Ubat makan untuk kencing manis

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Rawatan asma yang sebelum ini sepatutnya diteruskan untuk sekurang-kurangnya dua minggu selepas permulaan rawatan *ketotifen*.

Jika anda akan menjalani ujian kulit, anda perlu hentikan pengambilan *ketotifen* beberapa hari sebelum ujian tersebut, disebabkan *ketotifen* akan menjejaskan keputusan ujian kulit anda. Hubungi doktor sebelum ujian kulit anda.

Cara menggunakan Ketotifen Syrup

Diambil melalui mulut.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos Dewasa: 2.5ml hingga 5ml

Dos kanak-kanak melebihi 2 tahun: 2.5ml

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil dua kali sehari, dengan makanan atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Guna ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Dos berlebihan mungkin menyebabkan kematian, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Simptom utama termasuk kesukaran tidur, gementar, peningkatan kadar degupan jantung, mengeletar dan sawan. Dalam kalangan dewasa, simptom biasa termasuk mengantuk, koma dan sawan.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Ketotifen Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ketotifen Syrup.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Hubungi doktor jika simptom anda bertambah teruk atau tidak bertambah baik.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Ketotifen Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka

KETOTIFEN SYRUP

Ketotifen Fumarate (1mg/5ml)

mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Elakkan minuman alkohol.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, mengantuk, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ketotifen Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan sampingan yang paling biasa adalah rasa mengantuk, keletihan, berat badan meningkat, kekeringan mulut, pening, loya dan sakit kepala.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ketotifen Syrup

- Penyimpanan
Goncang ubat sebelum digunakan.
Simpan di bawah suhu 25°C.
- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Cecair tidak berwarna, lutsinar dengan perisa strawberi
- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif
Ketotifen (as Fumarate)
 - Bahan tidak aktif
Propyl Hydroxybenzoate
Methyl Hydroxybenzoate
Ethyl Maltol
Propylene Glycol
Strawberry Flavour
Citric Acid
Syrup Simplex
Sodium Citrate
Deionised Water
- Nombor MAL
MAL19940059AZ

Pengilang

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar)
30010, Ipoh, Perak.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar)
30010, Ipoh, Perak.

Tarikh kemas kini RiMUP

27/03/2023

Nombor Siri

NPRA(R4/1)240323/00034