

AMOXICAP CAPSULE

Amoxicillin trihydrate (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Amoxicap
2. Bagaimana Amoxicap berfungsi
3. Sebelum menggunakan Amoxicap
4. Cara menggunakan Amoxicap
5. Semasa menggunakan Amoxicap
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Amoxicap
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Amoxicap

Amoxicap digunakan untuk merawat jangkitan bakteria seperti:

- Jangkitan dalam telinga, hidung atau tekak
- Jangkitan pada kemaluan dan saluran air kencing
- Jangkitan pada kulit dan tisu-tisu lembut
- Jangkitan alat kelamin yang dijangkiti melalui hubungan seks

Bagaimana Amoxicap berfungsi

Amoxicillin dalam Amoxicap bertindak dengan menghalang proses penghasilan dinding sel bakteria dan seterusnya membunuh bakteria tersebut.

Sebelum menggunakan Amoxicap

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai alahan terhadap amoxicillin, penicillin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- Anda mengalami jangkitan mono kerana risiko anda untuk mendapat ruam meningkat.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula menggunakan Amoxicap

Mengandung dan menyusukan

Sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Beritahu doktor jika:

- anda mempunyai sejarah reaksi alahan yang serius
- masalah buah pinggang atau hati

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor jika anda sedang mengambil ubat-ubat berikut:

- *Allopurinol* atau *probenecid* (ubat bagi mengawal tahap urik asid)
- Antibiotik seperti *chloramphenicol*, *erythromycin*, sulfonamides dan *tetracycline*.

Cara menggunakan Amoxicap

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa dan kanak-kanak dengan berat badan melebihi 20kg:
250 mg hingga 500 mg

- Bila perlu digunakan

Ambil kapsul ini setiap 8 jam atau seperti yang arahan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini sehingga rawatan selesai, walaupun anda telah berasa sihat. Jika anda berhenti mengambil ubat ini sebelum tamatnya tempoh rawatan, jangkitan mungkin akan berulang kembali.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan kadar segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital yang terdekat jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan masalah pemakanan, mual, muntah, sakit perut dan cirit-birit.

Semasa menggunakan Amoxicap

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Amoxicap.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Ambil Amoxicap hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Amoxicap kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Semasa terapi jangka masa panjang, doktor akan memantau fungsi hati, buah pinggang dan darah anda.

Akan ada kemungkinan berlakunya jangkitan baharu yang lebih teruk semasa terapi. Jika perkara ini berlaku, sila hentikan ubat ini dan berjumpa doktor anda secepat mungkin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan lain, Amoxicap boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini walaupun tidak semua orang mengalaminya. Berjumpa doktor dengan segera jika anda mempunyai apa-apa kesan sampingan berikut yang serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan yang segera.

Berhenti mengambil Amoxicap dan memberitahu doktor anda dengan segera jika anda mempunyai:

- tindak balas alahan, gejala termasuk ruam dan kulit mengelupas.
- kekurangan sel darah atau apa-apa gejala yang melibatkan gangguan darah.
- cirit-birit, mual, muntah, lidah berbulu hitam, lidah bengkak dan rensa, mulut sakit atau rensa.
- keradangan buah pinggang atau peningkatan enzim hati.
- reaksi alahan yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)*. *DRESS* pada mulanya kelihatan seperti gejala selesema dengan ruam pada muka, suhu badan tinggi dan kelenjar limfa membesar.

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda untuk maklumat lanjut. Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Amoxicap

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Amoxicap 250

Kapsul berwarna merah dan kelabu dengan "AX250" dicetak pada satu hujung dan "HD" dicetak pada hujung yang lain

Amoxicap 500

Kapsul berwarna merah dan kuning dengan "AX500" dicetak pada satu hujung dan "HD" dicetak pada hujung yang lain

- Bahan-bahan kandungan

- *Bahan Aktif*
Amoxicillin trihydrate

- *Bahan Tidak Aktif*
Amoxicap 250
Sodium Lauryl Sulfate
Talc
Mangesium Stearate

Amoxicap 500
Magnesium Stearate
Sodium Lauryl Sulphate

- **MAL Number:**
Amoxicap 250
MAL19900155AZ

Amoxicap 500
MAL19950253AZ

Pengilang

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/10/2022

Nombor siri

NPRA(R4/1)27102022/00095