

HOVID GENTAMICIN CREAM

Gentamicin sulphate (0.1% w/w)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid Gentamicin Cream
2. Bagaimana Hovid Gentamicin Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovid Gentamicin Cream
4. Cara menggunakan Hovid Gentamicin Cream
5. Semasa menggunakan Hovid Gentamicin Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Gentamicin Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh semakan

Apakah kegunaan Hovid Gentamicin Cream

Ia digunakan untuk merawat jangkitan pada kulit yang disebabkan oleh bakteria tertentu.

Bagaimana Hovid Gentamicin Cream berfungsi

Krim ini mengandungi bahan aktif gentamicin sulfat, yang merupakan sejenis antibiotik dalam kumpulan aminoglikosida. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Hovid Gentamicin Cream

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada gentamicin, antibiotik aminoglikosida lain, propylene glycol atau mana-mana bahan lain yang

terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

-Sebelum menggunakan Hovid Gentamicin Cream

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai:

- masalah buah pinggang

Mengandung dan menyusukan bayi

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil, atau menyusukan anak sebelum menggunakan mana-mana ubat.

Elakkan menggunakan krim ini secara meluas pada wanita hamil, dalam jumlah yang banyak atau untuk tempoh masa yang panjang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Hovid Gentamicin Cream

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berumur melebihi 1 tahun:

- Sapukan pada kawasan kulit yang dijangkiti, 3 atau 4 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Sapukan 3 hingga 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Hovid Gentamicin Cream untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

-Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Menggunakan terlalu banyak krim ini boleh menyebabkan kemerahan dan kegatalan kulit.

Semasa menggunakan Hovid Gentamicin Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovid Gentamicin Cream.

HOVID GENTAMICIN CREAM

Gentamicin sulphate (0.1% w/w)

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Hovid Gentamicin Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luar sahaja.

Jika terjadi kerengsaan atau kulit menjadi lebih sensitif, atau terjadi jangkitan baharu, hentikan penggunaan krim dan berjumpa doktor secepat mungkin.

Sekiranya anda mengalami masalah pendengaran semasa atau selepas menggunakan krim ini, sila berjumpa doktor secepat mungkin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Hovid Gentamicin Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang paling biasa termasuk:

-Kegatalan

-Kemerahan

-Bengkak

-Reaksi kulit lain muncul selepas memulakan rawatan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan sampingan ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melawati laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Gentamicin Cream

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk
Krim putih legap.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:
Gentamicin sulphate.

-Bahan tidak aktif:
Cetomacrogol Emulsifying Wax, Vaseline, Liquid Paraffin, Polyethylene

Glycol 4000, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol, Purified Water.

-Nombor MAL

MAL19985166AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010, Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP
25/03/2024

Nombor siri
NPRA(R4/1)200324/00038