

FLUCOR NIGHT SOFT GELATIN CAPSULE

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (250mg / 30mg / 2mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Flucor Night
2. Bagaimana Flucor Night berfungsi
3. Sebelum menggunakan Flucor Night
4. Cara menggunakan Flucor Night
5. Semasa menggunakan Flucor Night
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Flucor Night
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Flucor Night

Flucor Night digunakan untuk mengurangkan simptom-simptom selesema seperti hidung berair, bersin, kesakitan ringan, sakit kepala, demam dan hidung tersumbat.

Bagaimana Flucor Night berfungsi

Produk ini mengandungi paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride dan chlorpheniramine maleate sebagai bahan aktif. Paracetamol berfungsi untuk menghalang isyarat kesakitan daripada sampai ke otak. Paracetamol juga berfungsi untuk menurunkan demam. Pseudoephedrine hydrochloride berfungsi untuk melegakan sumbatan hidung dan sinus supaya anda mudah bernafas. Chlorpheniramine maleate adalah sejenis *antihistamine* yang mengurangkan simptom-simptom alahan.

Sebelum menggunakan Flucor Night

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Flucor Night jika anda atau anak anda

- mempunyai alahan kepada paracetamol, pseudoephedrine, chlorpheniramine, *antihistamine* lain atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)

- mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung yang teruk
- sedang mengambil atau pernah mengambil ubatan yang merawat masalah kemurungan (*monoamine oxidase inhibitors / MAOIs*) dalam tempoh dua minggu yang lepas.

- Sebelum menggunakan Flucor Night

Maklumkan kepada doktor anda jika anda atau anak anda

- Mempunyai masalah buah pinggang atau hati
- Mengalami gangguan pernafasan, batuk yang tidak sembuh, atau glaukoma (tekanan tinggi dalam mata)
- Mengalami penyakit jantung, tiroid, diabetes atau tekanan darah yang tinggi
- Sukar untuk kencing disebabkan pembesaran prostat
- Mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Flucor Night jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makan kesihatan. Ubat-ubat yang mungkin mengganggu fungsi Flucor Night termasuk:

- Ubat untuk melegakan sumbatan hidung
- Sesetengah ubat untuk merawat masalah kemurungan
- Ubat yang mengawal selera makanan
- Sesetengah ubat yang merawat masalah *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD)

- Ubat yang mengurangkan tekanan darah seperti guanethidine, debrisoquine, dan methyl dopa.

Cara menggunakan Flucor Night

Pengambilan secara oral sahaja.

Ikuti arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk orang dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Ambil 2 kapsul setiap 4 jam; tanpa melebihi 8 kapsul dalam 24 jam.

- Bila perlu digunakan

Ambil Flucor Night 4 kali setiap hari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Dos seterusnya hanya boleh diberi selepas sekurang-kurangnya 4 jam.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Flucor Night seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

FLUCOR NIGHT SOFT GELATIN CAPSULE

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (250mg / 30mg / 2mg)

- Jika mengambil dos berlebihan (overdose)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah diambil. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan anda muntah, sakit perut, tekanan darah rendah dan berpeluh.

Semasa menggunakan Flucor Night

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Flucor Night
- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan atau berulang balik
- Penggunaan ubat ini yang lama haruslah dielakkan kecuali diarahkan oleh doktor anda
- Maklumkan doktor anda dengan segera jika anda tiba-tiba mengandung bila mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- **AMARAN:** Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil ubat ini dengan ubatan paracetamol lain pada masa yang sama.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Flucor Night kepada sesiapa sahaja, sama ada mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda atau tidak.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan minum arak semasa mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin boleh mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda berasa mengantuk atau letih, jangan memandu atau menggunakan jentera

Kesan-kesan sampingan

AMARAN ALAHAN/ALERGI: Paracetamol mungkin menyebabkan kesan sampingan kulit yang teruk. Antara tanda-tanda yang teruk termasuk kemerahan kulit, lepuhan kulit, ataupun ruam. Ini mungkin merupakan tanda-tanda keadaan serius. Kalau kesan sampingan ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan mendapatkan perhatian perubatan dengan segera.

Produk ini mengandungi *sodium metabisulphite* yang mungkin menyebabkan tindak balas alergi / alahan yang teruk dalam sesetengah orang.

Semasa mengambil ubat ini, anda mungkin mengalami:

- Gangguan darah seperti kiraan sel darah putih dan merah yang rendah.
- Kadar degupan jantung meningkat, keresahan, kegelisahan, kesukaran untuk tidur dan kencing
- Kesakitan semasa kencing, mengantuk, banyak berpeluh dan kehilangan selera makan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan

Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Flucor Night

- Penyimpanan

Simpan Flucor Night di bawah suhu 25°C. Lindungi daripada cahaya. Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin lembut berbentuk bujur yang berwarna hijau gelap, berbahan gelatine lembut dan dicetak dengan perkataan 'Flucor'. Kapsul diisi dengan cecair jernih yang berwarna hijau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate

- Bahan tidak aktif

- Quinoline Yellow Extra, FD&C Blue No.1, Polysorbate 80, Sodium Metabisulphite, Glycerin, Polyvinylpyrrolidone K-25, Deionised Water, Sodium Acetate Trihydrate, Propylene Glycol, Polyethylene Glycol 400, Gelatine, Sorbital Solution 70%

FLUCOR NIGHT SOFT GELATIN CAPSULE

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (250mg / 30mg / 2mg)

- Nombor MAL

MAL20041202AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh,
Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

06/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)050324/00027