

KETOFEN GEL

Ketoprofen (2.5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ketofen Gel
2. Bagaimana Ketofen Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ketofen Gel
4. Cara menggunakan Ketofen Gel
5. Semasa menggunakan Ketofen Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ketofen Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ketofen Gel

Ketofen Gel digunakan untuk melegakan kesakitan otot dan sendi disebabkan oleh keradangan atau cedera ringan yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti seperti sukan.

Bagaimana Ketofen Gel berfungsi

Produk ini mengandungi bahan aktif iaitu ketoprofen yang tergolong dalam kumpulan *Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs* (NSAID). NSAID berfungsi untuk menghalang penghasilan *prostaglandins* yang dihasilkan apabila badan anda mengalami kesakitan atau kecederaan dan seterusnya melegakan kesakitan dan keradangan.

Sebelum menggunakan Ketofen Gel

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna Ketofen Gel jika

- anda atau anak anda mempunyai alahan kepada ketoprofen, NSAID lain atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Anda mempunyai luka kulit, kulit terkoyak atau luka yang dijangkiti kuman

- Sebelum menggunakan Ketofen Gel

Dapatkan nasihat doktor anda jika anda atau anak anda mempunyai masalah buah pinggang. Jangan gunakan pada kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jika anda harus menggunakan Ketofen Gel semasa mengandung, penggunaannya haruslah dihentikan satu minggu sebelum tarikh dijangka bersalin.

Ketoprofen dirembeskan dalam kuantiti yang kecil ke dalam susu ibu. Oleh itu, ia tidak harus digunakan semasa menyusukan anak untuk mengelakkan kesan sampingan yang tidak diingini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengguna Ketofen Gel jika anda sedang menggunakan atau mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makan kesihatan.

Cara menggunakan Ketofen Gel

Untuk penggunaan luaran sahaja.

Ikuti arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk orang dewasa dan kanak-kanak melebihi 5 tahun: Sapu 2 hingga 4 kali setiap hari di atas kawasan yang sakit atau terdapat keradangan.

Sapukan ubat dan gosok sehingga ubat diserap sepenuhnya.

- Bila perlu digunakan

Sapu sebanyak 2 – 4 kali setiap hari atau apabila diperlukan ataupun seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu

KETOFEN GEL

Ketoprofen (2.5% w/w)

ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika tersapu dos berlebihan (overdose)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Menelan ubat ini secara tidak sengaja akan menyebabkan kesan sampingan.

Semasa menggunakan Ketofen Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ketofen Gel.
- Beritahu doktor anda segera jika anda mengandung semasa menggunakan ubat ini.
- Dapatkan nasihat doktor anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Ubat ini mengandungi ketoprofen yang tergolong dalam ubatan NSAID. Jangan gunakan ubat ini dengan ubatan NSAID

lain pada masa yang sama.

- Jangan guna sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Ketofen Gel kepada sesiapa sahaja, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kawasan kulit yang disapu ubat harus dielakkan daripada terdedah kepada cahaya matahari atau sinaran UV semasa sedang menerima rawatan atau dua minggu selepas rawatan diberhentikan untuk mengelakkan reaksi kulit.

Jika anda mengalami kesan sampingan kulit semasa penggunaan produk ini, hentikan penggunaan dan jumpa doktor anda secepat mungkin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ketofen Gel boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang pernah dilaporkan termasuk:

- Kesan sampingan kulit seperti sensitif kepada cahaya matahari, kegatalan dan kemerahan
- Reaksi kulit yang lagi teruk seperti kulit melepuh atau ruam kulit. (jarang)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ketofen Gel

- Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan Ketofen Gel di bawah suhu 30°C.

Jauhkan Ketofen Gel dari api dan tidak boleh dibakar.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

KETOFEN GEL

Ketoprofen (2.5% w/w)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Gel yang tidak berwarna dalam tiub aluminium

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Ketoprofen

- Bahan tidak aktif

- Propyl Paraben, Butylated Hydroxytoluene, Disodium EDTA, Methyl Paraben, Spike Lavender, Aminomethyl Propanol (AMP-95), Carbopol ETD 2020, Isopropyl Alcohol (2-Propanol), Deionised Water

- Nombor MAL

MAL06100567AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar), 30010
Ipoh, Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

14/06/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)130524/00061