

DISUF-H CREAM

Fusidic Acid (2.0%), Hydrocortisone Acetate (1.0%)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Disuf-H Cream
2. Bagaimana Disuf-H Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Disuf-H Cream
4. Cara menggunakan Disuf-H Cream
5. Semasa menggunakan Disuf-H Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Disuf-H Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Disuf-H Cream

Digunakan dalam keadaan di mana kulit mengalami keradangan (dermatitis) dan dijangkiti oleh bakteria.

Bagaimana Disuf-H Cream berfungsi

Ubat ini mengandungi *asid fusidic* dan *hydrocortisone acetate* sebagai bahan aktif. *Asid Fusidic* adalah sejenis antibiotik yang berfungsi dengan menghalang atau membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan. *Hydrocortisone acetate* adalah steroid mengurangkan apa-apa bengkak, kemerahan atau kegatalan kulit anda.

Sebelum menggunakan Disuf-H Cream

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- Jika anda alah kepada *asid fusidic*, *hydrocortisone acetate* atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- Untuk merawat keadaan kulit yang dikenali sebagai jerawat *rosacea* (kemerahan dan bengkak seluruh hidung, pipi, dagu dan dahi)
- Untuk merawat keadaan kulit yang dikenali sebagai *dermatitis perioral* (ruam kulit dengan lebam merah kecil di sekeliling mulut).
- Untuk merawat keadaan kulit yang disebabkan oleh virus (seperti cacar

air), bakteria (seperti TB dan sifilis) dan kulat (seperti penyakit kaki makan air).

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, berbincanglah dengan pegawai farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula mengambil

Tanya doktor atau pegawai farmasi untuk mendapatkan nasihat sebelum anda menggunakan ubat ini jika:

- anda hamil, berfikir anda hamil. Anda tidak perlu menggunakan ubat ini untuk masa yang lama atau dalam jumlah yang besar.
- anda menyusukan bayi.
- anda mempunyai masalah kulit akibat daripada penyakit TB

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Disuf-H Cream boleh menjejaskan atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan lain yang anda ambil. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain dalam apa jua bentuk termasuk apa-apa yang anda beli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Disuf H-Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Ubat ini hanya untuk kegunaan pada kulit sahaja. Jangan menelannya.

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak yang perlu digunakan. Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan pegawai farmasi dengan teliti. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau pegawai farmasi anda untuk bantuan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi. Biasanya, ia digunakan pada kawasan yang terjejas dua hingga tiga kali setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini selagi ia diberikan kepada anda oleh doktor anda

Anda akan mendapati kulit anda bertambah baik selepas beberapa hari menggunakan krim tersebut. Jika tiada perubahan selepas 7 hari anda perlu berhenti menggunakan krim ini dan berjumpa dengan doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil dos anda, langkau (skip) dos yang tertinggal. Ambil dos yang seterusnya seperti biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Steroid topikal boleh menyebabkan kesan sistemik jika tidak digunakan seperti yang diarahkan. Apabila ia diserap dalam jumlah yang mencukupi ke dalam darah, ia boleh menjejaskan bahagian-bahagian badan yang lain. Kesan-kesan sampingan biasanya adalah ringan seperti kaki bengkak, tekanan darah tinggi, kekejangan otot, sesak nafas, sawan, kerosakan tulang, penurunan perkembangan pada kanak-kanak dan sindrom Cushing.

Semasa menggunakan Disuf-H Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda secepat yang mungkin jika:

- Jika anda mengalami reaksi alahan / apa-apa kesan sampingan yang tidak diingini semasa menggunakan ubat ini.
- Jika anda hamil ketika menggunakan ubat ini.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Disuf H Cream

Ambil ubat anda pada masa yang sama sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda

Jangan mengambil apa-apa ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh tamat tempoh

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati semasa menggunakan Disuf-B Cream pada bahagian mata kerana ubat ini boleh menyebabkan glaukoma jika ia masuk ke dalam mata.
- Jika anda menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang lebih lama atau dalam jumlah yang besar, peluang untuk mendapat apa-apa kesan sampingan akan lebih tinggi. Kulit anda juga boleh mendapatkan lebih sensitif terhadap ubat ini dan rintangan kepada antibiotik (kurang berkesan) akan berlaku.
- Anda tidak boleh menggunakan ubat untuk masa yang lama pada muka anda.
- Anda harus mengelak daripada menggunakan ubat pada luka terbuka atau kawasan-kawasan

sensitif seperti hidung, telinga, bibir atau kemaluan kecuali anda telah diberitahu oleh doktor.

- Anda harus mengelak daripada menggunakan Disuf-H Cream pada kulit nipis, ulser kulit, urat pecah atau jerawat
- Anda perlu berhenti menggunakan ubat ini selepas 7 hari jika kulit anda tidak bertambah baik.
- Penindasan adrenal boleh berlaku apabila digunakan untuk masa yang lama pada bayi.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan lain, Disuf H Cream boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami tindakbalas hipersensitiviti kepada bahan aktif ketika pengambilan ubat ini.

- Sesak nafas
- Sukar bernafas
- Bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- Ruam kulit

Masalah-masalah yang disenaraikan di bawah adalah disebabkan oleh steroid dan ia lebih cenderung berlaku jika ubat tersebut digunakan untuk masa yang lama atau dalam jumlah yang besar atau pada bahagian lipatan kulit (seperti ketiak atau di bawah payudara).

Masalah ini lebih cenderung terjadi pada bayi dan kanak-kanak. Mereka berkemungkinan mendapat kesan sampingan sekiranya kulit diliputi dengan pembalut atau lampin.

- Glaukoma
- Penipisan kulit
- *Stretch mark* (Kesan regangan kulit)
- penipisan dan pengembangan saluran darah
- Keradangan atau bengkak akar rambut (*folliculitis*)
- Keradangan kulit (kemerahan kulit)
- Mencerahkan warna kulit
- kelenjar adrenal boleh berhenti berfungsi. Tanda-tanda kelenjar adrenal tidak berfungsi adalah seperti keletihan, kemurungan dan keresahan.

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor anda dengan cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Disuf H Cream

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim bewarna putih, legap

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif
Fusidic acid 2.0% dan
hydrocortisone acetate 1.0%

- Bahan Tidak Aktif
 - Carbomer*
 - Aminomethyl Propanol*
 - Liquid paraffin*
 - Polysorbate*
 - Sorbitan monooleate*
 - Methyl Hydroxybenzoate*
 - Propyl Hydroxybenzoate*
 - Butylated Hydroxytoluene*
 - Propylene Glycol*
 - Purified Water*

- Nombor MAL

MAL08051743A

Pengilang

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

12/10/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230508/1060