

DISUF-B CREAM

Fusidic Acid / Betamethasone valerate (2.0% w/w / 0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Disuf-B Cream
2. Bagaimana Disuf-B Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Disuf-B Cream
4. Cara menggunakan Disuf-B Cream
5. Semasa menggunakan Disuf-B Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Disuf-B Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Disuf-B Cream
Disuf-B Cream digunakan untuk merawat jangkitan bakteria dan keradangan pada kulit.

Bagaimana Disuf-B Cream berfungsi
Disuf-B Cream mengandungi dua bahan aktif iaitu fusidic acid, sejenis antibiotik dan betamethasone valerate daripada kumpulan steroid.

Disuf-B Cream berfungsi untuk membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan manakala betamethasone membantu mengurangkan bengkak, kemerahan atau kegatalan kulit anda.

Sebelum menggunakan Disuf-B Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini jika:

- Anda mempunyai alahan (hipersensitif) terhadap fusidic acid atau betamethasone valerate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (yang disenaraikan di Maklumat lanjut)

- Anda mempunyai ruam di sekeliling mulut atau dagu.
- Anda mempunyai jangkitan virus atau kulat pada kulit
- Anda mempunyai jerawat di muka
- Anda mempunyai jangkitan tuberkulosis pada kulit
- Anda mempunyai ulser pada kulit.

- Sebelum mula menggunakan Disuf-B Cream

Mengandung dan menyusukan anak

- Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.
- Disuf-B hanya boleh digunakan semasa mengandung jika manfaatnya melebihi risiko kepada bayi. Walau bagaimanapun, steroid tidak boleh disapu pada permukaan yang luas semasa mengandung.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Disuf-B Cream

- Berapa banyak harus digunakan

- Basuh tangan anda sebelum dan selepas menggunakan ubat ini
- Sapu sedikit pada bahagian yang terjejas.
- Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

- Luka yang terdedah: 2-3 kali sehari.
- Luka yang tidak terdedah: Penggunaan yang tidak terlalu kerap adalah mencukupi
- Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

- Guna Disuf-B Cream mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jangan guna lebih dari 7 hari.
- Maklumkan kepada doktor anda jika keadaan anda tidak bertambah baik atau semakin teruk.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terguna dos berlebihan atau termakan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

DISUF-B CREAM

Fusidic Acid / Betamethasone valerate (2.0% w/w / 0.1% w/w)

Semasa menggunakan Disuf-B Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Gunakan ubat ini seperti mana yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi.
- Beritahu doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Disuf-B Cream
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doctor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda
- Jangan berkongsi Disuf-B Cream dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Ubat ini hanya untuk kegunaan luaran.
- Jika anda menggunakan ubat ini pada muka atau berhampiran mata anda, elakkan terkena mata kerana ia boleh menyebabkan glaukoma (peningkatan tekanan pada mata).
- Rujuk doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan pada permukaan yang luas atau di bawah pembalut kedap udara termasuk napkin pada bayi dan kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan, Disuf-B Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Anda perlu mendapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mempunyai sebarang gejala hipersensitiviti berikut:

- Kesukaran bernafas
- Muka atau tekak menjadi bengkak
- Ruam kulit, kemerahan atau kegatalan.

Kesan sampingan lain yang mungkin berlaku:

- Penipisan kulit
- Tanda regangan
- Kekurangan adrenal; gejala termasuk keletihan, tekanan darah rendah, gula dalam darah menjadi rendah dan gangguan gastrousus.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines(AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Disuf-B Cream

- Penyimpanan

- Jauhi ubat daripada kanak-kanak.
- Jangan gunakan Disuf-B Cream selepas tarikh tamat tempoh pada kotak.
- Simpan di bawah suhu 25°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim legap berwarna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:
Fusidic acid 2.0% w/w and Betamethasone valerate 0.1% w/w
- Bahan tidak aktif:
Propyl hydroxybenzoate, butylated hydroxytoluene, methyl hydroxybenzoate, aminomethyl propanol, polysorbate 80, carbomer (Carbopol 934), liquid paraffin, propylene glycol, sorbitan monoleate and purified water.

- Nombor MAL:

MAL08111773AZ

Pengilang

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/03/2023

Nombor Siri

NPRA (R4/1)280223/00019