

HOVID FEXOVID TABLET®

Fexofenadine hydrochloride (180mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid Fexovid Tablet
2. Bagaimana Hovid Fexovid Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovid Fexovid Tablet
4. Cara menggunakan Hovid Fexovid Tablet
5. Semasa menggunakan Hovid Fexovid Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Fexovid Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hovid Fexovid Tablet

Hovid Fexovid Tablet digunakan untuk merawat gejala alahan seperti bersin, hidung berair, gatal mata, hidung dan tekak, serta mata merah dan berair.

Ia juga merawat masalah geligata yang tidak diketahui punca dan mengurangkan kegatalan.

Bagaimana Hovid Fexovid Tablet berfungsi

Hovid Fexovid Tablet mengandungi fexofenadine hydrochloride, yang merupakan antihistamin. Ia berfungsi dengan menghalang tindakan histamin dan melegakan gejala alahan.

Sebelum menggunakan Hovid Fexovid Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai alahan terhadap fexofenadine hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Anda mempunyai masalah buah pinggang.

- Sebelum menggunakan Hovid Fexovid Tablet

Beritahu doktor anda jika:

- Anda mempunyai masalah hati.
- Anda mempunyai masalah jantung.

Jika anda tidak pasti apa-apa, adalah penting untuk anda meminta nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil:

- Erythromycin (antibiotik).
- Ketoconazole (antikulat).
- Antacid, termasuk yang mengandungi aluminium dan magnesium hidroksida (ubat antiulser)

Cara menggunakan Hovid Fexovid Tablet

Telan ubat anda secara keseluruhan dengan air.

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas:

Ambil 1 tablet, sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ambil sekali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan pening, mengantuk dan mulut kering.

Semasa menggunakan Hovid Fexovid Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovid Fexovid Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Hovid Fexovid Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

HOVID FEXOVID TABLET® *Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)*

Fexofenadine hydrochloride (180mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda berasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovid Fexovid Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan termasuk:

- Sakit belakang
- Batuk
- Pening
- Mengantuk
- Sakit semasa haid
- Ketidakselesaan perut
- Keletihan
- Sakit kepala
- Loya
- Radang atau jangkitan pada bahagian dalam telinga
- Resdung
- Selsema

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid Fexovid Tablet

- Penyimpanan
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Tablet lonjong, berwarna peach, kosong pada kedua-dua permukaan yang sedikit cembung dan bersisi serong.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Fexofenadine hydrochloride
- Bahan tidak aktif
Microcrystalline cellulose
Pregelatinized starch
Isopropyl alcohol
Propylene glycol
Talc
Hydroxypropyl methylcellulose E-5
Hydroxypropyl methylcellulose E-15
Titanium dioxide
Iron oxide red
Sunset yellow lake
Polyvinyl pyrrolidone
Magnesium stearate
Croscarmellose sodium

- Nombor MAL
MAL11040011AZ

Pengilang

HOVID Bhd
Lot 56442, 7 ½ Miles,
Jalan Ipoh/Chemor,
31200 Chemor,
Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh,
Perak, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP
27/03/2024

Nombor Siri
NPRA(R4/1)260324/00048