

AZIMAX 250MG TABLET

Azithromycin 250mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Azimax 250 mg Tablet
2. Bagaimana Azimax 250 mg Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Azimax 250 mg
4. Cara menggunakan Azimax 250 mg Tablet
5. Semasa menggunakan Azimax 250 mg Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Azimax 250 mg Tablet
9. Maklumat lanjut
10. Pengilang
11. Pemegang Pendaftaran Produk
12. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Azimax 250 mg Tablet

Untuk merawat jangkitan pada:

- bahagian tengah telinga (*otitis media*)
- tekak (jangkitan streptokokus pada tekak)
- paru-paru (bronkitis)
- sinus (sinusitis)
- dada (pneumonia)
- kulit dan tisu lembut
- bahagian kelamin disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis*.

Bagaimana Azimax 250 mg Tablet berfungsi

Azimax termasuk dalam kumpulan antibiotik macrolida. Ia bertindak ke atas bakteria dengan cara membunuh bakteria atau menghalang pertumbuhannya.

Azimax tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus seperti demam selesema.

Sebelum mengambil Azimax 250 mg Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda alah pada *azithromycin*, macrolida, ketolida atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

Doktor akan mempertimbangkan keadaan anda sebelum memberi ubat

ini.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika:

- anda mengalami penyakit jantung
- anda mengalami penyakit hati
- anda mengalami penyakit buah pinggang
- anda hamil atau merancang untuk hamil dan menyusukan bayi
- anda sedang mengambil ubat yang terhasil dari ergot.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau didapati tanpa preskripsi. Sesetengah ubat mengganggu fungsi antibiotik. Antaranya:

- antasid (untuk penghadaman)
- *warfarin* (untuk menghalang pembekuan darah)
- *terfenadine* atau *astemizole* (untuk alahan pada kulit)
- *cyclosporine* (untuk mengelakkan penolakan organ transplan dan untuk merawat masalah sistem imun tubuh yang terlampau aktif)
- *digoxin* (untuk merawat kegagalan jantung)
- *ergotamine* / *dihydroergotamine* (untuk merawat migrain)
- *theophylline* (untuk merawat asma dan penyakit paru-paru obstruktif yang kronik)
- *phenytoin* (untuk merawat sawan)
- *triazolam* / *hexobarbital* (untuk merawat insomnia).

Doktor mungkin akan mengubah dos ubat atau anda mungkin perlu mengambil ubat lain.

Interaksi lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Rujuk doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Cara menggunakan Azimax 250 mg Tablet

Berapa banyak harus diambil

Berdasarkan tahap kesihatan anda, dan sama ada anda mengambil ubat lain atau tidak, doktor atau pegawai farmasi akan

memberitahu jumlah ubat yang anda perlukan.

Tablet ini boleh diambil oleh orang dewasa dan kanak-kanak yang mempunyai berat badan melebihi 45 kg. Ubat ini tidak disarankan untuk kanak-kanak kurang dari 45 kg.

Dos biasa ialah 1500mg untuk 3 hari iaitu 500 mg sekali sehari.

Untuk jangkitan pada bahagian kelamin, dos ialah 1000 mg.

Ikut arahan doktor dengan baik.

Telan ubat dengan air yang banyak.

Bila perlu diambil

Anda boleh ambil ubat ini sebelum atau selepas makan.

Berapa lama perlu diambil

Anda dinasihati supaya menghabiskan ubat ini, walaupun anda sudah sihat. Jangkitan mungkin akan berulang jika anda tidak menghabiskan ubat ini.

Rujuk doktor atau pegawai farmasi jika anda berasa kurang pasti.

Jika terlupa mengambil

Jangan gandakan dos anda bagi menggantikan dos yang tertinggal.

Jika terlupa dos anda, segera ambil dos tersebut sebaik sahaja anda teringat. Sila abaikan pengambilan dos yang terlupa sekiranya masa untuk dos seterusnya telah hampir.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor secepat yang mungkin apabila anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang lebih dari yang diperlukan.

Semasa menggunakan Azimax 250 mg Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda sekiranya:

- anda mengalami ulser pada mulut atau lidah semasa atau selepas tamat rawatan

AZIMAX 250MG TABLET

Azithromycin 250mg

- anda rasa gatal-gatal dan ada lelehan pada faraj
- keadaan anda tidak berubah atau menjadi lebih serius
- anda hamil
- anda cirit-birit.

Jangan ambil ubat cirit-birit tanpa merujuk kepada doktor atau pegawai farmasi terlebih dahulu.

Teruskan merujuk kepada doktor dan pegawai farmasi jika cirit birit masih berlaku walaupun anda sudah berhenti mengambil ubat ini selama beberapa minggu.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tandatanda yang sama dengan anda.

Jangan ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi.

Jangan menukar dos yang telah ditetapkan sebelum merujuk kepada doktor.

Perkara yang perlu diberi perhatian
Seperti *erythromycin* dan *macrolide* yang lain, anda mungkin boleh mengalami reaksi alahan yang serius, termasuk angiodema dan anafilaksis (jarang membawa maut). Tindak balas-tindak balas ini akan menyebabkan gejala yang berulang-ulang dan memerlukan tempoh pemerhatian dan rawatan yang lebih lama.

Beritahu doktor dengan segera jika anda mengalami tanda-tanda reaksi pada kulit.

Peningkatan selang QT

Repolarisasi jantung dan selang QT yang berpanjangan menimbulkan risiko aritmia jantung dan *torsades de pointes*, telah dilaporkan dalam rawatan dengan *macrolide*, termasuk *azithromycin*. Doktor dan ahli farmasi harus mempertimbangkan risiko pemanjangan QT, yang boleh membawa maut, ketika mempertimbangkan risiko dan faedah

azithromycin untuk kumpulan berisiko termasuk:

- Pesakit dengan pemanjangan QT kongenital yang telah direkodkan
- Pesakit yang sedang mendapat rawatan dengan bahan aktif lain yang boleh memanjangkan selang QT, seperti antiaritmia Kelas IA dan III, agen antipsikotik, antidepresan, dan *fluoroquinolones*
- Pesakit dengan gangguan elektrolit, terutamanya dalam kes hipokalemia dan hipomagnesemia
- Pesakit dengan bradikardia, aritmia jantung atau kekurangan jantung yang berkaitan secara klinikal
- Pesakit tua: pesakit tua mungkin lebih rentan terhadap kesan yang berkaitan dengan ubat pada selang QT

Infantile hypertrophic pyloric stenosis (IHPS) telah dilaporkan berikutan penggunaan *azithromycin* pada bayi (rawatan sehingga 42 hari). Ibu bapa dan penjaga harus dimaklumkan untuk menghubungi doktor mereka sekiranya berlaku muntah dan / atau keradangan semasa memberi makan.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaanya ia adalah tidak serius dan sementara.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti berikut ketika mengambil ubat ini

Azimax mungkin mengakibatkan alahan kulit yang teruk dan serius.

Berhenti ambil Azimax dan dapatkan bantuan kecemasan secepat yang mungkin jika anda mengalami mana-mana gejala di bawah:

- Kemerahan kulit, kulit melepuh, ruam, demam, sakit tekak dan kerengsaan mata.

Kesan-kesan sampingan yang kerap berlaku:

- gangguan perut dan usus seperti cirit-birit, kejang perut, loya dan angin.

Kesan-kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Demam kuning (*cholestatic jaundice*)
- *Mild transient neutropenia* (bilangan neutrofil dalam darah berkurang).

Kesan-kesan sampingan yang tidak selalu berlaku:

- ruam, sakit kepala, rasa mengantuk

Sekiranya anda mendapati kanak-kanak tersebut muntah dan / atau mengalami ketidakselesaan semasa diberi makan, hubungi doktor dengan segera kerana ini mungkin disebabkan oleh *Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis* (IHPS).

Pengalaman pasca pemasaran:

Gangguan Jantung: Palpitasi dan aritmia termasuk takikardia ventrikel telah dilaporkan. Terdapat jarang terdapat laporan pemanjangan QT dan *torsades de pointes*.

Gangguan gastrointestinal: stenosis pilorik hipertrofik bayi.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Beritahu doktor dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Azimax 250 mg Tablet

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan ubat ini pada suhu di bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya dan lembapan.

AZIMAX 250MG TABLET

Azithromycin 250mg

Pelupusan

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet Azimax 250 mg berbentuk bujur, putih, disaluti dengan lapisan filem, condong pada bahagian tepi, berbentuk cembung dengan perkataan "HOVID" timbul dan terdapat bar pecahan pada permukaan tablet.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif dalam setiap biji tablet Azimax 250 mg ialah Azithromycin 250 mg.

Bahan-bahan kandungan yang lain:

Dicalcium phosphate dihydrate, Pregelatinised starch, Sodium lauryl sulfate, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Hydropropyl methylcellulose E-5, Hydropropyl methylcellulose E-15, Titanium dioxide, Talc, Isopropyl alcohol, Propylene glycol, Purified water

NOMBOR MAL: MAL11090011AZ

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7 1/2 Miles,
Jalan Ipoh / Chemor,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

15/02/2021

Nombor siri

NPRA(R2/1)201228/588