

HOSOLVON TABLET

Bromhexine Hydrochloride (8mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hosolvon Tablet
2. Bagaimana Hosolvon Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hosolvon Tablet
4. Cara menggunakan Hosolvon Tablet
5. Semasa menggunakan Hosolvon Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon Tablet
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hosolvon Tablet

Hosolvon Tablet diambil apabila terdapat banyak lendir atau mukus pekat di dalam saluran pernafasan anda.

Bagaimana Hosolvon Tablet berfungsi

Hosolvon Tablet membantu melegakan saluran pernafasan melalui pencairan lendir atau mukus.

Sebelum menggunakan Hosolvon Tablet

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Hosolvon Tablet sekiranya anda alah kepada bromhexine atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam Hosolvon Tablet.

-Sebelum anda mula mengambil

Sebelum mengambil Hosolvon Tablet, anda hendaklah memberitahu doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda mengalami ulser perut.

Jika anda tidak pasti sama ada anda mengalami, ataupun pernah mengalami sebarang keadaan ini, anda sepatutnya bertanya doktor anda atau ahli farmasi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda hendaklah sentiasa memberitahu doktor anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Hosolvon Tablet

-Berapa banyak perlu diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos yang disyorkan adalah seperti dinyatakan di bawah:

Dewasa: 1 hingga 2 tablet 3 kali sehari.

Kanak-kanak 6 - 12 tahun: Setengah tablet 3 kali sehari.

Kadang-kadang doktor menetapkan dos yang berbeza.

Label pada pek mengandungi maklumat mengenai dos yang perlu diambil. Sekiranya anda masih tidak pasti, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

-Bila perlu diambil

Ambil tiga kali sehari dan cuba ambil Hosolvon Tablet pada masa yang sama setiap hari.

-Berapa lama perlu diambil

Sekiranya keadaan anda bertambah teruk atau tidak bertambah baik dalam masa beberapa hari setelah pengambilannya, jumpa doktor anda semula.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda mengambil Hosolvon Tablet lebih daripada yang sepatutnya, maklumkan kepada doktor atau terus pergi ke hospital. Bawa bungkusan ubat bersama anda supaya doktor anda mengetahui jenis ubat yang anda ambil. Jika anda mengambil terlalu banyak Bromhexine, kemungkinan besar anda akan mendapat simptom berikut:

- Gangguan makan
- Loya
- Muntah
- Ketidakselesaan perut
- Cirit-birit
- Lendir atau mukus berlebihan
- Pernafasan yang lambat
- Sawan

Semasa menggunakan Hosolvon Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini sekiranya:

- Anda hamil atau mungkin hamil. Ubat ini tidak harus diambil semasa tiga bulan pertama kehamilan anda.
- Anda menyusui bayi atau merancang untuk menyusui bayi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri Hosolvon Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

HOSOLVON TABLET

Bromhexine Hydrochloride (8mg)

Jangan ambil Hosolvon Tablet untuk merawat sebarang penyakit lain melainkan ahli farmasi atau doktor anda menasihati anda agar berbuat demikian.

Jangan ambil lebih dari dos yang disyorkan melainkan ahli farmasi atau doktor anda menyuruh anda berbuat demikian

-Perkara yang perlu diberi perhatian
Perhatian perlu diambil ketika hamil. Faedah-faedah Hosolvon Tablet hendaklah dibandingkan dengan kesan terhadap anak anda.

Kesan-kesan sampingan

Hosolvon Tablet boleh menyebabkan alergi teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan Hosolvon Tablet dan dapatkan rawatan perubatan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- 1) Alahan yang teruk: kesukaran bernafas, pening, kulit bengkak atau ruam.
- 2) Tindak balas kulit yang teruk: kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Semua ubat ada risiko kesan sampingan dan tidak semua risiko dapat diketahui pada masa ini.

Dapatkan nasihat doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda mempunyai gangguan perut atau sebarang persoalan tentang kesan pengambilan Hosolvon Tablet.

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi secepat mungkin sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan semasa atau selepas pengambilan Bromhexine, supaya anda mendapat rawatan yang sesuai.

Selain itu, kesan sampingan yang tidak dapat dijangka yang tidak disenaraikan di atas, boleh juga berlaku akibat daripada pengambilan sebarang ubat.

Apabila anda mengambil Bromhexine, anda mungkin menyedari bahawa mukus bertambah di dalam saluran pernafasan anda.

Keadaan ini biasa berlaku apabila anda mengambil Hosolvon Tablet kerana itu cara bagaimana Bromhexine bertindak.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau tindak balas advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melayari laman web npa.gov.my [Pengguna→Melaporkan Kesan Sampingan kepada Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon Tablet

-Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada bungkusannya. Simpan di tempat yang bersuhu bawah 30°C. Lindungi daripada pancaran cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bulat tidak bersalut, berdiameter 7.0 mm, berwarna putih hingga putih pudar bermuka nipis cembung, dengan ukiran "HD" dan bergaris pada permukaan yang sama.

-Bahan-bahan kandungan:

-Bahan aktif:-

Bromhexine hydrochloride 8 mg.

-Bahan-bahan tidak aktif:-

Magnesium stearate, Lactose, Polyvinylpyrrolidone K-25 dan Corn starch.

-Nombor MAL:

MAL19911142XZ

Pengilang:

HOVID Bhd.

Lot 56442, 7 1/2 Miles, Jalan Ipoh/Chemor, 31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:
HOVID Bhd

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

8/3/2024

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)070224/00016