

SETAMOL FILM COATED TABLET

Paracetamol (500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Setamol
2. Bagaimana Setamol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Setamol
4. Cara menggunakan Setamol
5. Semasa menggunakan Setamol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Setamol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Setamol

Setamol digunakan untuk melegakan kesakitan ringan seperti sakit kepala, sakit otot, sakit gigi dan demam.

Bagaimana Setamol berfungsi

Produk ini mengandungi paracetamol yang berfungsi melalui halangan pada penghantaran signal rasa sakit sampai ke otak. Ia juga bertindak pada otak untuk mengurangkan demam.

Sebelum menggunakan Setamol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Setamol jika anda atau anak anda mempunyai alahan kepada paracetamol atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan Setamol

Dapatkan nasihat doktor anda jika anda atau anak anda:

- Mempunyai kerosakan buah pinggang atau hati
- Minum alcohol jangka panjang
- mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa

preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makan kesihatan.

Cara menggunakan Setamol

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan secara oral sahaja.

Ikuti arahan doktor dan ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa: 2 biji untuk diambil setiap 4 jam, tidak melebihi 8 biji setiap hari.

Kanak-kanak (7 hingga 12 tahun): 1 biji untuk diambil setiap 4 jam, tidak melebihi 4 biji setiap hari.

- Bila perlu digunakan

Guna setiap 4 jam atau apabila diperlukan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Setamol mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan

telah diambil. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan loya, muntah, ketidakselesaan perut, lebih mudah berdarah, kegagalan hati atau buah pinggang, terlalu banyak asid dalam badan dan kehilangan kesedaran.

Semasa menggunakan Setamol

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Setamol.
- Hubungi doktor anda jika simptom tidak bertambah baik atau jika demam berterusan lebih daripada 3 hari atau berulang.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Produk ini mengandungi paracetamol. Jangan mengambil ubat ini dengan ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Setamol kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan jangka panjang ubat ini harus dielakkan kecuali diarahkan oleh doktor.

SETAMOL FILM COATED TABLET

Paracetamol (500 mg)

Kesan-kesan sampingan

Amaran alahan ubat: Paracetamol boleh menyebabkan tindak balas kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin merupakan tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Kesan advers lain yang dilaporkan termasuk gangguan darah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Setamol

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi daripada kelembapan.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat disalut filem berwarna jingga dengan tepi serong, bermuka sedikit cembung; dan ukiran 'SETAMOL' di satu belah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Paracetamol

- Bahan tidak aktif

- Polyvinylpyrrolidone (PVP K90), Microcrystalline Cellulose PH102, Pregelatinized Starch, Colloidal Silicon Dioxide, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, Propylene Glycol, Sunset Yellow Lake, Hydroxypropyl Methylcellulose E-5, Hydroxypropyl Methylcellulose E-15, Titanium Dioxide, Talc, Iron Oxide Red, Purified Water

- Nombor MAL

MAL19911137XZ

Pengilang

Hovid Bhd.

Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan Ipoh / Chemor, 31200 Chemor, Perak, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

12/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)080324/00034