

PARMOL 120 SYRUP

Paracetamol (120mg / 5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Parmol 120 Syrup
2. Bagaimana Parmol 120 Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Parmol 120 Syrup
4. Cara menggunakan Parmol 120 Syrup
5. Semasa menggunakan Parmol 120 Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Parmol 120 Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Parmol 120 Syrup

Parmol 120 Syrup digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan ringan seperti:

- Sakit kepala
- Sakit otot
- Sakit gigi

Bagaimana Parmol 120 Syrup berfungsi

Produk ini mengandungi paracetamol yang berfungsi melalui halangan pada penghantaran signal rasa sakit sampai ke otak. Ia juga bertindak pada otak untuk mengurangkan demam.

Sebelum menggunakan Parmol 120 Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan memberikan Parmol 120 Syrup jika anak anda mempunyai alahan kepada paracetamol atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan Parmol 120 Syrup

Dapatkan nasihat doktor anda jika anak anda mempunyai kerosakan buah pinggang atau hati.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anak anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makan kesihatan.

Cara menggunakan Parmol 120 Syrup

Pengambilan secara oral sahaja.

Ikuti arahan doktor dan ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak yang berumur 1 hingga 6 tahun: 1 hingga 2 sudu teh (5 – 10 mL) untuk diambil 3 hingga 4 kali sehari.

Kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun: 2 hingga 4 sudu teh (10 - 20 mL) untuk diambil 3 hingga 4 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Gunakan 3 hingga 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Parmol 120 Syrup mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Beri dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan memberi ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan beri dos

berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah diambil. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan ketidakselesaan atau keracunan. Anak anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan loya, muntah, sakit perut, lebih mudah berdarah, kegagalan hati dan buah pinggang, terlalu banyak asid dalam badan dan kehilangan kesedaran.

Semasa menggunakan Parmol 120 Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

- Hubungi doktor anda jika simptom tidak bertambah baik atau jika demam berterusan lebih daripada 3 hari atau berulang.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anak anda bahawa anak anda sedang menggunakan Parmol 120 Syrup.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Produk ini mengandungi paracetamol. Jangan mengambil ubat ini dengan ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.
- Jangan mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Jangan memberi Parmol 120 Syrup kepada sesiapa walaupun mereka

PARMOL 120 SYRUP

Paracetamol (120mg / 5mL)

mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan jangka panjang ubat ini harus dielakkan kecuali diarahkan oleh doktor.

Kesan-kesan sampingan

Amaran alahan ubat: Paracetamol boleh menyebabkan tindak balas kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin merupakan tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaannya dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Kesan advers lain yang dilaporkan termasuk gangguan darah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Parmol 120 Syrup

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi daripada cahaya dan pembekuan.

- Pelupusan

Ubat-ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-

langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair oren yang likat dengan rasa strawberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Paracetamol

- Bahan tidak aktif

- Propylene Glycol, Sodium Saccharin, Ethyl Maltol, Sodium Benzoate, Sodium Metabisulphite, Disodium Calcium Edetate, Strawberry Flavour, Sunset Yellow 15985, Glycerine, Syrup Simplex, Purified Water

- Nombor MAL

MAL19911138XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh,
Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

04/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)290224/00025