

MEDICARE+ MEDITAMOL SUSPENSION

250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Medicare+ Meditamol Suspension
2. Bagaimana Medicare+ Meditamol Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension
4. Cara menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension
5. Semasa menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Medicare+ Meditamol Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Medicare+ Meditamol Suspension

Medicare+ Meditamol Suspension digunakan untuk melegakan demam, sakit kepala, gejala selsema, sakit gigi, ketidakselesaan semasa pertumbuhan gigi.

Bagaimana Medicare+ Meditamol Suspension berfungsi

Ubat ini mengandungi paracetamol yang berfungsi melalui halangan pada penghantaran signal rasa sakit sampai ke otak. Ia juga bertindak pada otak untuk mengurangkan demam.

Sebelum menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Medicare+ Meditamol Suspension jika anda atau anak anda mempunyai:

- Alah kepada paracetamol atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- Kerosakan hati yang teruk.

- Sebelum menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda atau anak anda mempunyai:

- Kerosakan hati atau buah pinggang.
- Mengandung, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak. Walaupun paracetamol merentasi plasenta, ia adalah selamat digunakan dalam jangka pendek semasa kehamilan. Paracetamol dirembes ke dalam susu ibu, ia tidak membawa risiko kepada bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan yang boleh mengganggu Medicare+ Meditamol Suspension adalah seperti ubat cair darah (Warfarin).

Cara menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun	2 hingga 4 sudu teh (10 hingga 20ml) untuk diambil 3 hingga 4 kali sehari, tidak melebihi 80ml sehari.
Kanak-kanak	<u>1 hingga 6 tahun:</u> Setengah hingga 1 sudu teh (2.5 hingga 5 ml) untuk diambil 3 hingga 4 kali sehari. <u>7 hingga 12 tahun:</u> 1 hingga 2 sudu teh (5 hingga 10 ml) untuk diambil 3 hingga 4 kali sehari.

Pengambilan secara oral sahaja.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda. Ia mungkin berbeza dari

maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Gunakan 3-4 kali sehari atau apabila perlu atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Guna Medicare+ Meditamol Suspension mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera atau pergi ke Jabatan kecemasan hospital terdekat anda, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala pengambilan paracetamol secara berlebihan termasuk muntah, sakit perut, tekanan darah rendah, dan berpeluh. Gejala yang paling serius, kemungkinan kerosakan hati yang bergejala seperti kulit kuning, gula

darah rendah dan terlalu banyak asid dalam badan mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk berlaku. Tanda ketoksikan hati mungkin hanya muncul selepas satu minggu.

Semasa menggunakan Medicare+ Meditamol Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Hubungi anggota kesihatan jika simptom berterusan (jika sakit berterusan lebih daripada 10 hari atau jika terdapat kemerahan atau demam berterusan lebih daripada 3 hari).

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Medicare+ Meditamol Suspension.

Paracetamol memberikan kelegaan simptomatik sahaja, terapi tambahan untuk merawat punca kesakitan atau demam patut dimulakan apabila perlu.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- Melebihi dos yang dinyatakan kerana ia boleh menyebabkan kecederaan hati yang serius
- Ambil lebih daripada 4 dos sehari.
- Mangambil ubat-ubatan lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama kerana produk ini mengandungi paracetamol.
- Mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Berikan ubat kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa sakit, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Amaran alahan ubat: Paracetamol boleh menyebabkan tindak balas kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam.

Ini mungkin merupakan tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaannya dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Kesan advers lain yang dilaporkan termasuk gangguan darah

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Medicare+ Meditamol Suspension

- Penyimpanan

Lindungi daripada cahaya dan pembekuan.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Ampaian merah jambu yang likat dengan rasa raspberi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif
Paracetamol

- Bahan Tidak Aktif
Xanthan Gum
Disodium Calcium Edetate
Ponceau 4R Lake
Colloidal Silicon Dioxide
Sorbitol
Ethanol
Raspberry Flavour
CI 77891
Syrup Simplex
Sodium Benzoate
Ethyl Maltol
Glycerine
Liquid Glucose 82
Silicon Antifoam
Saccharin Sodium
Deionised water

- Nombor MAL

MAL19911139XZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Dipasarkan oleh:

World Medicare Supplies Sdn. Bhd
PT 5740 (1st floor), Jalan TS 2/1E,
Taman Semarak 2, 71800 Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

25/11/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)020224/00014