

HOVID-LIQUID PARAFFIN

Liquid Paraffin (100%)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid-Liquid Paraffin
2. Bagaimana Hovid-Liquid Paraffin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovid-Liquid Paraffin
4. Cara menggunakan Hovid-Liquid Paraffin
5. Semasa menggunakan Hovid-Liquid Paraffin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Liquid Paraffin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Hovid-Liquid Paraffin

Hovid-Liquid Paraffin digunakan untuk melegakan gejala sembelit.

Bagaimana Hovid-Liquid Paraffin berfungsi

Hovid-Liquid Paraffin bertindak sebagai pelincir dan melembutkan najis untuk membantu pergerakan usus.

Sebelum menggunakan Hovid-Liquid Paraffin

- Bila tidak boleh digunakan

Jangan mengambil Hovid-Liquid Paraffin jika anda hipersensitif kepada paraffin.

Jangan menggunakan pada kanak-kanak di bawah umur 3 tahun dan warga emas.

Jangan menggunakan Hovid-liquid paraffin apabila anda mempunyai masalah gastrousus yang lain seperti usus tersumbat, sakit perut, loya atau muntah, pengumpulan najis dan pembedahan.

- Sebelum mula menggunakan Hovid-Liquid Paraffin

Beritahu doktor anda sebelum mengambil Hovid-Liquid Paraffin jika anda mempunyai penyakit yang lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan seperti Vitamin A, D, E dan K.

Cara menggunakan Hovid-Liquid Paraffin

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Minum 15 - 45ml, dos boleh diubah mengikut keperluan

Kanak-kanak 6-12 tahun: Minum 10-15ml, dos boleh diubah mengikut keperluan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ambil sekali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Hovid-Liquid Paraffin dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Penggunaan Hovid-Liquid Paraffin dalam jangka masa yang panjang adalah tidak digalakkan.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil dos seterusnya mengikut jadual seperti biasa. Jangan

ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Gejala dos berlebihan adalah rembesan dan kerengsaan dubur.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau berasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan bantuan perubatan segera.

Semasa menggunakan Hovid-Liquid Paraffin

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovid-Liquid Paraffin.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan ubat ini dalam jangka masa yang panjang. Rujuk kepada doktor anda sekiranya julap adalah diperlukan pada setiap hari.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Hovid-Liquid Paraffin kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hamil dan menyusukan bayi

Jika anda hamil, atau sedang menyusukan bayi anda tidak

HOVID-LIQUID PARAFFIN

Liquid Paraffin (100%)

disarankan mengambil Hovid-Liquid Paraffin.

-MAL number:
MAL19911131X

Jumpa doktor anda jika anda mengalami sakit perut yang berterusan dan kesukaran menelan ubat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovid-Liquid Paraffin boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Liquid Paraffin

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air kumbahan atau sisa buangan rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair jernih dan berminyak.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif
Liquid Paraffin

-Bahan tidak aktif
Tiada.

Pengilang

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

08/07/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)070721/00061