

HOVID- METHYL SALICYLATE LINIMENT

Methyl Salicylate (25% v/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan hovid Methyl Salicylate Liniment
2. Bagaimanakah hovid Methyl Salicylate Liniment berfungsi
3. Sebelum menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment
4. Cara menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment
5. Semasa menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan hovid Methyl Salicylate Liniment
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan hovid Methyl Salicylate Liniment

Ia digunakan untuk melegakan sakit terseliuh atau ketegangan, sakit pada sendi, urat dan otot.

Bagaimanakah hovid Methyl Salicylate Liniment berfungsi

hovid Methyl Salicylate Liniment mengandungi methyl salicylate. Apabila ia disapu pada kulit, ia diserap melalui kulit, dan meningkatkan aliran darah, memberikan rasa hangat dan melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika anda alah kepada methyl salicylate atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

-Sebelum menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Jika anda mengambil Warfarin, penggunaan berlebihan ke atas kulit boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment

-Berapa banyak harus digunakan

Urut pada kulit sebanyak 2 hingga 3 kali sehari mengikut keperluan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan 2 hingga 3 kali sehari apabila diperlukan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan hovid Methyl Salicylate Liniment untuk tempoh masa yang pendek sahaja.

-Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan pernafasan yang laju, suhu badan yang tinggi, sakit perut, loya, muntah, terlalu banyak asid dalam badan, terlalu banyak cecair di dalam paru-paru.

Semasa menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan hovid Methyl Salicylate Liniment.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

HOVID- METHYL SALICYLATE LINIMENT

Methyl Salicylate (25% v/v)

Jangan berikan hovid Methyl Salicylate Liniment kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan sapu pada luka atau kulit yang meradang atau berhampiran mata atau membran mukus. Ia adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, kerengsaan atau jangkitan, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan Sampingan

Tindak balas sensitiviti, gatal-gatal dan bengkak pada lapisan bawah kulit mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers --> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan hovid Methyl Salicylate Liniment

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan Warna produk

Cecair yang jernih dan berwarna kekuningan.

- Bahan-bahan Kandungan

-Bahan aktif:

- Methyl Salicylate

-Bahan tidak aktif:

- Palm Oil

- Nombor MAL

MAL19911147X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010, Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

22/1/2024

Nombor siri

NPRA(R4/1)190124/00011