

WINTOSAL CREAM

Methyl Salicylate / Menthol / Camphor (15%w/w / 2.3%w/w / 4%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Wintosal Cream
2. Bagaimana Wintosal Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Wintosal Cream
4. Cara menggunakan Wintosal Cream
5. Semasa menggunakan Wintosal Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Wintosal Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Wintosal Cream

Penggunaan Wintosal Cream memberikan kelegaan yang sementara untuk ketidakselesaan atau kesakitan otot dan penyakit reumatik.

Bagaimana Wintosal Cream berfungsi

Ubat ini mengandungi *methyl salicylate*, mentol dan camphor, iaitu *counterirritants* yang akan memberikan sensasi hangat dan/atau sejuk untuk kelegaan sementara rasa sakit.

Sebelum menggunakan Wintosal Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini:

- Jika anda mempunyai alahan pada ubat-ubatan yang mengandungi *salicylates* (e.g. Aspirin), *non-steroidal anti-inflammatory* atau sebarang kandungan dalam Wintosal Cream
- Jika anda mempunyai sebarang luka pada kulit
- Pada kanak-kanak berumur kurang daripada 2 tahun

- Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor jika:

Anda hamil atau menyusui. Anda tidak harus menggunakan krim ini tanpa arahan doktor.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Mengambil Wintosal Cream bersama dengan *salicylates* (ubat tahan sakit) ataupun ubat cair darah (e.g. Warfarin) boleh meningkatkan risiko pendarahan. Simptom-simptom pendarahan adalah seperti:

- Gusi berdarah
- Hidung berdarah
- Lebam
- Air kencing berwarna merah atau jingga
- Sakit kepala
- Batuk darah
- Muntah darah
- Najis berwarna gelap/hitam

Jika anda mengambil warfarin, sila rujuk kepada doktor anda sebelum menggunakan produk ini.

Interaksi lain yang tidak dinyatakan mungkin akan berlaku. Anda boleh berbincang dengan doktor atau ahli farmasi jika mempunyai sebarang masalah lain.

Cara menggunakan Wintosal Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi untuk membantu.

- Bila perlu digunakan

Dewasa, warga tua dan kanak-kanak lebih dari 6 tahun

Sapukan pada kulit dan urut 2-3 kali sehari, lebih baik selepas mandi air panas. Basuh tangan dengan bersih selepas menggunakan krim tersebut.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang telah ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakannya, sapukan krim tersebut sebaik sahaja anda ingat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja menggunakan krim tersebut pada kawasan kulit yang besar dan anda rasa tidak sihat, ataupun menelan krim tersebut, berjumpa dengan doktor segera.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perubatan dengan segera.

Menggunakan terlalu banyak Wintosal Cream mungkin akan menyebabkan:

- Pernafasan yang laju
- Suhu badan yang tinggi
- Sakit atau ketidakselesaan pada bahagian atas badan
- Pening dan muntah
- Kekeliruan
- Sawan

Semasa menggunakan Wintosal Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa menggunakan Wintosal Cream seperti yang telah dinasihati oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu doktor jika:

- Anda akan mula mengambil ubat yang baru
- Anda menjadi hamil

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- berikan ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda.
- mengambil ubat baru tanpa perbincangan dengan doktor atau ahli farmasi anda
- mengambil lebih atau kurang daripada dos yang dicadangkan kecuali ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan menyapu Wintosal Cream pada hidung kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat lain, Wintosal Cream boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini, walaupun bukan semua orang akan mengalami kesan tersebut.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda sedang mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak diingini semasa menggunakan ubat ini seperti:

- Alahan
- Benjolan merah dan bengkak
- Kulit membengkak

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Laporkan kepada doktor anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Wintosal Cream

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak haruslah dilupuskan melalui air buangan atau sisa dari rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Krim legap berwarna hijau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap 5ml mengandungi:

Methyl Salicylate 15.0%w/w

Menthol 2.3%w/w

Camphor 4.0%w/w

- Bahan Tidak Aktif

Chlorophyll 0.10%w/w

Chlorocresol 0.10%w/w

Polyethylene Glycol 4000 0.10%w/w

Eucalyptus Oil 2.00%w/w

Cetamacrogol Emulsifying Wax 25.00%w/w

Polysorbate 80 4.40%w/w

Air Tulen 47%w/w

- Nombor MAL

MAL19911145X

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

May 2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)270519/00137