

HOVID-POVIDONE SOLUTION

Povidone-Iodine (10% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovid-Povidone 10% Solution
2. Bagaimana Hovid-Povidone 10% Solution berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution
4. Cara menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution
5. Semasa menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Povidone 10% Solution
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hovid-Povidone 10% Solution

Hovid-Povidone Solution digunakan sebagai bahan disinfektan dan antiseptik, terutamanya untuk rawatan luka tercemar dan melecet.

Bagaimana Hovid-Povidone 10% Solution berfungsi

Hovid-Povidone 10% Solution mengandungi Povidone-Iodine yang memberikan kesan antibakteria dan antikulat.

Sebelum menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda alah kepada povidone-iodine atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda:

- mempunyai gangguan tiroid.
- merancang untuk menjalani ujian fungsi tiroid.

Mengandung dan menyusu

Sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung,

merancang untuk mengandung, atau sedang menyusukan anak sebelum mengambil sebarang ubat.

Ibu yang mengandung dengan jangkitan faraj tidak sepatutnya dirawat dengan povidone-iodine di kawasan faraj kerana ia boleh menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid dan kekurangan hormon tiroid pada bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan Hovid Povidone 10% sedikit pada bahagian kulit yang dirawat selepas membersihkan bahagian tersebut.

- Bila perlu digunakan

Sapu 1-3 kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

- Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Jangan guna produk ini melebihi 1 minggu, kecuali diarahkan oleh doktor.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan boleh menyebabkan pembentukan lepuh dan keluarnya cecair dengan rasa gatal yang teruk, rasa sakit dengan pedih dan iritasi.

Semasa menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovid-Povidone 10% Solution.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor.
- Jangan menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan sapu pada kulit terluka yang besar, atau mata.
- Jangan sapu ubat dan tutup dengan pembalut kedap air dan udara.
- Jangan memberi Hovid-Povidone 10% Solution kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mempunyai sebarang kesan sampingan, hentikan penggunaan ubat ini dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovid-Povidone 10% Solution boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Povidone-iodine boleh menyebabkan terlalu banyak asid dalam badan, pembesaran kelenjar tiroid, kekurangan atau kelebihan hormon tiroid dan reaksi alergi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Tarikh kemaskini RiMUP
11/08/2023

Nombor Siri
NPRA(R4/1)030823/00063

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovid-Povidone 10% Solution

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada pembekuan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna perang-merah gelap dengan bau iodine

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Povidone-iodine
- Bahan tidak aktif
Polysorbate 20 (Tween 20)
Citric Acid Anhydrous
Disodium Hydrogen Phosphate
Deionised water

- Nombor MAL

MAL19920671XZ

Pengilang

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Perak.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Perak.