

DEXCOPHAN COUGH LINCTUS PLUS

Dextromethorphan hydrobromide/ Ephedrine hydrochloride/ Ammonium chloride (10mg/6.25mg/150mg) dalam setiap 5ml

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dexcophan Cough Linctus Plus
2. Bagaimana Dexcophan Cough Linctus Plus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus
4. Cara menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus
5. Semasa menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dexcophan Cough Linctus Plus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dexcophan Cough Linctus Plus

Dexcophan Cough Linctus Plus digunakan untuk melegakan batuk dan hidung tersumbat.

Bagaimana Dexcophan Cough Linctus Plus berfungsi

Ubat ini mengandungi dextromethorphan, ephedrine dan ammonium chloride. Dextromethorphan bertindak pada pusat batuk dalam otak bagi mengurangkan batuk. Ephedrine mengendurkan otot di paru-paru dan memudahkan pernafasan manakala ammonium bertindak dengan membantu kahak dikeluarkan.

Sebelum menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda mempunyai alahan terhadap dextromethorphan hydrobromide, ephedrine hydrochloride, ammonium chloride atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam bahagian Maklumat Lanjut).

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda sedang mengambil ubat jenis *monoamine oxidase* (MAO) *inhibitor* (ubat untuk kemurungan).

- Sebelum mula mengambil Dexcophan Cough Linctus Plus

Apabila digunakan untuk rawatan batuk dan selesema:

- Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak berusia kurang daripada 2 tahun.
- Gunakan ubat ini dengan nasihat dan pengawasan doktor atau ahli farmasi sekiranya diberikan kepada kanak-kanak berusia antara 2 hingga 6 tahun.

Beritahu doktor/ahli farmasi sekiranya anda mengalami:

- Asma
- Masalah hati, buah pinggang atau jantung
- Kencing manis
- Peningkatan tekanan dalam mata (glaukoma)
- Tekanan darah tinggi
- Tiroid yang terlalu aktif
- Pembesaran prostat

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor jika anda sedang mengambil:

- Guanethidine (ubat darah tinggi).

Beritahu doktor bahawa anda sedang mengambil Dexcophan Cough Linctus Plus jika:

- Anda akan menjalani sebarang pembedahan. Ubat bius boleh meningkatkan kesan Dexcophan Cough Linctus Plus.
- Anda dalam proses bersalin atau sebarang keadaan yang memerlukan anda mengambil ergonovine, methylergonovine,

atau oxytocin (ubat yang mengawal pengecutan rahim).

Cara menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus

- Berapa banyak harus digunakan

Ubat ini untuk diambil secara oral.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa

10ml (2 sudu teh) diambil setiap 4 jam seperti yang diperlukan, tidak melebihi 60ml dalam tempoh 24 jam.

Kanak-kanak

2 hingga 6 tahun: 2.5ml diambil bagi setiap empat jam seperti yang diperlukan, tidak melebihi 15ml dalam tempoh 24 jam.

7 hingga 12 tahun: 5ml (1 sudu teh) diambil bagi setiap empat jam seperti yang diperlukan, tidak melebihi 30ml dalam tempoh 24 jam.

- Bila perlu digunakan

Ambil setiap 4 jam atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Dexcophan Cough Linctus Plus untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan

DEXCOPHAN COUGH LINCTUS PLUS

Dextromethorphan hydrobromide/ Ephedrine hydrochloride/ Ammonium chloride (10mg/6.25mg/150mg) dalam setiap 5ml

keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan loya, muntah, ketidakselesaan perut, pening, khayalan, peningkatan kadar degupan jantung atau masalah pernafasan.

Semasa menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dexcophan Cough Linctus Plus.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Dexcophan Cough Linctus Plus kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai gejala atau penyakit yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan mengendalikan mesin

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika anda berasa pening atau sebarang kesan sampingan lain yang boleh menjejaskan tumpuan atau masa tindak balas anda, anda dinasihatkan untuk mengelak daripada memandu atau mengendalikan jentera berat sehingga anda pasti tentang kesan ubat ini kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dexcophan Cough Linctus Plus boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan yang biasa dengan ubat batuk ini boleh termasuk:

- Loya atau muntah
- Pening
- Sakit kepala
- Hilang selera makan
- Gangguan atau ketidakselesaan di perut

Khusus untuk ephedrine (salah satu bahan aktif), kesan-kesan sampingan lain termasuk:

- Peningkatan kadar degupan jantung
- Keresahan
- Gelisah
- Kesukaran atau gangguan tidur
- Menggeletar kering
- Gangguan peredaran darah pada kaki dan tangan
- Tekanan darah tinggi
- Degupan jantung tidak sekata

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dexcophan Cough Linctus Plus

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhi daripada cahaya.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkus rosak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda

mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna perang gelap dengan perisa anggur hitam.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap 5 ml mengandungi:

Dextromethorphan hydrobromide 10mg;

Ephedrine hydrochloride 6.25mg;

Ammonium chloride 150mg

- Bahan-bahan tidak aktif

Propylene glycol

Sachharin sodium

Citric acid

Carmoisine supra

Sodium benzoate

Liquid caramel

Blackcurrant flavour

Liquid glucose

Syrup simplex

- Nombor MAL:

MAL19900422AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad

121, Jalan Tunku Abdul Rahman

(Jalan Kuala Kangsar),

30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)060324/00030