

VIREST 400MG TABLET

Aciclovir (400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Virest 400mg
2. Bagaimana Virest 400mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Virest 400mg
4. Cara menggunakan Virest 400mg
5. Semasa menggunakan Virest 400mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Virest 400mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Virest 400

Virest 400mg mengandungi bahan aktif yang dipanggil *aciclovir*. Virest 400mg digunakan untuk rawatan jangkitan virus yang disebabkan oleh virus *herpes simplex* (jenis 1 & 2) dan virus *varicella-zoster* (*zoster* & cacar air).

Bagaimana Virest 400 berfungsi

Aciclovir tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antivirals. Ia berfungsi dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan virus.

Sebelum menggunakan Virest 400

- Bila tidak boleh mengambil

- Jangan ambil ubat ini jika anda hipersensitif kepada *aciclovir* atau *ganciclovir*.
- Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusan atau jika bungkusan rosak.

Kehamilan dan penyusuan

Jangan mengambil Virest 400mg jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin mengandung.

Jangan mengambil Virest 400mg jika anda sedang menyusukan bayi.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat ini.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika:

- anda adalah seorang individu dengan penyakit buah pinggang.
- anda seorang individu dengan ketidakseimbangan neurologi
- anda seorang wanita yang mempunyai *herpes genitalis*

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sebelum mengambil ubat ini, beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil sedang mengambil apa-apa ubat lain pada masa yang sama terutamanya *probenecid* (digunakan untuk merawat gout) kerana ia mengubah kepekatan *Aciclovir* dalam darah

Cara menggunakan Virest 400

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

Jangkitan virus herpes genital

Terapi awal: Oral, 200 mg 5 kali sehari selama 10 hari.

Terapi sementara:

Oral, 200 mg 5 kali sehari selama 5 hari.

Terapi bersifat menekan kronik:

Oral, 400 mg dua kali sehari; atau 200 mg 2-5 kali sehari.

Herpes zoster

Oral, 800 mg 5 kali sehari selama 7 hingga 10 hari.

Varicella

Oral, 20 mg bagi setiap kg berat badan, sehingga 800 mg setiap dos, 4 kali sehari selama 5 hari. Rawatan perlu dimulakan pada tanda awal atau gejala cacar air.

Herpes simplex

Oral, 200 hingga 400 mg, 5 kali sehari

selama 10 hari pada individu *immunocompromised*.

Pediatric

Kanak-kanak kurang dari 2 tahun: Dos belum ditentukan bagi kanak-kanak berumur kurang dari 2 tahun.

Kanak-kanak 2 hingga 12 tahun:

Varicella: Oral 20 mg bagi setiap kg berat badan, sehingga 800 mg setiap dos, 4 kali sehari selama 5 hari.

Jika anda mengalami kerosakan buah pinggang, doktor anda akan menyesuaikan dos anda dengan sewajarnya.

Rawatan perlu dimulakan pada tanda awal atau gejala cacar air.

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan pegawai farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau pegawai farmasi untuk membantu

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini selagi ia diberikan kepada anda oleh doktor anda

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau pegawai farmasi anda mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas

VIREST 400MG TABLET

Aciclovir (400mg)

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Oleh kerana tiada penawar khusus, rawatan kesan sampingan dan / atau berlebihan dos harus dilakukan secara simptomatik dan disokong dengan penggunaan berikut:

- Penghidratan yang mencukupi untuk mencegah pemendakan *aciclovir* dalam tubul renal.
- Hemodialisis digunakan bagi membantu dalam penyingkiran *aciclovir* dari darah, terutamanya pada pesakit dengan kegagalan buah pinggang dan anuria (kegagalan untuk menghasilkan air kencing)

Semasa menggunakan Virest 400

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Virest 400.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali telah diberitahu oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin.

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ubat ini membuat anda rasa sakit, pening atau letih, atau memberi anda sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan lain, Virest 400 boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini, walaupun tidak semua orang mendapat kesan tersebut.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut selepas mengambil ubat ini.

Kesan sampingan yang dilaporkan:

- Kegagalan buah pinggang
- Gangguan gastrousus (loya atau muntah-muntah, cirit-birit, sakit perut)
- sakit kepala
- peningkatan urea dan kreatinina dalam darah
- pening
- peningkatan nilai enzim hati
- ruam kulit
- perubahan *encephalopathic* (kelesuan, kekeliruan, gegaran, sawan)
- perubahan hematologi

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor anda dengan cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus dengan melayari npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Virest 400

- Penyimpanan

Jauhkan dari penglihatan kanak-kanak. Simpan dibawah 30°C. Jauhkan dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk heksagon bersalut merah jambu, bermata serong dengan permukaan rata.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap tablet mengandungi: Aciclovir 400 mg

- Bahan Tidak Aktif

- Sodium Starch Glycolate
- Iron Oxide Red
- Microcrystalline Cellulose PH 101
- Kollidon K-30
- Microcrystalline Cellulose pH 102
- Magnesium Stearate.

- Nombor MAL

MAL19971376AZ

Pengilang

HOVID Berhad

Lot 56442, 71/2 Miles, Jalan Ipoh / Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/02/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/1)061119/00307