

GLIMARYL

Glimepiride 2mg

Apakah yang terkandung dalam risalah ini?

1. Apakah kegunaan Glimaryl 2 mg Tablet?
2. Bagaimana Glimaryl Tablet 2 mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Glimaryl Tablet 2 mg
4. Cara menggunakan Glimaryl Tablet 2 mg
5. Semasa menggunakan Glimaryl Tablet 2 mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan perlupusan Glimaryl Tablet 2 mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh semakan
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Glimaryl 2 mg Tablet

Digunakan untuk merawat penyakit kencing manis tahap 2 atau dikenali sebagai 'non-insulin dependent diabetes mellitus' (NIDDM) bagi orang dewasa yang menghadapi tekanan darah tinggi dan tahap gula tidak dapat dikawal melalui senaman atau dengan mengawal pengambilan makanan.

Ia juga digunakan sebagai kombinasi bersama insulin.

Bagaimana Glimaryl 2mg Tablet berfungsi

Ubat ini tergolong dalam kumpulan yang dikenali sebagai *sulphonylureas* dimana ia berfungsi untuk merendahkan tahap gula dalam darah yang tinggi di dalam badan.

Berfungsi dengan meningkatkan jumlah insulin yang dihasilkan oleh pankreas

pesakit.

Sebelum mengambil Glimaryl 2 mg Tablet

Bila anda tidak perlu ambil

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda:

- Alah pada glimepiride atau
- Mana-mana kandungan

bahan-bahan *excipients*

- Sedang mengambil ubat lain bagi untuk merawat penyakit kencing manis
- Menghidapi penyakit kencing manis *Type 1*
- Penghidap penyakit *diabetic ketoacidosis*
- Mempunyai penyakit *diabetic precoma/coma*
- Penghidap *severe liver or kidney impairment*
- Sedang hamil atau sedang menyusukan bayi

Sebelum mengambil Glimaryl 2mg Tablet

Maklumkan kepada doctor sekiranya anda:

- Alah kepada mana-mana ubat lain, bahan makanan, pewarna atau pengawet
- Menghidapi penyakit hati
- Mempunyai masalah pada buah pinggang
- Mempunyai penyakit kencing manis yang tidak stabil
- Pernah mengalami masalah pada adrenal, pituitari atau tiroid
- Telah mengalami *glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency*

- Minum minuman beralkohol
- Tidak makan mengikut waktu yang tetap
- Sering melakukan banyak senaman/atau senaman atau kerja yang berat
- Sakit atau berasa kurang sihat

Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi Glimepiride.

Ia termasuk :

- Alkohol
- Ubat mengawal kencing manis yang lain
- *anabolic steroids, corticosteroids and male sex hormones*
- Beberapa jenis antibiotik
- Beberapa jenis ubat anti kemurungan
- Beberapa jenis ubat anti-radang
- Beberapa jenis ubat yang digunakan untuk merawat *arthritis* dan *gout*
- *beta-blockers* dan *ACE inhibitors*
- sesetengah *anti-coagulants* seperti *coumarin derivatives*
- Beberapa jenis ubat yang berfungsi untuk mengurangkan kandungan kolesterol dan berat badan
- Beberapa jenis ubat kanser dan anda sedang menjalani

GLIMARYL

Glimepiride 2mg

- rawatan pemindahan organ
- *Glucagons*
 - Ubat perancang hamil
 - Beberapa jenis ubat yang berfungsimerawat *asthma* dan batuk
 - cecair dan ubat-ubatan bagipenghidap *glaucoma*
 - Julap
 - Beberapa jenis ubat bagi pesakitpsikiatri dan *sedatives*

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Bagaimana cara untuk mengambil Glimaryl 2mg Tablet

Berapa banyak perlu diambil

Dos permulaan ialah sebanyak 1 hingga 2 mg sekali sehari. Dos pengekalan adalah sebanyak 1 hingga 4 mg sekali sehari. Dos maksimum yang dicadangkan adalah 8 mg sekali sehari.

Bila perlu diambil

Glimaryl 2mg Tablet perlu diambil bersama sarapan pagi atau hidangan utama yang pertama.

Berapa lama perlu diambil

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini seperti yang telah ditetapkan oleh doktor.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya.

Jangan ambil dos berganda bagi menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda mungkin mengalami *hypoglycaemia* yang teruk dan boleh mengancam nyawa.

Hubungi doktor dengan segera setelah anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan.

Semasa anda sedang mengambil Glimaryl 2mg Tablet

Perkara yang perlu anda lakukan

Kenal pasti tanda-tanda dan gejala gula darah rendah (*hypoglycaemia*) dan gula dalam darah tinggi (*hyperglycaemia*).

Tanda-tanda awal *hypoglycaemia*:

- Lemah, menggeletar atau menggigil
- Berpeluh
- Pening, sakit kepala atau kurangnya tumpuan
- Cepat marah, sebak atau menangis
- Kelaparan
- Kebas di sekitar kawasan bibir dan lidah

Ini mungkin akan membawa kepada perkara berikut:

- Hilang koordinasi
- Pertuturan tidak jelas
- Kekeliruan
- sawan atau hilang kesedaran.

Tanda-tanda *hyperglycaemia*:

- Kerap membuang air kecil
- Rasa dahaga yang meningkat
- Sentiasa berasa lapar.

Beritahu doktor jika:

- Anda akan mengambil ubat baru semasa anda sedang mengambil Glimaryl 2mg Tablet
- Anda akan menjalani pembedahan
- Anda hamil ketika mengambil ubat ini
- Anda akan menjalani sebarang ujian darah

Perkara yang tidak boleh anda lakukan:

Jangan:

- Berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda penyakit yang sama seperti anda alami.
- Ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi
- Berhenti dari mengambil ubat ini atau menukar dos yang telah ditetapkan dengan sesuka hati tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu
- Mengambil ubat ini tanpa makanan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Alkohol

GLIMARYL

Glimepiride 2mg

Berhati-hati apabila anda meminum alkohol semasa mengambil ubat ini. Anda boleh meningkatkan tanda-tandagejala *hypoglycaemia*:

- Memandu atau sedang mengendalikan mesin

Anda mungkin akan berasa pening, ringan kepala dan letih sekiranya paras gula dalam darah anda turun terlalu rendah. Berhenti memandu atau menggunakan mesin jika anda mengalami masalah ini.

Kesan Sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diinginkan. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan-kesan yang mungkin:

- Gejala *hypoglycaemia* mungkin berlaku dan berpanjangan, contohnya. sakit kepala, pening, gegaran, lapar yang keterlaluan, kekurangan tumpuan, mengigau, dan hilang kawalan diri
- Masalah pada mata; seperti penglihatan menjadi kabur
- Gangguan pada gastrointestinal tract problems seperti rasa loya, muntah, rasa kenyang di *epigastrium*, sakit perut dan cirit-birit.

- Gejala seperti gangguan dalam pengawalan sistem *adrenergic* seperti berpeluh sejuk, kulit lembab dan dingin, kebimbangan, *tachycardia*, tekanan darah tinggi, berdebar-debar, *angina pectoris* (sakit di tengah-tengah dada) dan *cardiac arrhythmias* (denyutan jantung yang tidak normal).

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau tindak balas advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melayari laman web npra.gov.my [Pengguna → Melaporkan Kesan Sampingan kepada Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Glimaryl 2mg Tablet Maklumat lanjut

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Rupa dan bentuk produk

Glimaryl 2mg Tablet adalah

berbentuk bujur, berwarna hijau burik dan tidak bersalut, berpinggir serong, permukaan rata, dengan bar pecah pada satu muka dan cetakkan timbul "Hovid" pada permukaan yang lain.

Bahan kandungan

Setiap tablet mengandungi Glimepiride 2 mg.

Bahan excipient

Microcrystalline Cellulose Sodium Starch Glycolate Talc Iron Oxide Yellow Magnesium Stearate. Sodium Lauryl Sulphate Fd & C Blue No.2 (Dispersed Blue) Lactose

Nombor MAL:

MAL06061328AZ

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7 1/2 Miles, Jalan Ipoh/Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar) 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh semakan:

14/11/2023

Nombor siri:

NPRA(R2/1)231227/1188