

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan hovid-Escitalopram
2. Bagaimana hovid-Escitalopram berfungsi
3. Sebelum menggunakan hovid-Escitalopram
4. Cara menggunakan hovid-Escitalopram
5. Semasa menggunakan hovid-Escitalopram
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan hovid-Escitalopram
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

## Apakah kegunaan hovid-Escitalopram

hovid-Escitalopram mengandungi escitalopram dan digunakan untuk merawat:

- kemurungan
- kecelaruan panik dengan atau tanpa *agoraphobia* (takut terhadap ruang awam atau terbuka)
- kecelaruan keresahan sosial (*social phobia/social anxiety disorder*) (takut atau elak daripada situasi yang melibatkan aktiviti sosial)
- kecelaruan keresahan menyeluruh (*generalised anxiety disorder*) (lazimnya resah atau gementar walaupun tiada sebab untuk risau sebegini)
- kecelaruan obsesif kompulsif (*obsessive compulsive disorder*, OCD) (pemikiran keterlaluan dan berterusan yang membawa kepada tingkah laku berulang-ulangan)

## Bagaimana hovid-Escitalopram berfungsi

hovid-Escitalopram mengandungi escitalopram sebagai bahan aktif. hovid-Escitalopram tergolong dalam kumpulan antidepresan yang dipanggil selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ubat-ubatan ini bertindak ke atas sistem serotonin di dalam otak dengan meningkatkan tahap serotonin. Gangguan dalam sistem serotonin dianggap sebagai faktor penting dalam menyebabkan kemurungan dan penyakit yang berkaitan.

## Sebelum menggunakan hovid-Escitalopram

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakannya:

- jika anda alah kepada escitalopram atau bahan lain terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam seksyen **Maklumat Lanjut**).
- jika anda mengambil ubat-ubatan lain yang tergolong dalam kumpulan yang dikenali sebagai *monoamine oxidase inhibitors* (MAOI) (lihat *Jika mengambil ubat-ubat lain*). Mengambil hovid-Escitalopram dengan MAOI mungkin boleh menyebabkan satu reaksi yang serius, kadang-kala membawa maut, dengan ciri-ciri yang menyerupai sindrom serotonin (lihat seksyen *Kesan-kesan Sampingan*).
- pada masa yang sama mengambil pimozone (digunakan untuk merawat kecelaruan mental atau kecelaruan sistem saraf).

- Sebelum mula menggunakan hovid-Escitalopram

Sila beritahu doktor anda jika anda

mempunyai keadaan atau penyakit lain. Doktor anda mungkin perlu mengambil kiranya. Khususnya, beritahu doktor anda: jika anda mempunyai sawan. Rawatan dengan hovid-Escitalopram harus dihentikan jika berlaku sawan untuk kali pertama, atau jika terdapat peningkatan dalam kekerapan sawan (lihat juga seksyen **Kesan-kesan sampingan**).

- jika anda mengalami fungsi hati atau buah pinggang terjejas. Doktor anda mungkin perlu menyesuaikan dos anda.
- jika anda mempunyai diabetes. Rawatan dengan hovid-Escitalopram boleh mengubah kawalan glisemik. Insulin dan/atau dos hipoglisemik mungkin perlu diselaraskan.
- jika anda mempunyai aras natrium yang rendah dalam darah.
- jika anda mempunyai kecenderungan pendarahan atau lebam.
- jika anda sedang menerima rawatan elektrokonvulsif (*electroconvulsive therapy*, ECT)(lazimnya untuk kemurungan serius).
- jika anda mempunyai penyakit jantung koronari. [lihat juga subseksyen *Perkara yang perlu diberi perhatian*]
- jika anda mempunyai sejarah mania (keterangsangan yang tidak terkawal, menyebabkan tingkah laku yang luar biasa) atau hipomania (keadaan yang sama dengan mania tetapi kurang serius)
- jika anda mempunyai sejarah berkenaan dengan bunuh diri
- jika anda mengandung, menyusu atau merancang untuk hamil

Jika anda mengambil hovid-Escitalopram pada tempoh terakhir mengandung peningkatan risiko pendarahan vagina yang teruk

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

selepas bersalin mungkin terjadi, terutamanya jika anda mempunyai sejarah gangguan pendarahan. Doktor anda perlu diberitahu yang anda sedang mengambil hovid-Escitalopram supaya meraka boleh memberi nasihat kepada anda.

## - Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, baru-baru ini telah mengambil atau mungkin mengambil ubat lain, termasuk:
  - *Non-selective* MAOI yang mengandungi phenelzine, iproniazid, isocarboxazid, nialamide, dan tranlycypromine sebagai bahan aktif. Jika anda telah mengambil mana-mana ubat ini, anda perlu menunggu selama 14 hari sebelum anda memulakan hovid-Escitalopram. Selepas menghentikan hovid-Escitalopram anda mesti menunggu selama 7 hari sebelum mengambil ubat-ubatan jenis ini.
  - *Reversible, selective MAO-A inhibitors*, misalnya moclobemide (untuk merawat kemurungan).
  - *Irreversible MAO-B inhibitors*, misalnya selegiline (untuk merawat penyakit Parkinson).
  - Lithium (rawatan gangguan manikkemurungan) dan *tryptophan* (sejenis asid amino).
  - Desipramine (untuk merawat kemurungan).
  - Sumatriptan dan ubat-ubatan yang serupa (merawat migrain) dan tramadol (untuk kesakitan yang teruk). Ini meningkatkan risiko kesan sampingan.
  - Cimetidine dan omeprazole (merawat ulser perut), fluvoxamine (antidepresan) dan ticlopidine (untuk mengurangkan risiko strok).

Ini boleh menyebabkan tahap hovid- Escitalopram dalam darah meningkat.

- St John's wort (*Hypericum perforatum* - ubat herba untuk kemurungan).
- Acetylsalicylic acid, ubat anti-radang bukan steroid (NSAID), warfarin, dipyridamole dan phenprocoumon (untuk melegakan kesakitan atau menipiskan darah). Ini boleh meningkatkan kecenderungan berlakunya pendarahan.
- Mefloquin (merawat Malaria), bupropion (merawat kemurungan) dan tramadol (merawat kesakitan teruk) disebabkan oleh risiko yang mungkin menurunkan ambang untuk sawan.
- Ubat neuroleptik (merawat kecelaruan mental) dan antidepresan disebabkan oleh risiko yang mungkin menurunkan ambang untuk sawan.
- Flecainide, propafenone, dan metoprolol (untuk penyakit kardiovaskular), clomipramine dan nortriptyline (antidepresan), dan risperidone, thioridazine, dan haloperidol (antipsikotik). Dos hovid- Escitalopram mungkin perlu diselaraskan.

## **Cara menggunakan hovid-Escitalopram**

Sentiasa mengambil ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Jika tidak pasti, semak dengan doktor atau ahli farmasi anda

## - Berapa banyak harus digunakan Dewasa

### -Kemurungan

Dos biasa yang dicadangkan untuk hovid-Escitalopram ialah 10 mg, sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan oleh doktor anda sehingga mencapai

maksima 20 mg sehari.

## Gangguan panik

Dos permulaan hovid-Escitalopram adalah 5 mg sekali sehari untuk minggu pertama sebelum ditingkatkan kepada 10 mg setiap hari. Dos boleh ditingkatkan lagi oleh doktor anda sehingga maksimum 20 mg setiap hari.

## Gangguan keseimbangan sosial

Dos biasa yang dicadangkan untuk hovid- Escitalopram ialah 10 mg sekali sehari. Doktor anda boleh mengurangkan dos kepada 5 mg sehari atau meningkatkan dos kepada maksimum 20 mg sehari bergantung kepada kesan anda bertindak balas terhadap ubat.

## Gangguan keseimbangan am

Dos biasa yang dicadangkan ialah 10mg sekali sehari. Dos boleh ditambah oleh doktor anda sehingga maksimum 20mg setiap hari.

## Gangguan obsesif-kompulsif

Dos biasa yang dicadangkan untuk hovid- Escitalopram ialah 10 mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan oleh doktor anda sehingga maksimum 20 mg setiap hari.

## Pesakit warga tua (melebihi 65 tahun)

Dos permulaan yang dicadangkan adalah separuh daripada dos biasa yang disyorkan dan dos maksimum yang lebih rendah.

## Kegunaan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja

hovid-Escitalopram biasanya tidak diberikan kepada kanak-kanak dan remaja (lihat subseksyen *Perkara yang perlu diberi perhatian*).

## - Bila perlu digunakan

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

Anda boleh mengambil hovid-Escitalopram dengan atau tanpa makanan. Telan tablet dengan air.

Seperti ubat-ubatan lain, kombinasi hovid-Escitalopram dengan alkohol tidak digalakkan. Namun begitu, hovid-Escitalopram tidak dijangka akan berinteraksi dengan alkohol.

## - Berapa lama perlu digunakan

Ia mungkin mengambil masa beberapa minggu sebelum anda mula berasa pulih. Teruskan mengambil hovid-Escitalopram selagi doktor anda mencadangkannya, walaupun ia mengambil sedikit masa sebelum anda merasa penambahbaikan dalam keadaan anda.

Jika anda berhenti rawatan anda terlalu cepat, gejala-gejala anda mungkin kembali. Ia adalah dicadangkan bahawa rawatan perlu diteruskan selama sekurang-kurangnya 6 bulan selepas anda rasa sihat semula.

## - Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Jika anda terlupa untuk mengambil dos, dan anda teringat sebelum tidur, ambil dos dengan serta-merta. Teruskan pengambilan seperti biasa pada hari berikutnya. Jika anda hanya teringat pada waktu malam, atau pada hari berikutnya, abaikan dos yang tertinggal dan teruskan seperti biasa.

## - Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)

Jika anda mengambil hovid-Escitalopram lebih daripada dos yang

ditetapkan, hubungi doktor anda atau jabatan kecemasan hospital terdekat dengan segera. Sila buat demikian walaupun tiada apa-apa tanda ketidakselesaan berlaku.

Sebahagian daripada tanda-tanda dos berlebihan adalah pening, menggeletar, kegelisahan, sawan, koma, mual, muntah, perubahan dalam ritma jantung, penurunan tekanan darah dan perubahan keseimbangan bendalir/garam tubuh. Bawa bekas hovid-Escitalopram dengan anda apabila anda pergi ke doktor atau hospital.

## **Semasa menggunakan hovid-Escitalopram**

### - Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil hovid-Escitalopram seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil hovid-Escitalopram.
- Beritahu doktor dengan serta-merta jika anda mengandungi semasa mengambil hovid-Escitalopram.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil hovid-Escitalopram tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berhenti mengambil hovid-Escitalopram sehingga diarahkan oleh doktor. Apabila anda telah selesai rawatan, adalah dinasihatkan bahawa dos hovid-Escitalopram diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh beberapa minggu. Apabila anda berhenti mengambil hovid-Escitalopram, terutamanya jika ia dihentikan secara tiba-tiba, anda mungkin merasa gejala

pemberhentian. Kebanyakan orang mendapati bahawa gejala-gejalanya adalah ringan dan akan hilang sendiri dalam dua minggu. Namun, sesetengah pesakit boleh mendapat gejala yang lebih serius dan berpanjangan (2-3 bulan atau lebih). Jika anda mendapat gejala pemberhentian yang serius apabila anda berhenti mengambil hovid-Escitalopram, hubungi doktor anda dan dia mungkin akan mengarahkan anda untuk mengambil hovid-Escitalopram semula dan memberhentikanannya secara lebih perlahan.

Gejala pemberhentian termasuk: Rasa pening (tidak mantap atau tidak seimbang), perasaan kesemutan, sensasi panas dan (lebih jarang) sensasi kejutan elektrik, termasuk dalam kepala, gangguan tidur (mimpi yang jelas, mimpi buruk, kepayahan tidur), kegelisahan, sakit kepala, rasa loya, berpeluh (termasuk berpeluh malam), rasa resah atau gelisah, menggeletar, rasa keliru atau tidak berorientasi, beremosi atau lekas marah, cirit-birit (najis cair), gangguan penglihatan, *fluttering* atau debaran degupan jantung (palpitasi).

Ubat ini telah dipreskripsikan kepada anda. Jangan memberikannya kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun gejala-gejala mereka adalah sama seperti anda.

## - Perkara yang perlu diberi perhatian *Mengandung, menyusu dan kesuburan*

Jangan mengambil hovid-Escitalopram jika anda sedang mengandung atau menyusu, melainkan jika anda dan doktor anda

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

telah membincangkan risiko dan manfaat yang terlibat. Sila pastikan bidan dan/atau doktor anda tahu bahawa anda sedang mengambil hovid-Escitalopram. Jika ia digunakan semasa mengandung, hovid-Escitalopram tidak harus dihentikan secara tiba-tiba.

Jika anda mengambil hovid-Escitalopram semasa kehamilan, anda perlu tahu bahawa kesan berikut mungkin boleh dilihat pada bayi anda yang baru lahir: masalah dengan pernafasan, kulit kebiru-biruan, sawan, perubahan suhu badan, kesukaran untuk memberi makan, muntah, aras gula darah rendah, otot kaku atau liut, tindak balas yang jelas, menggeletar, terketar-ketar, lekas marah, lesu, menangis berterusan, mengantuk dan kesukaran tidur. Apabila ia diambil semasa hamil, ubat-ubatan seperti hovid-Escitalopram boleh meningkatkan risiko yang serius dalam kalangan bayi, iaitu hipertensi pulmonari berulangan (*persistent pulmonary hypertension, PPHN*) dalam bayi baru lahir, menyebabkan bayi bernafas lebih cepat dan kelihatan kebiru-biruan. Gejala-gejala ini biasanya bermula dalam 24 jam pertama selepas bayi dilahirkan.

Jika ini berlaku pada bayi anda, anda perlu menghubungi bidan anda dan/atau doktor dengan segera. Ia dijangka bahawa hovid-Escitalopram akan dialirkan melalui susu ibu. Penyusuan susu ibu semasa rawatan tidak digalakkan.

Citalopram, sejenis ubat seperti escitalopram, telah ditunjukkan boleh mengurangkan kualiti sperma dalam

kajian haiwan. Secara teorinya, ini boleh menjejaskan kesuburan, tetapi kesan pada kesuburan manusia tidak diperhatikan lagi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat-ubatan.

## *Kanak-kanak dan remaja*

hovid-Escitalopram biasanya tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun. Di samping itu, anda perlu tahu bahawa pesakit di bawah 18 lebih berisiko terhadap kesan sampingan seperti percubaan bunuh diri, pemikiran membunuh diri dan permusuhan (terutamanya bersifat agresif, tingkah laku membangkang dan kemarahan) apabila mereka mengambil ubat kelas ini. Namun, doktor anda boleh mempreskripsikan hovid-Escitalopram untuk pesakit di bawah 18 jika dia memutuskan bahawa ini adalah demi kepentingan mereka. Jika doktor anda telah mempreskripsikan hovid-Escitalopram untuk pesakit berusia bawah 18 tahun dan anda ingin membincangkan perkara ini, sila rujuk kepada doktor anda. Anda perlu memberitahu doktor anda jika sebarang tanda yang disenaraikan di atas ditingkatkan atau bertambah buruk apabila pesakit di bawah 18 mengambil hovid-Escitalopram. Tambahannya, kesan keselamatan jangka panjang mengenai pertumbuhan, kematangan dan perkembangan kognitif dan tingkah laku untuk hovid-Escitalopram dalam kumpulan umur ini belum lagi diketahui.

*Memandu dan menggunakan mesin*  
Anda dinasihatkan untuk tidak

memandu kereta atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana hovid-Escitalopram memberi kesan kepada anda.

## *Sila ambil perhatian*

Sesetengah pesakit dengan penyakit manikkemurungan boleh menjadi fasa manik. Ini dicirikan oleh idea yang luar biasa dan pesat berubah, kegembiraan yang tidak sesuai dan aktiviti fizikal yang berlebihan. Jika anda mengalami ini, hubungi doktor anda. Gejala seperti kegelisahan atau kesukaran untuk duduk atau berdiri masih juga boleh berlaku semasa minggu pertama rawatan. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami gejala-gejala ini.

## *Pemikiran membunuh diri dan kemurungan yang semakin teruk atau kecelaruan keresahan*

Jika anda kemurungan dan/atau mempunyai kecelaruan keresahan, kadang-kala anda mungkin mempunyai pemikiran untuk mencederakan atau membunuh diri. Pemikiran ini mungkin dipertingkatkan apabila baru memulakan antidepresan. Ini adalah kerana semua ubat mengambil masa untuk memberi kesan, biasanya dua minggu tetapi kadang-kala lebih lama. Anda mungkin lebih cenderung untuk berfikir seperti ini:

- jika anda pernah mempunyai pemikiran untuk membunuh/mencederakan diri sendiri.
- jika anda seorang dewasa muda. Maklumat dari ujian klinikal telah menunjukkan peningkatan risiko membunuh diri dalam kalangan orang dewasa muda (berumur < 25

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

tahun) dengan keadaan psikiatri yang dirawat dengan antidepresan.

Jika anda mempunyai pemikiran mencederakan atau membunuh diri pada bila-bila masa, hubungi doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera.

Anda mungkin mendapati ia membantu dengan memberitahu saudara atau rakan rapat anda, bahawa anda kemurungan atau mempunyai masalah kerunsingan, dan minta mereka membaca risalah ini. Anda boleh meminta mereka untuk memberitahu anda jika mereka merasakan bahawa kemurungan atau kerunsingan anda semakin teruk, atau jika mereka bimbang tentang perubahan tingkah laku anda.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Kesan sampingan selalunya hilang selepas beberapa minggu rawatan. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan kesan mungkin adalah gejala penyakit anda dan ia akan bertambah baik apabila anda mula pulih.

Jumpa doktor anda dengan segera jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan yang berikutnya semasa rawatan:

### Luar biasa:

- pendarahan luar biasa, termasuk pendarahan gastrousus

### Jarang:

- Jika anda mengalami bengkak pada kulit, lidah, bibir, atau muka,

mempunyai kesukaran bernafas atau menelan (reaksi alahan), hubungi doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera.

- Jika anda mengalami demam panas, kegelisahan, kekeliruan, menggeletar dan pengecutan otot secara mendadak, ini mungkin menjadi tanda-tanda keadaan yang jarang berlaku yang dipanggil sindrom serotonin. Jika anda berasa seperti ini hubungi doktor anda.

### Tidak diketahui:

- Kesukaran membuang air kecil
- Sawan
- Kekuningan pada kulit dan mata putih ialah tanda kemerosotan fungsi hati / hepatitis

Selain daripada kesan sampingan di atas, kesan-kesan sampingan yang berikut mungkin berlaku:

### Sangat biasa:

- Rasa loya

### Biasa:

- Hidung tersumbat atau berair (sinusitis)
- Pengurangan atau peningkatan selera makan
- Kebimbangan, kegelisahan, mimpi yang tidak normal, masalah kepayahan tidur, mengantuk, pening, menguap, gegaran, kulit terasa mencucuk
- Cirit-birit, sembelit, muntah, mulut kering
- Peningkatan perpeluhan
- Sakit pada otot dan sendi (arthralgia dan

myalgia)

- Gangguan seksual (panjutan lambat, masalah ereksi, perasaan seksual berkurang dan wanita mungkin mengalami kegagalan untuk mencapai puncak syahwat (orgasma))
- Keletihan, demam
- Peningkatan berat badan

### Luar biasa:

- Ruam *nettle* (urtikaria), ruam, gatal-gatal
- Pengisaran gigi, kegelisahan, ketakutan, serangan panik, keadaan kekeliruan
- Gangguan tidur, perubahan rasa, pengsan
- Anak mata membesar (*mydriasis*), gangguan penglihatan, dering dalam telinga (*tinnitus*)
- Keguguran rambut
- Pendarahan haid yang berlebihan
- Tempoh haid yang tidak teratur
- Berat badan susut
- Degupan jantung yang cepat
- Bengkak pada bahagian tangan atau kaki
- Hidung berdarah

### Jarang:

- Bersifat agresif, depersonalisasi (perasaan yang tidak nyata dan keganjilan mengenai diri atau alam sekitar), angan-angan (mendengar suara atau melihat benda yang tidak wujud)
- Denyutan jantung perlahan

*Tidak diketahui (kekerapan tidak boleh dianggarkan daripada data yang sedia ada):*

- Pemikiran mencederakan diri atau membunuh diri (lihat seksyen *Perkara yang perlu diberi perhatian*)
- Penurunan aras natrium dalam

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

darah (tanda-tanda rasa sakit dan tidak sihat dengan otot yang lemah ataupun kekeliruan)

- Pening apabila anda berdiri, akibat tekanan darah rendah (*orthostatic hypotension*)
- Ujian fungsi hati tidak normal (peningkatan enzim hati dalam darah)
- Gangguan pergerakan (pergerakan otot tidak terkawal)
- Ereksi yang menyakitkan (*priapism*)
- Kecelaruhan pendarahan termasuk kulit dan pendarahan mukosa (*ecchymosis*) dan aras platelet rendah dalam darah (*thrombocytopenia*)
- Bengkak pada kulit atau mukosa (*angioedemas*) secara tiba-tiba
- Peningkatan jumlah air kencing yang (rembesan ADH yang tidak sesuai)
- Aliran susu dalam kalangan lelaki dan wanita yang tidak menyusu
- Mania
- Peningkatan risiko keretakan tulang telah diperhatikan dalam kalangan pesakit yang mengambil ubat- ubatan jenis ini.

Di samping itu, beberapa kesan sampingan telah diketahui berlaku dengan ubat yang berfungsi dengan cara yang serupa seperti escitalopram (bahan aktif hovid- Escitalopram). Ini adalah:

- Kegelisahan motor (*akathisia*)
- Anoreksia

Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuklah kesan sampingan yang mungkin tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web

[npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan dan pelupusan hovid-Escitalopram

### - Penyimpanan

Simpan ubat ini jauh dari penglihatan dan pencapaian kanak-kanak. Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada label atau kotak selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut. Simpan di bawah 30°C.

### - Pelupusan

Jangan buang apa-apa ubat-ubatan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat- ubatan anda yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat Lanjut

### - Rupa dan warna produk

hovid-Escitalopram Tablet 10 mg: bujur, tablet putih bersalut selaput, cembung, tablet bergaris tengah pada satu bahagian tablet.

hovid-Escitalopram Tablet 20 mg: bujur, tablet putih bersalut selaput, cembung, tablet bergaris tengah dan ditandakan dengan “H”, “D” pada satu bahagian tablet

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap tablet hovid-Escitalopram mengandungi 10 mg, atau 20 mg escitalopram (sebagai oxalate).

- Bahan tidak aktif

Teras: microcrystalline cellulose, povidone, croscarmellose sodium, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluenem, colloidal silicon dioxide, talc, magnesium stearate, Isopropyl alcohol

Salut: hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, talc, propylene glycol

### - MAL number:

10mg: MAL18016156AZ

20mg: MAL18016157AZ

## Pengilang

HOVID Berhad  
Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan Ipoh/  
Chemor, 31200 Chemor, Perak,  
Malaysia.

## Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Berhad  
121, Jalan Tunku Abdul Rahman  
(Jalan Kuala Kangsar),  
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

- 17/01/2025

## Nombor Siri

NPRA(R2/2)250121/1410

---

# HOVID-ESCITALOPRAM TABLET

Escitalopram (sebagai oxalate) (10mg, 20mg)

---