

HOVID-VALPROATE LIQUID 200MG/5ML

Sodium Valproate (200mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan hovid Valproate Liquid
2. Bagaimana hovid Valproate Liquid berfungsi
3. Sebelum menggunakan hovid Valproate Liquid
4. Cara menggunakan hovid Valproate Liquid
5. Semasa menggunakan hovid Valproate Liquid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan hovid Valproate Liquid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan hovid Valproate Liquid

hovid Valproate Liquid digunakan sebagai rawatan epilepsi (sawan) menyeluruh (menjejaskan keseluruhan otak) atau epilepsi separa (mempengaruhi sebahagian kecil otak) dengan gejala sawan seperti berikut:

- Pitam (tidak sedar secara tiba-tiba)
- *Myoclonic* (pergerakan otot secara tiba-tiba yang sekejap, seperti terkejut)
- Tonic-clonic (otot menjadi kaku dan pergerakan otot secara tiba-tiba)
- *Atonic* (otot tidak berdaya)
- Gejala yang bercampur
- Sawan yang mudah (kesedaran masih ada) atau kompleks (tidak sedar)
- Sawan menyeluruh yang kedua (merebak ke kedua-dua bahagian otak selepas serangan pertama)
- Gejala spesifik (*Wes, Lennox-Gastaut*)

Hovid Valproate Liquid juga boleh digunakan untuk mengawal gejala bipolar, keadaan mental dengan gejala mania (perubahan angin).

Bagaimana hovid Valproate Liquid berfungsi

Valproate Liquid mengandungi ubat yang dipanggil *sodium valproate*. Ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai agen antikonvulsan atau anti-epilepsi.

Ubat ini dianggap berfungsi dengan mengawal bahan kimia otak yang

menghantar isyarat kepada saraf supaya sawan tidak berlaku.

Sebelum menggunakan hovid Valproate Liquid

AMARAN KEPADA WANITA DAN PEREMPUAN

Sebelum anda menggunakan
Ubat ini akan memudaratkan bayi yang belum lahir secara serius.

Sentiasa menggunakan kontraseptif yang berkesan ketika menggunakan rawatan dengan *sodium valproate*.

Jika anda rasa akan hamil, atau sedang hamil, hubungi doktor anda dengan segera.

Anda perlu TERUSKAN penggunaan *sodium valproate*, melainkan doktor mengarahkan anda untuk berhenti.

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda alah kepada *sodium valproate* atau mana-mana bahan-bahan lain hovid Valproate Liquid yang disenaraikan dalam risalah ini.
- Anda mempunyai masalah hati atau keluarga anda mempunyai sejarah masalah hati.
- Anda mempunyai penyakit yang jarang berlaku dipanggil profiria (gangguan berkaitan dengan masalah penghasilan *haem* dalam badan anda. (*Haem* digunakan untuk menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah).
- Anda mempunyai gangguan mitokondria (Sindrom *Alpers-Huttenlocher*).

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mengambil ubat ini, bincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan hovid Valproate Liquid

Beritahu doktor anda jika:

- Sedang hamil.
- Wanita yang boleh hamil tidak boleh ambil *sodium valproate* melainkan anda menggunakan kaedah kawalan kehamilan yang berkesan (kontraseptif) sepanjang menggunakan rawatan dengan *sodium valproate*.

- Fungsi hati anda terjejas.
- Anda mengalami penyakit pankreatitis.
- Mempunyai fikiran atau idea untuk membunuh diri.
- Anda sedang mengambil ejen *Carbapenem*.
- Anda mempunyai gangguan mitokondria (Sindrom *Alpers-Huttenlocher*).
- Fungsi buah pinggang anda terjejas.
- Anda mempunyai penyakit dikenali sebagai "*systemic lupus erythematous (SLE)*" – sejenis penyakit imun yang memberi kesan pada kulit, tulang, sendi dan organ dalaman anda.
- Anda mempunyai penyakit 'gangguan kitaran urea' iaitu terlalu banyak ammonia berkumpul di dalam badan.
- Anda mempunyai kencing manis. Ubat ini boleh menjejaskan ujian air kencing anda.

Jika anda tidak pasti mana-mana situasi berkenaan dengan anda, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum anda mengambil hovid Valproate Liquid.

Mengambil hovid Valproate Liquid

dengan minuman alkohol: Pengambilan alkohol adalah tidak digalakkan semasa rawatan anda dengan ubat ini.

Ujian darah: Doktor anda mungkin akan menjalankan ujian darah keatas anda sebelum anda mengambil hovid Valproate Liquid dan semasa rawatan anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat-ubatan berikut akan meningkatkan kebarangkalian anda mendapat kesan sampingan apabila anda mengambilnya dengan hovid Valproate Liquid:

- Ubat yang digunakan untuk rawatan sakit dan keradangan seperti *aspirin*.
- Ubat yang digunakan untuk merawat sawan (epilepsi) seperti *phenobarbital, primidone, phenytoin, carbamazepine, topiramate, lamotrigine* dan *felbamate*.

Hovid Valproate Liquid mungkin akan meningkatkan kesan ubat-ubatan berikut:

- Ubat yang digunakan untuk mencairkan darah (seperti *warfarin*).

HOVID-VALPROATE LIQUID 200MG/5ML

Sodium Valproate (200mg/5ml)

- *Zidovudine* digunakan untuk merawat jangkitan HIV.
- *Temozolomide* digunakan untuk merawat kanser.
- Ubat untuk merawat kemurungan.
- *Monoamine oxidase inhibitors* (MAOI) seperti *moclobemide*, *selegiline*, *linezolid*.
- Ubat yang digunakan untuk menenangkan emosi dan mental seperti *diazepam*.

Ubat-ubatan berikut boleh mempengaruhi fungsi hovid Valproate Liquid:

- Ubat yang digunakan untuk mencegah dan merawat malaria seperti *mefloquine* dan *chloroquine*.
- *Cimetidine* digunakan untuk merawat ulser perut.
- Sesetengah ubat digunakan untuk merawat jangkitan (antibiotik) seperti *rifampicin* dan *erythromycin*.
- Ejen *Carbapenem* (antibiotik) digunakan untuk merawat jangkitan bakteria) seperti *imipenem*, *meropenem* dan *panipenem*. Hovid Valproate Liquid dan ejen *Carbapenem* tidak boleh diambil bersama-sama kerana ia boleh mengurangkan kesan ubat anda.
- *Colestyramine* digunakan untuk menurunkan tahap lemak dalam darah anda (kolesterol).

Sesetengah ubat dan *sodium valproate* mungkin berinteraksi sesama sendiri, ini termasuk *propofol* (ubat bius). Beritahu doktor anda sekiranya anda sedang mengambil hovid Valproate Liquid dan akan menjalani pembedahan.

Cara menggunakan hovid Valproate Liquid

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini, jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk pada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa (termasuk warga tua): Dos harian adalah 1000 – 2000mg/kg/sehari.

Dos permulaan adalah 600 mg setiap hari. Doktor anda akan meningkatkan dos anda secara beransur-ansur iaitu 200 mg setiap 3 hari berdasarkan kepada keadaan anda. Dos biasanya di antara 1000 mg dan 2000

mg (20-30 mg setiap kilogram berat badan) setiap hari. Ini mungkin boleh meningkat ke 2500 mg setiap hari berdasarkan kepada penyakit anda.

Kanak-kanak lebih daripada 20 kg: Dos permulaan ialah 400 mg setiap hari. Doktor anda perlu meningkatkan dos berdasarkan kepada penyakit anak anda. Dos biasanya di antara 20 mg dan 30mg bagi setiap kilogram berat badan setiap hari. Ini mungkin boleh meningkat ke 35 mg bagi setiap kilogram berat badan setiap hari berdasarkan kepada penyakit anak anda.

Kanak-kanak di bawah 20 kg: Dos yang biasa ialah 20 mg bagi setiap kilogram berat badan setiap hari. Berdasarkan kepada keadaan anak anda, doktor boleh membuat keputusan untuk meningkatkan dos ini. Dos 40 mg/kg/sehari dan ke atas memerlukan pemantauan daripada doktor anda.

Pesakit yang mengalami masalah buah pinggang: Doktor anda akan menyelaraskan dos anda.

Jika anda sedang mengambil ubatubatan lain untuk 'sawan' (epilepsi): Anda atau anak anda sedang mengambil ubat-ubatan lain untuk merawat epilepsi bersama-sama dengan hovid Valproate Liquid. Doktor anda akan memulakan rawatan secara beransur-ansur berdasarkan kepada keadaan anda atau anak anda. Doktor anda boleh meningkatkan dos sebanyak 5~10 mg bagi setiap kilogram berat badan setiap hari berdasarkan kepada ubat-ubatan lain yang anda ambil.

Dewasa penyakit mania berkaitan dengan gangguan bipolar: Dos permulaan adalah 1000 mg setiap hari. Doktor anda perlu meningkatkan dos anda dengan secepat mungkin untuk mendapat kesan yang diinginkan. Dos biasanya di antara 1000 mg dan 2000 mg setiap hari. Ini mungkin boleh ditingkatkan kepada dos tidak melebihi 3000 mg setiap hari berdasarkan kepada penyakit anda.

- Bila perlu digunakan

Ambil hovid Valproate Liquid pada waktu yang lebih kurang sama setiap hari, melainkan doktor menasihati anda sebaliknya.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat anda selagi doktor anda tidak memberitahu anda untuk meneruskannya. Jangan berhenti

mengambil Valproate Liquid hanya kerana anda berasa lebih baik. Jika anda berhenti, sawan anda boleh kembali lagi.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos, ambilnya sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas. Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa itu.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih daripada dos yang diperlukan, beritahu doktor atau pergi ke jabatan hospital kecemasan dengan segera. Sila ambil pek ubat dengan anda. Kesan-kesan berikut boleh berlaku: rasa loya atau muntah, anak mata menjadi lebih kecil, pening, kelemahan otot dan refleks, masalah pernafasan dan sawan.

Semasa menggunakan hovid Valproate Liquid

- Perkara yang perlu dilakukan

Aturkan temujanji dalam kadar yang segera dengan doktor anda jika anda hamil atau fikir anda mungkin sedang hamil.

Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga kepada remaja perempuan yang dirawat dengan *sodium valproate*, anda perlu menghubungi doktor anda secepat anak anda mengalami haid yang pertama.

Beritahu doktor anda:

- Jika anda mengalami reaksi alahan/apa-apa kesan sampingan yang tidak diinginkan semasa mengambil ubat.
- Jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Wanita yang mengambil hovid Valproate Liquid semasa hamil mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mempunyai anak dengan kecacatan. Kecacatan ini termasuklah:

- Kecacatan kepala dan muka termasuk lelangit rekah (ada ruang atau lekukan di bibir).
- Kecacatan tangan dan kaki.
- Kecacatan tiub dari pundi kencing ke zakar, dimana pembukaan terbentuk di kawasan lain.

HOVID-VALPROATE LIQUID 200MG/5ML

Sodium Valproate (200mg/5ml)

- Kecacatan jantung dan salur darah, termasuk pembentukan jantung tidak sempurna.
- Pembentukan tulang belakang yang tidak sempurna dikenali sebagai '*Spina bifida*'.
- Kecacatan saluran kencing.

Pengambilan asid folik 5mg setiap hari sejurus selepas berhenti pencegahan hamil mungkin akan mengurangkan risiko mempunyai bayi dengan *spina bifida*. Kecacatan yang lain selalunya dikesan dengan pengawasan pranatal.

Ibu mengandung yang mengambil hovid Valproate Liquid mungkin mempunyai bayi dengan:

- Masalah pembekuan darah.
- Hipoglisemia (kadar gula rendah dalam darah).
- Hipotirodism (kelenjar tiroid yang tidak aktif).
- Sindrom sarak (seperti agitasi, kerengsaan, keterujaan, gementar, aktiviti otot yang berlebihan, gangguan *tonicity*, terketar-ketar, konvulsi dan masalah pemberian makanan kepada anak) jika hovid Valproate Liquid diambil semasa tiga bulan terakhir kehamilan.

Sesetengah bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mengambil hovid Valproate Liquid semasa hamil mungkin membesar lebih perlahan atau mengalami masalah autistik.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil hovid Valproate Liquid.

Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Teruskan pengambilan *sodium valproate* atau gunakan kaedah kawalan kehamilan (kontraseptif) sehingga anda berbincang tentang kehamilan atau rancangan untuk hamil dengan doktor anda.

Jangan:

- Berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Berkongsi hovid Valproate Liquid dengan orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda atau keadaan yang sama dengan anda.

- Mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.
- Guna hovid Valproate Liquid selepas tarikh akhir.
- Jangan ambil ubat ini untuk merawat komplikasi lain, melainkan doktor menasihati anda sebaliknya.
- Jangan berhenti ambil hovid Valproate Liquid, atau tukar dos, tanpa merujuk dengan doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin:

Anda mungkin berasa mengantuk apabila mengambil hovid Valproate Liquid. Jika ini berlaku kepada anda, jangan memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin. Pengambilan bersama ubat anti-epileptik lain boleh meningkatkan rasa mengantuk.

Hamil:

- *Sodium valproate* boleh memudaratkan bayi yang belum lahir secara serius jika diambil ketika hamil.
- Risiko meningkat dengan dos yang tinggi, tapi setiap dos yang diambil mempunyai risiko.
- Ia boleh menyebabkan kecacatan bagi bayi dan boleh memberi kesan pada perkembangan bayi ketika membesar. Kecacatan bayi yang dilaporkan termasuk *spina bifida* (tulang belakang yang tidak terbentuk dengan sempurna); kecacatan pertumbuhan muka dan tengkorak; kecacatan jantung, buah pinggang, saluran kencing dan organ pembiakan; kecacatan tulang kaki.
- Jika anda ambil *sodium valproate* ketika hamil anda mempunyai risiko lebih tinggi daripada wanita lain untuk mempunyai anak dengan kecacatan yang memerlukan rawatan perubatan, kerana *sodium valproate* telah digunakan dalam tempoh masa yang lama, ianya dilaporkan bahawa wanita yang ambil *sodium valproate* 10 dalam 100 bayi yang dilahirkan dengan kecacatan. Dibandingkan dengan 2-3 dalam 100 bayi yang dilahirkan oleh wanita yang tidak menghadapi epilepsi (sawan).
- Dianggarkan dalam 30-40% kanak-kanak tadika, yang mana ibunya mengambil *sodium valproate* ketika hamil mungkin mengalami masalah

dalam perkembangan awal kanak-kanak. Kanak-kanak yang terjejas menunjukkan aktiviti yang perlahan ketika berjalan dan bercakap, tumbuhan intelektual lebih sedikit dan mempunyai kesukaran dengan bahasa dan daya ingatan.

- Penyakit autistik lebih banyak dikenalpasti dalam kalangan kanak-kanak yang terdedah kepada *sodium valproate* dan ada bukti menunjukkan kanak-kanak ini mungkin lebih mudah menghadapi gejala hiperaktif (*Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)*).

Menyusukan: Risiko gangguan/penyakit darah (anemia) dalam kalangan bayi yang disusukan dengan ibu yang menerima rawatan *valproate*. Pesakit harus membuat keputusan sama ada berhenti menyusukan atau berhenti menggunakan hovid Valproate Liquid sebagai rawatan.

Pankreatitis: Kes-kes pankreatitis yang mengancam nyawa telah dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak dan dewasa yang menerima *valproate*. Sesetengah kes diuraikan sebagai pendarahan dengan progres yang cepat dari gejala awal hingga ke kematian. Sebilangan kes yang dilaporkan sejurus selepas penggunaan dan ada juga yang dilaporkan beberapa tahun selepas penggunaannya. Pesakit dan penjaga perlu diberi amaran tentang gejala sakit badan, mual, muntah dan/atau anoreksia yang mungkin menjadi gejala pankreatitis dan memerlukan rawatan segera. Jika pankreatitis dikesan, rawatan menggunakan *valproate* haruslah diberhentikan.

Nasihat penting untuk pesakit lelaki yang berkeupayaan menjadi bapa

Potensi risiko berkaitan pengambilan valproat dalam tempoh 3 bulan sebelum persenyawaan

Satu kajian mencadangkan bahawa jika anda mengambil valproat dalam tempoh 3 bulan sebelum persenyawaan, anak anda mungkin mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan mental dan/atau motor berbanding kanak-kanak yang dilahirkan

HOVID-VALPROATE LIQUID 200MG/5ML

Sodium Valproate (200mg/5ml)

oleh bapa yang menggunakan lamotrigin atau levetirasetam, iaitu ubat lain yang juga boleh digunakan untuk merawat penyakit anda. Dalam kajian ini, kira-kira 5 daripada 100 kanak-kanak mengalami gangguan tersebut apabila dilahirkan oleh bapa yang dirawat dengan valproat, manakala kira-kira 3 daripada 100 kanak-kanak apabila dilahirkan oleh bapa yang dirawat dengan ubat lain. Tiada data mengenai potensi risiko ini terhadap kanak-kanak yang diperanakkan lebih daripada 3 bulan selepas pemberhentian rawatan valproat (iaitu tempoh yang diperlukan untuk pembentukan sperma baharu).

Sebagai langkah berjaga-jaga, doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai:

- Potensi risiko apabila menjadi bapa sekiranya anda dirawat dengan valproat;
- Keperluan untuk menggunakan kaedah kontrasepsi (pencegahan kehamilan) yang berkesan oleh anda dan pasangan wanita anda sepanjang tempoh rawatan dan selama 3 bulan selepas menghentikan valproat;
- Keperluan untuk berunding dengan doktor bagi membincangkan pilihan rawatan alternatif sebaik sahaja anda merancang untuk menjadi bapa dan sebelum menghentikan penggunaan kontrasepsi;
- Larangan untuk menderma sperma semasa rawatan dan selama 3 bulan selepas menghentikan rawatan.

Jangan hentikan rawatan anda tanpa berbincang dengan doktor. Jika anda menghentikan rawatan, gejala anda mungkin menjadi lebih teruk. Sekiranya pasangan wanita anda hamil semasa anda menggunakan valproat dalam tempoh 3 bulan sebelum persenyawaan, kedua-dua anda hendaklah menghubungi doktor untuk mendapatkan kaunseling.

Anda perlu mendapatkan temujanji berkala (sekurang-kurangnya setahun sekali) dengan doktor anda. Semasa lawatan ini, doktor akan memastikan anda memahami risiko dan langkah berjaga-jaga yang berkaitan dengan penggunaan valproat. Pastikan anda membaca panduan pesakit yang akan diberikan oleh doktor anda.

Kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, hovid Valproate Liquid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda perasan mana-mana kesan sampingan yang serius seperti berikut – anda mungkin memerlukan rawatan dengan segera:

- Ada mempunyai alahan. Tanda-tandanya termasuk: ruam, masalah menelan atau masalah pernafasan, bengkak di bibir, muka, tekak atau lidah. Tangan, kaki atau bahagian sulit juga akan terkesan.
- Masalah hati dan masalah pankreas mungkin disebabkan oleh penyakit yang menyerang secara tiba-tiba dalam tempoh 6 bulan yang pertama semasa rawatan. Ini berlaku dalam segelintir pesakit yang mengambil hovid Valproate Liquid. Ia termasuk rasa sakit atau tidak selesa tanpa mengira masa, rasa mengantuk dan lemah, sakit perut termasuk bahagian atas perut, demam kuning (kulit berwarna kekuningan dan mata berwarna putih), hilang selera makan, bengkak (terutama di kaki tapi akan melibatkan bahagian badan yang lain), serangan sawan semakin teruk atau berasa tidak sihat secara umum.

Doktor anda mungkin akan menasihati anda untuk berhenti ambil hovid Valproate Liquid dengan segera jika anda mengalami gejala:

- Alahan kulit yang teruk atau meragut nyawa (sindrom *Steven-Johnson*, *toxic epidermal necrolysis*, *erythema multiforme*).
- Terdapat laporan tentang masalah tulang seperti osteopenia dan osteoporosis (tulang menjadi nipis) dan rapuh. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi jika anda sedang dalam rawatan jangka masa panjang dengan ubat anti-epilepsi, atau ada sejarah menghidap osteoporosis.
- Kekurangan platlet darah (*thrombocytopenia*); penurunan kadar sel darah merah (anemia).
- Masalah pembekuan darah (pendarahan berlaku lebih lama dari normal), lebam atau pendarahan berlaku tanpa sebab.

- Perubahan *mood*, hilang ingatan, keliru, kurang tumpuan dan hilang kesedaran (koma).
- Kelenjar tiroid yang tidak aktif, yang mengakibatkan keletihan dan naik berat badan (hipotirodism).
- Kesukaran bernafas dan sakit akibat radang paru-paru (*pleural effusion*).

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya tanda-tanda kesan sampingan berikut berlaku:

- Pertukaran perangai termasuk terlalu berjaga-jaga, dan kadang-kadang agresif, hiperaktif dan perangai yang pelik. Ini disebabkan oleh jika ubat lain yang digunakan untuk merawat sawan seperti *phenobarbital* dan *topiramate* diambil sekali dengan hovid Valproate Liquid atau jika dos terlalu tinggi atau dos digandakan dengan tiba-tiba.
- Perubahan kadar amonia dalam darah. Gejala dalam dilihat dengan berasa sakit, masalah denganimbangan dan kordinasi, lesu atau kurang perhatian.
- Menggigil, mengantuk atau tidak stabil ketika berjalan atau pergerakan tidak sengaja.
- Pergerakan mata yang cepat atau tidak terkawal.
- Rasa sakit, sakit perut atau cirit-birit, terutama ketika mulakan rawatan. Ini boleh dikurangkan dengan mengambil ubat ini dengan makanan.
- Masalah *extrapyramidal*.
- Hilang pendengaran.
- Ruam.
- Jerawat.
- Rambut gugur dalam kadar sementara. Rambut yang tumbuh semula selalunya lebih keriting. Ruam kulit yang disebabkan oleh salur darah sempit atau tersumbat (*vasculitis*).
- Perubahan menstruasi wanita dan pertumbuhan bulu yang banyak pada wanita.
- Pembesaran bahagian dada pada lelaki.
- Bengkak kaki (*oedema*).
- Berat badan naik.
- Masalah buah pinggang, kerap buang air kencing.
- Sakit kepala.
- Agresif, keresahan, gangguan perhatian, perangai pelik, hiperaktif dan masalah pembelajaran.

HOVID-VALPROATE LIQUID 200MG/5ML

Sodium Valproate (200mg/5ml)

- Rasa mencucuk atau kebas di tangan dan kaki.
- Ketidaksuburan lelaki (mungkin boleh pulih selepas pengurangan dos atau pemberhentian rawatan)

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan hovid Valproate Liquid

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk pada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Produk

- Rupa dan warna produk

Cecair merah, berperisa ceri.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
- Setiap 5 ml mengandungi *Sodium Valproate* 200 mg.

- Bahan-bahan tidak aktif

- *Hydroxyethylcellulose*
- *Methyl hydroxybenzoate*
- *Propyl hydroxybenzoate*
- *Propylene glycol*
- *Saccharin sodium*
- *Sorbitol 70%*
- *Ponceau 4R*
- *Cherry flavor (Natural)*
- *Purified water*

- Nombor MAL:

MAL20076036AZ

Pengilang

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/01/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)251218/01593