

HOVICET FILM COATED TABLET 5 MG

Levocetirizine Dihydrochloride 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovicet
2. Bagaimana Hovicet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovicet
4. Cara menggunakan Hovicet
5. Semasa menggunakan Hovicet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovicet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hovicet

Hovicet digunakan untuk merawat simptom-simptom:

- Alahan rinitis (keradangan membran mukus di dalam hidung) termasuk alahan rinitis berterusan.
- Urtikaria idiopatik kronik (ruam gatal yang timbul tanpa sebab yang diketahui).

Bagaimana Hovicet berfungsi

Hovicet mengandungi bahan aktif *levocetirizine dihydrochloride*, *cetirizine*, *hydroxine*.

Hovicet adalah ubat anti alahan. Ia bertindak dengan menghalang sejenis bahan semulajadi (histamina) yang dihasilkan oleh badan anda semasa reaksi alahan.

Sebelum menggunakan Hovicet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Hovicet

- jika anda alah (hipersensitif) kepada bahan aktif, *levocetirizine dihydrochloride* atau antihistamina atau mana-mana bahan kandungan lain Hovicet.
- jika anda mempunyai kemerosotan fungsi buah pinggang yang teruk dengan pelepasan creatinine di bawah 10 ml/min.

Penggunaan Hovicet adalah tidak digalakkan bagi bayi dan kanak-kanak di bawah 6 tahun.

Kehamilan dan penyusuan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil mana-mana ubat. Beritahu

doktor anda jika anda hamil, bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi. Levocetirizine dirembeskan dalam susu ibu. Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini jika anda sedang menyusukan susu ibu.

- Sebelum menggunakan Hovicet

Beritahu doktor anda jika anda mengalami keadaan yang berikut:

- Jika anda mempunyai kesukaran untuk mengosongkan pundi kencing anda disebabkan oleh factor-faktor seperti luka saraf tunjang atau hiperplasia prostat (pembesaran kelenjar prostat).
- Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda mempunyai intoleransi terhadap sesetengah gula. Tablet ini mengandungi laktosa.
- Jika anda mengalami penyakit *epilepsy* (sawan) atau mempunyai risiko mengalami sawan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil *theophylline* dan *ritonavir* atau anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain baru-baru ini, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Hovicet

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil Hovicet seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Dos yang biasa ialah:

- Orang dewasa dan remaja berumur 12 tahun dan ke atas: Dos harian yang disyorkan ialah 5mg (1 tablet bersalut filem).
- Kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun: Dos harian yang disyorkan ialah 5mg (1 tablet bersalut filem).

Arahan dos khas bagi golongan tertentu:

Jika anda mempunyai fungsi buah pinggang terjejas, anda mungkin akan diberi dos rendah mengikut tahap

penyakit buah pinggang anda, dan berat badan akan diambil kira bagi kanak-kanak. Dos akan ditentukan oleh doktor anda.

Jika anda mengalami penyakit buah pinggang peringkat akhir atau sedang menjalani dialysis anda tidak boleh mengambil Hovicet.

Tiada penyesuaian dos diperlukan jika anda hanya mengalami kemerosotan hati. Namun, jika anda mengalami kedua-dua kemerosotan hati dan buah pinggang, sila berjumpa dengan doktor anda untuk penyesuaian dos.

Tiada penyesuaian dos diperlukan bagi warga tua, dengan syarat fungsi buah pinggang mereka adalah normal.

- Bila perlu digunakan

Tablet harus diambil secara oral, ditelan sepenuhnya bersama cecair dan boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Anda disarankan untuk mengambil dos harian dalam satu pengambilan tunggal.

Setiasa mengambil Hovicet seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu merujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Berapa lama perlu digunakan

Tempoh penggunaan bergantung kepada jenis, tempoh dan jenis aduan anda dan ditentukan oleh doktor anda.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil Hovicet atau jika anda mengambil dos yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh doktor anda, jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Teruskan pengambilan dengan mengambil dos yang seterusnya tepat pada masanya.

HOVICET FILM COATED TABLET 5 MG

Levocetirizine Dihydrochloride 5mg

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital yang terdekat, jika anda merasakan anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil ubat ini secara berlebihan. Lakukannya walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuklah rasa mengantuk di kalangan dewasa dan pada mulanya kegelisahan dan keresahan, diikuti oleh rasa mengantuk di kalangan kanak-kanak.

Semasa menggunakan Hovicet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doctor anda.

Beritahu semua doktor, doctor pergigian dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Hovicet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa sedang mengambil ubat ini

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil mana-mana ubat-ubatan baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Hovicet kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian harus diberikan jika Hovicet diambil bersama alkohol. Bagi mereka yang sensitif, penggunaan serentak cetirizine atau levocetirizine dengan alkohol atau ubat-ubatan lain yang bertindak ke atas otak boleh menjejaskan kecerdasan.

Sesetengah orang yang mengambil Hovicet mungkin mengalami rasa

mengantuk, keletihan dan kekurangan tenaga. Langkah berjaga-jaga perlu diambil jika anda bercadang untuk memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Hovicet boleh menyebabkan kesan sampingan, seperti:

Biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang kepada kurang dari 1 dalam 10 orang)

Mulut kering, sakit kepala, keletihan dan rasa mengantuk.

Luar biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1000 orang kepada kurang 1 dalam 100 orang)

Keletihan dan sakit perut.

Kesan sampingan yang sangat jarang seperti berdebar-debar (denyutan jantung tidak teratur), peningkatan kadar denyutan jantung, sawan, rasa kekebasan, pening, pengsan (kehilangan kesedaran sementara), mencejut, disgeusia (gangguan kepada deria rasa), sensasi berpusing, gangguan penglihatan, penglihatan kabur, 'oculogyration' (pergerakan mata tidak terkawal), sakit semasa kencing, ketidakupayaan untuk mengosongkan pundi kencing sepenuhnya, edema (pembendungan cecair), pruritus (rasa gatal) bila rawatan dihentikan, ruam, urtikaria (ruam merah dan gatal yang timbul), letusan kulit, sesak nafas, peningkatan berat badan dan selera makan, sakit otot dan sendi, tingkah laku agresif atau gelisah, halusinasi, kemurungan, insomnia, pemikiran berulang atau keasyikan dengan rasa untuk membunuh diri, mimpi ngeri, hepatitis, fungsi hati yang tidak normal, muntah, loya dan cirit-birit juga telah dilaporkan.

Berhenti mengambil Hovicet dan segera rujuk kepada doktor anda sebaik sahaja anda mengalami hipersensitiviti atau mana-mana reaksi tindak balas. Reaksi hipersensitiviti mungkin termasuk: bengkak dalam mulut, lidah, muka dan / atau tekak, kesukaran bernafas atau menelan (sesak dada atau berdehit)

gatal-gatal, kejutan anafilaksi yang boleh membawa maut.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perasan sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovicet

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet besalut filem berwarna putih ke putih-putihan, berbentuk bujur, dengan "HD" dicetak pada satu bahagian.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan Aktif

Levocetirizine dihydrochloride

- Bahan-bahan Tidak Aktif

Microcrystalline Cellulose

Lactose Monohydrate

Crospovidone

Colloidal Silicon Dioxide

Magnesium Stearate

Propylene Glycol

Talc

Titanium Dioxide

Hydroxypropyl Methylcellulose E-5

HOVICET FILM COATED TABLET 5 MG

Levocetirizine Dihydrochloride 5mg

Hydroxypropyl Methylcellulose E-15
Purified Water

- Nombor MAL
MALXXXXXXXXA

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7 ½ Miles,
Jalan Ipoh/Chemor,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/09/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/155