

MONTELAIR TABLET

Montelukast Chewable Tablet (5mg), Montelukast Film-coated tablet (10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Montelair
2. Bagaimana Montelair berfungsi
3. Sebelum mengambil Montelair
4. Cara menggunakan Montelair
5. Semasa menggunakan Montelair
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Montelair
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Kelulusan Pemasaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Montelair

Digunakan untuk

- menghalang dan merawat asma bagi orang dewasa
- melegakan gejala-gejala demam alergi.

Bagaimana Montelair berfungsi

Ubat ini ialah antagonis kepada reseptor leukotriena. Ia menghalang bahan yang terdapat dalam peparu yang dikenali sebagai leukotriena yang menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit dan membengkak.

Penyekatan leukotriena akan melegakan tanda-tanda asma dan membantu mengelakkan serangan asma.

Sebelum menggunakan Montelair

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda atau anak anda alah pada montelukast atau pada mana-mana bahan eksipien
- anda atau anak anda sedang mengambil ubat yang mengandungi montelukast
- kanak-kanak berumur dibawah 2 tahun
- anda tiada tolerans terhadap galaktosa, mempunyai penyakit Lapp kurang laktosa atau penyerapan glukosa-galaktosa tidak cepak

- Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor jika:

- anak anda menghadapi fenilketonuria, iaitu satu keadaan di mana kanak-kanak tidak boleh

memproses bahagian protein yang dipanggil fenilalanina

- anda hamil atau merancang untuk hamil
- anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau didapati tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat akan mengganggu fungsi bahan aktif yang terdapat pada Montelair.

Antaranya:

- ubat lain yang mengandungi montelukast
- fenobarbital
- fenitoin
- rifampisin.

Interaksi lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Rujuk doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Cara menggunakan Montelair

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak berumur 6-14 tahun: ambil 1 biji tablet kunyah sehari pada waktu petang.

Kunyah 5 mg tablet kunyah dan telan.

Dewasa dan remaja berumur 15 tahun dan ke atas: ambil 1 biji tablet 10 mg sehari pada waktu petang.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini pada waktu petang. Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan. Ubat ini patut diambil 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda atau anak anda dinasihati supaya mengambil ubat ini selama mana yang diarahkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan gantikan dos bagi menggantikan dos yang tertinggal.

Sekiranya terlupa, ambil dos tersebut sebaik sahaja teringat.

Sekiranya telah hampir waktu untuk dos seterusnya, tinggalkan dos tersebut

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor secepat mungkin sebaik sahaja anda menyedari bahawa anda telah terlebih makan ubat.

Semasa menggunakan Montelair

- Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan anda atau anak anda mengambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor; walaupun gejala asma sudah berkurangan atau anda mengalami serangan asma.

Sentiasa bersedia dengan alat sedut sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya serangan asma berlaku.

Montelair tidak sesuai digunakan untuk serangan asma yang mendadak (akut).

Jika anda mengambil Montelukast 10 mg, beritahu doktor jika anda hamil atau mula mengambil ubat baru.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain atau kanak-kanak berumur dibawah 12 tahun, walaupun mereka mengalami gejala-gejala yang sama seperti anda.

Jangan ambil ubat ini untuk merawat penyakit lain kecuali dimaklumkan oleh doktor atau pegawai farmasi.

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah dos tanpa merujuk kepada doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ambil perhatian:

- jika tanda-tanda yang dialami semakin teruk, hubungi doktor dengan segera

MONTELAIR TABLET

Montelukast Chewable Tablet (5mg), Montelukast Film-coated tablet (10 mg)

- tidak menggantikan ubat ini dengan ubat-ubatan lain yang dipreskripsikan oleh doktor untuk merawat asma
- tidak mengambil aspirin atau ubat anti radang bukan steroid (NSAID) jika ia menyebabkan asma menjadi teruk
- anda mungkin akan merasa pening apabila memandu kenderaan atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat akan menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini dan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya, ia tidak serius dan bersifat sementara.

Maklumkan kepada doktor dengan segera jika anda merasakan anak anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubatan ini.

Kesan sampingan yang biasa dialami

- sakit kepala.

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

- peningkatan paras enzim hati
- sakit di bahagian abdomen atau perut
- kelemahan atau kepenatan yang luarbiasa
- batuk
- sakit gigi
- pening
- pedih hulu hati
- demam
- radang perut dan usus
- hidung tersumbat
- ruam.

Kesan sampingan yang amat jarang berlaku

- sindrom Churg-Strauss, sejenis penyakit radang salur darah
- pyuria (nanah dalam air kencing).

Kesan-kesan sampingan lain yang dilaporkan semasa ubat berada dalam pasaran

- jangkitan pada bahagian atas saluran pernafasan iaitu dari bahagian mulut ke bahagian tekak/kerongkong

- mudah berlaku pendarahan
- reaksi alahan contoh ruam, kegatalan, pembengkakan pada muka, bibir, lidah dan/atau tekak/kerongkong
- perubahan yang berkaitan dengan tingkah laku dan angin (mood) contoh mimpi ngeri pada waktu malam, berkhayal, keresahan, kemurungan, masalah tidur
- pening, rasa mengantuk, rasa semut-semut, kebas, sawan
- jantung berdenyut pantas
- hidung berdarah
- cirit-birit, mulut kering, ketidakhadaman, rasa mual, muntah
- hepatitis (radang hati)
- lebam, kegatalan, ruam gatal akibat alahan, erythema nodosum (benjolan lembut pada kulit)
- sakit pada sendi atau otot, kekejangan otot
- keletihan, rasa tidak sihat, bengkak, demam.

Beritahu penjaga kesihatan anda dengan segera jika anda perasan mana-mana tingkah laku berikut dan sekiranya terdapat gejala berkaitan perubahan mood:

- gejala obsesif-kompulsif

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Montelair

- Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak.

Montelair 5 mg Chewable Tablet: Simpan dibawah 30°C.

Montelair 10 mg Film-coated Tablet: Simpan dibawah 30°C.

- Pelupusan

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang betul.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Montelair 5 mg Chewable Tablet: 10 mm, bulat, merah jambu berbelak-belak, tanpa selaput, berpinggir serong, cembung cetek, cetak timbul "HD" dan goresan pada permukaan yang sama.

Montelair 10 mg Film-coated Tablet: segi empat, tablet tanpa filem berwarna kuning air, cembung cetek, berpinggir serong, cetak timbul "HD" dan goresan pada satu permukaan.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan Aktif

Setiap tablet Montelair 5 mg Chewable Tablet mengandungi Montelukast Sodium yang bersamaan dengan 5 mg Montelukast.

Setiap tablet Montelair 10 mg Film-coated Tablet mengandungi Montelukast Sodium yang bersamaan dengan 10 mg Montelukast.

-Bahan Tidak Aktif
Tidak berkenaan

- Nombor MAL:

Montelair 5 mg Chewable Tablet
MAL12055028AZ

Montelair 10 mg Film-coated Tablet
MAL10100172AZ

Pengilang

HOVID Berhad
Lot 56442, 7 1/2 Miles Jalan Ipoh/Chemor, 31200, Chemor, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman, 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

MONTELAIR TABLET

Montelukast Chewable Tablet (5mg), Montelukast Film-coated tablet (10 mg)

Tarikh kemaskini RIMUP

23/02/2023

Serial number

NPRA(R2/1)190119/21