

HOSOLVON ELIXIR 4 mg/ 5ml (SUGAR FREE)

Bromhexine Hydrochloride 4 mg/ 5 ml

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Hosolvon
2. Bagaimana Hosolvon berfungsi
3. Sebelum mengambil Hosolvon
4. Cara menggunakan Hosolvon
5. Semasa menggunakan Hosolvon
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hosolvon

Secretolytic terapi untuk penyakit bronchopulmonary akut dan kronik yang berkaitan dengan rembesan mucus yang luar biasa dan penyampaian mukus yang terjejas.

Bagaimana Hosolvon berfungsi

Ubat ini mengandungi *bromhexine hydrochloride* sebagai bahan aktif. Bromhexine bertindak sebagai 'expectorant' / agen mucolytic. Ia meningkatkan isipadu kahak dan mengurangkan kelikatan rembesan bronkus pada pesakit bronkitis kronik. Sekunder daripada kesan ini, bromhexine juga meningkatkan fungsi paru-paru pada pesakit bronkitis.

Metabolit bromhexine, ambroxol juga boleh menyumbang kepada peningkatan rembesan dari kelenjar eksokrin

Sebelum mengambil Hosolvon

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah pada bromhexine, atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini

Tanda-tanda tindak balas alahan termasuk:

- sesak nafas
- ronkus atau kesukaran bernafas
- bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal pada kulit

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput atau jika bungkusan rosak.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, bercakap dengan pegawai farmasi atau doktor anda.

- *Sebelum mula mengambil*

Beritahu doktor jika:

- anda mempunyai alah kepada mana-mana ubat lain, bahan makanan, pewarna atau pengawet
- anda mempunyai ulser perut
- anda mempunyai asma
- anda mempunyai masalah hati
- anda mengalami masalah buah pinggang
- anda mengambil antibiotik
- anda menyusukan bayi
- anda hamil, rasa anda hamil, atau bercadang untuk hamil.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Bromhexine mungkin boleh meningkatkan kepekatan antibiotik yang diambil dengan serentak di dalam rembesan bronkus.

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Hosolvon

- *Berapa banyak harus digunakan*

Oral

Dewasa

10 ml, tiga kali sehari

Kanak-kanak

Kanak-kanak 6-12 tahun: 5 ml, tiga kali sehari

Gunakan dengan cermat atas nasihat doktor / ahli farmasi untuk kanak-kanak 6 hingga 12 tahun.

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun kecuali dinasihatkan oleh doktor / ahli farmasi.

- *Bila perlu digunakan*

Tiga kali sehari

- *Berapa lama perlu digunakan*

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini sehingga keadaan anda telah pulih.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor dengan segera sekiranya anda menyedari bahawa anda telah mengambil dos yang berlebihan.

Semasa menggunakan Hosolvon

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Peningkatan dalam aliran rembesan adalah dijangkakan.

Beritahu doktor anda:

- Jika symptom anda bertahan lebih lama daripada 14 hari dan / atau jika symptom bertambah walaupun sudah mengambil rawatan dengan bromhexine, anda perlu mendapatkan nasihat doktor.

- Jika batuk anda berterusan

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan:

- beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda
- ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali anda telah dinasihatkan oleh doktor atau pegawai farmasi
- mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali pegawai farmasi atau doktor anda menasihatkan
- mengambil ubat ini lebih daripada 5 hari

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Tiada yang diketahui.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaanya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan yang umum:

- ruam kulit
- urtikaria
- loya
- sakit epigastric
- muntah
- cirit-birit
- tahap aminotransferase serum meningkat sementara
- pening
- sakit kepala
- kencing malam

Lain-lain

- anafilaksis

- kesukaran bernafas
- bengkak muka, bibir, mulut, lidah atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas.

Hosolvon Elixir (SF) mungkin menyebabkan alahan yang serius dan alahan kulit yang serius. Hentikan penggunaan Hosolvon Elixir (SF) dan dapatkan bantuan perubatan serta-merta jika anda mempunyai simptom-simptom seperti:

- alahan serius: sesak nafas, sakit kepala, pembengkakan kulit atau ruam
- alahan kulit serius: kemerahan kulit, kelepukan, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon

- *Penyimpanan*

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C. Jauhkan dari cahaya

- *Pelupusan*

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak digunakan dengan betul.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Cecair jernih, tidak berwarna, berperisa jintan manis dan mentol

- *Bahan-bahan kandungan*

- *Bahan Aktif*

Setiap 5 ml mengandungi:
Bromhexine Hydrochloride 4 mg

- *Bahan Tidak Aktif*

Propylene Glycol
Glycerol Polyethylene Glycol
Oxystearate
Sucralose
Methyl Hydroxybenzoate
Propyl Hydroxybenzoate
Menthol Crystal
Aniseed Oil
Purified Water

- *Nombor MAL:*

MAL14095063XZ

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

11/05/2026

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)210726/719