

GASCOVID FORTE TABLET

Sodium alginate 500mg, Sodium bicarbonate 267mg, Calcium carbonate 160mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Gascovid Forte Tablet
2. Bagaimana Gascovid Forte Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Gascovid Forte Tablet
4. Cara menggunakan Gascovid Forte Tablet
5. Semasa menggunakan Gascovid Forte Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Gascovid Forte Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Gascovid Forte Tablet

Gascovid Forte Tablet digunakan untuk kelegaan daripada kesakitan dan ketidakselesaan akibat daripada pedih hulu hati and senak asid.

Bagaimana Gascovid Forte Tablet berfungsi

Gascovid Forte Tablet digolongkan dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil sebagai 'reflux suppressants', yang akan membentuk lapisan pelindung di atas kandungan perut untuk mengelakkan asid perut daripada keluar dari perut untuk berfungsi di dalam saluran paip makanan yang akan menyebabkan sakit dan ketidakselesaan.

Sebelum menggunakan Gascovid Forte Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap bahan-bahan aktif atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

Tanda-tanda tindak balas alahan termasuk:

- urtikaria
- kekejangan otot bronkus
- tindak balas anafilaktik

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput atau jika bungkus rosak.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, bercakap dengan pegawai farmasi atau doktor anda.

- Sebelum menggunakannya

Ubat ini mengandungi natrium and kalsium karbonat.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Gascovid Forte Tablet jika anda:

- telah dinasihatkan untuk mengikuti diet yang terhad untuk mana-mana yang di atas.
- mengalami atau telah mengalami penyakit buah pinggang atau penyakit jantung yang ketara kerana garam-garam tertentu boleh menimbulkan kesulitan.
- tahu anda kekurangan kandungan asid gastrik dalam perut kerana ubat ini akan kurang berkesan sekiranya kandungan asid gastrik kurang dalam perut

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan ambil Gascovid Forte Tablet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Gascovid Forte Tablet jika anda sedang menyusukan anak.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Jangan mengambil ubat ini dalam tempoh dua jam pengambilan ubat-ubatan lain melalui mulut kerana ia boleh mengganggu tindakan sesetengah ubat yang lain. Ini terutamanya penting sekiranya anda mengambil antihistamina, antibiotik (tetracyclines dan quinolones seperti norfloxacin), besi, antifungus seperti ketoconazole, digoxin dan beta-blockers (untuk penyakit jantung), neuroleptics (untuk penyakit mental), tiroksina, chloroquine (untuk malaria) dan bisphosphonates (untuk osteoporosis).

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Gascovid Forte Tablet

Ikut arahan doctor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daru maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Oral dan mengunyah sepenuhnya sebelum menelan.

Dewasa, termasuk kanak-kanak melebihi 12 tahun

Apabila simptom berlaku ambil satu hingga dua tablet selepas makan dan sebelum tidur.

Kanak-kanak bawah 12 tahun

Seharusnya hanya diambil atas nasihat perubatan.

Golongan orang tua

Tiada pengubahsuaian dos perlu bagi kumpulan umur ini

- Bila perlu digunakan

Selepas makan dan sebelum tidur.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda mengambil terlalu banyak ubat ini anda mungkin berasa kembung. Ia tidak akan menyebabkan apa-apa kemudaratan, tetapi sila berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Gascovid Forte Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor,

doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Gacovid Forte Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Gascovid Forte Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali pegawai farmasi atau doktor anda menasihatkan

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Gascon Forte Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan dilaporkan (sangat jarang berlaku kurang daripada 1 dalam 10 000 peluang tindak balas alahan kepada bahan-bahan)

- ruam kulit
- gatal-gatal

- kesukaran bernafas
- pening
- bengkak muka, bibir, lidah atau tekak

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor secepat mungkin.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan Gascovid Forte Tablet

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Bulat, 16mm, berwarna putih pudar hingga kuning air gelap, agak burik, tablet tidak bersalut, pinggir serong, muka rata.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap tablet mengandungi:
Sodium alginate 500mg
Sodium bicarbonate 267mg

Calcium carbonate 160mg

- *Bahan Tidak Aktif*

Polyethyleneglycol 8000

Mannitol

Acesulfame potassium

Sucralose

Magnesium aluminometasilicate

Peppermint Flavour

Magnesium stearate

Copovidone

Nombor MAL:

MAL14125080X

Pengilang

HOVID Bhd.

Lot 56442, 7 ½ Miles Jalan Ipoh/

Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,

30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/01/2026

Nombor Siri

NPRA (R2/1) 251031/01573