

hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Magnesium trisilicate (3.33% w/v), Magnesium carbonate (3.33% w/v), Sodium bicarbonate (3.33% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)
2. Bagaimana hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free) berfungsi
3. Sebelum menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)
4. Cara menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)
5. Semasa menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Ubat ini mengandungi tiga bahan aktif iaitu *Magnesium trisilicate*, *Magnesium karbonat* dan *natrium bikarbonat*.

Ia digunakan untuk kelegaan simptomatik yang disebabkan oleh asid perut berlebihan (*hyperacidity*), senak, pedih hulu hati, *Dyspepsia* (Gangguan Pencernaan) dan *hyperacidity* yang akan mengakibatkan ulser gastrik dan duodenal.

Bagaimana hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free) berfungsi

Ubat ini berfungsi sebagai anti-asid yang bertindak untuk meneutralkan asid perut, seterusnya memberikan rasa kelegaan yang disebabkan oleh asid perut berlebihan dalam perut.

Sebelum menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada mana-mana bahan yang disenaraikan pada bahagian bahan ramuan
- anda mengalami masalah buah pinggang yang teruk

- Sebelum mula menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda atau anak anda mempunyai:

- Masalah usus seperti cirit-birit kronik, ulser kolitis, *diverticulitis*, apendiks dan halangan usus
- Telah menjalani pembedahan usus yang dikenali sebagai kolostomi dan *ileostomy*
- Pengumpulan cecair di kaki dan paru-paru
- Kegagalan jantung
- Tekanan darah tinggi
- Masalah buah pinggang
- Tekanan darah tinggi dan bengkak semasa mengandung (*toxaemia*)
- Sedang mengambil diet rendah natrium

Kehamilan dan penyusuan:

Jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi. tanya doktor atau ahli farmasi bagi mendapatkan nasihat sebelum anda mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi sekiranya anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Antibiotik seperti *aminoglycosides*, *tetracyclines*

- Isoniazid (untuk merawat batuk kering)
- Antimuscarinics
- Diuretik
- Ubat-ubatan untuk merawat penyakit mental (contoh *chlordiazepoxide*, *diazepam*, *phenothiazines*, *amfetamin*)
- Dicumarol (untuk mengelakkan pembekuan darah)
- Digoxin (untuk merawat kegagalan jantung)
- Levodopa (untuk merawat penyakit Parkinson)
- Quinidine (untuk merawat malaria)
- Salicylates (ubat penahan sakit)
- Sodium polystyrene sulfonate resin (SPSR)
- Oral natrium dan kalium fosfat
- Persediaan Iron oral dan ubat-ubatan oral lain
- Produk tenusu / susu / persediaan yang mengandungi kalsium

Campuran hovid Magnesium Trisilicate boleh menjejaskan sebarang tindakan. Oleh itu, pengambilan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free) bersama ubat-ubatan lain perlu dijarakkan masa pengambilannya selama 1 hingga 3 jam.

Interaksi lain yang tidak dinyatakan mungkin berlaku. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Goncang sebelum digunakan.

- Berapa banyak harus digunakan

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan pegawai farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau pegawai farmasi untuk membantu.

hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Magnesium trisilicate (3.33% w/v), Magnesium carbonate (3.33% w/v), Sodium bicarbonate (3.33% w/v)

Dewasa:

15 ml untuk 3-4 kali sehari, atau sebagaimana yang diarahkan oleh doktor anda

Kanak-kanak:

Seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak di mana berat badan kurang daripada 9 kg.

Disyorkan diambil tidak melebihi 45 ml untuk tempoh 24 jam.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Dos maksimum yang disyorkan adalah diambil tidak melebihi dari 2 minggu, kecuali atas arahan doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

Jika anda terlupa mengambil ubat ini, tinggalkan dos tersebut. Ambil dos yang seterusnya seperti biasa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Jika anda mengambil terlalu banyak, hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free) boleh menyebabkan anda rasa lemah, mual, muntah, ketidakselesaan bahagian abdomen, halangan usus dan lain-lain.

Semasa menggunakan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda pada masa yang sama sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free).

Beritahu doktor jika masalah anda tidak bertambah baik selepas 2 minggu atau berulang-ulang.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda.
- Jangan ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali telah diberitahu oleh doktor atau pegawai farmasi anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini atau menukar sebarang dos pengambilan sebelum bertanya pada doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tidak diketahui

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda fikir anda sedang mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat ini.

Kesan sampingan yang biasa berlaku adalah

- Angin
- Cirit-birit
- Kekejangan perut
- Penggunaan dalam jangka masa yang panjang dan berlebihan boleh mengakibatkan batu karang

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor anda dengan cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 25°C. Jangan simpan di dalam peti sejuk.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang tidak lagi digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Ampaian berwarna putih dengan rasa pudina

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap 5 ml mengandungi:

Magnesium trisilicate	3.33% w/v
Magnesium carbonate	3.33% w/v
Sodium bicarbonate	3.33% w/v

hovid Mixture Magnesium Trisilicate (Sugar Free)

Magnesium trisilicate (3.33% w/v), Magnesium carbonate (3.33% w/v), Sodium bicarbonate (3.33% w/v)

- Bahan Tidak Aktif
Sacharrin Sodium
Methyl Hydroxybenzoate
Propyl Hydroxybenzoate
Butyl Hydroxybenzoate
Propylene Glycol
Xanthan Gum
Peppermint Oil
Purified Water

- MAL Number:
MAL15015109X

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**
HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
27/06/2023

Nombor siri
NPRA (R2/1) 210719/716