

LORATYN DRY SYRUP 1% w/w

Loratadine (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Loratyn Dry Syrup
2. Bagaimana Loratyn Dry Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Loratyn Dry Syrup
4. Cara menggunakan Loratyn Dry Syrup
5. Semasa menggunakan Loratyn Dry Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Loratyn Dry Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Loratyn Dry Syrup

- Untuk melegakan gejala-gejala alahan seperti bersin, berair dan gatal hidung dan mata.
- Untuk tanda-tanda dan gejala yang timbul seperti kulit merah yang gatal (urtikaria) dan lain-lain gangguan alergi kulit

Bagaimana Loratyn Dry Syrup berfungsi

Ubat ini tergolong dalam kumpulan yang dikenali sebagai antihistamin, yang bertindak untuk melegakan gejala-gejala alahan. Histamine ialah bahan dalam badan yang menyebabkan alergi. *Loratadine* berfungsi dengan menyekat histamin H1 - reseptor, dengan itu menghalang pengikatan histamin dan reseptor. Ini seterusnya akan menghalang rantaian tindak balas yang mengakibatkan gejala alahan, seterusnya memberikan kelegaan daripada gejala-gejala alahan.

Sebelum menggunakan Loratyn Dry Syrup

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada loratadine atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- anda hamil atau menyusukan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, bercakap dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- *Sebelum mula mengambil*

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika:

- anda mempunyai masalah hati yang teruk
- anda hamil, berfikir anda hamil atau merancang untuk hamil
- anda sedang menyusukan atau merancang untuk menyusukan bayi.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Loratyn Dry Syrup boleh menjejaskan atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan lain yang anda ambil. Beritahu doktor atau pegawai farmasi sekiranya anda sedang mengambil apa-apa ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Antaranya adalah:

- ubat-ubatan yang menghalang atau memetabolismekan oleh enzim hati, CP3A4 dan / atau CYP2D6.
- Ketoconazole, erythromycin dan cimetidine

Interaksi lain yang tidak dinyatakan mungkin boleh berlaku. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Loratyn Dry Syrup

Larutkan satu paket Loratyn Dry Syrup dengan kira-kira 150 ml hingga 200 ml air dan minum semua segera selepas persediaan.

- *Berapa banyak harus digunakan*

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan pegawai farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau pegawai farmasi untuk membantu

Dewasa

Oral, 10 mg Loratadine (dua paket) setiap hari. Doktor anda akan melaraskan dos penggunaan berdasarkan umur dan symptom anda.

Kanak-kanak

Berat badan <30 kg

Oral, 5 mg Loratadine (1 paket) setiap hari.

Berat badan > 30 kg

Oral, 10 mg Loratadine (2 paket) setiap hari.

Jika anda mempunyai masalah hati yang teruk, doktor anda perlu memulakan rawatan dengan dos yang lebih rendah.

- *Bila perlu digunakan*

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau pegawai farmasi anda. Adalah disyorkan untuk mengambil ubat ini selepas makan.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini selagi ia diberikan kepada anda oleh doktor anda

- *Jika terlupa menggunakan*

Dapatkan nasihat doktor atau pegawai farmasi anda mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang

kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda mengambil terlalu banyak, ubat ini boleh menyebabkan anda mengantuk, denyutan jantung yang cepat dan sakit kepala.

Semasa menggunakan Loratyn Dry Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda secepat yang mungkin jika:

- anda mengalami reaksi alahan/apa-apa kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat ini.
- anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Horamine.

Ambil ubat anda pada masa yang sama sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan

- memberi Loratyn Dry Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda
- mengambil Loratyn Dry Syrup untuk merawat sebarang aduan lain melainkan anda telah diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi
- mengambil lebih daripada dos yang disyorkan oleh doktor anda
- berhenti mengambil ubat kecuali telah diberitahu oleh doktor anda

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin.

Loratyn Dry Syrup tidak menyebabkan mengantuk bagi kebanyakan orang. Jangan memandu atau menggunakan jentera sehingga anda pasti anda tidak terjejas.

Kehamilan dan menyusukan bayi

Loratyn Dry Syrup tidak digalakkan semasa kehamilan atau semasa sedang menyusukan bayi. Sedikit kandungan loratadine akan dikumuhkan dalam susu ibu. Jika anda hamil atau menyusukan bayi, tanya doktor anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat ini.

Pesakit dengan masalah hati yang teruk

Langkah berjaga-jaga perlu diberikan pada pesakit dengan masalah hati yang teruk kerana akan berlaku pengurangan kadar pembersihan loratadine. Ubat yang dikenali untuk menghalang reaksi metabolisme hati perlu diberikan dengan berhati-hati.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Berhenti menggunakan Loratyn Dry Syrup dan hubungi doktor anda secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang beriku.

- tindak balas alahan: kesukaran bernafas, bengkak muka, leher, lidah atau tekak, ruam, gatal-gatal.

Kesan-kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan di kalangan kanak-kanak berumur 2 hingga 12 adalah sakit kepala, kegemuruhan dan letih. Kesan-kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan di kalangan orang dewasa dan kanak-kanak berumur lebih 12 adalah mengantuk, ketidakupayaan untuk tidur, sakit kepala dan peningkatan selera makan.

Kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin boleh berlaku. Beritahu doktor anda dengan cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers→Reporting)

Cara penyimpanan dan pelupusan Loratyn Dry Syrup

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 30°C. Simpan di tempat yang kering.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih keputihan dan berperisa *raspberry*. Larutan dengan rasa *raspberry* dan terdapat partikel putih terampai apabila bancuhan semula.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Loratyn Dry Syrup mengandungi *Loratadine* 1% w / w. Setiap satu paket (0.50 g) mengandungi 5 mg *Loratadine*.

- Bahan Tidak Aktif

Mannitol
Saccharin
Rasperry Flavour

- Nombor MAL

MALXXXXXXXXXA

Pengilang

HOVID Berhad

Lot 56442, 7¹/₂ Miles, Jalan Ipoh / Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman, 30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/06/2017