

HOVID-VALSARTAN TABLET

Valsartan (80mg, 160mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan hovid-Valsartan Tablet
2. Bagaimana hovid-Valsartan Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan hovid-Valsartan Tablet
4. Cara menggunakan hovid-Valsartan Tablet
5. Semasa menggunakan hovid-Valsartan Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan hovid-Valsartan Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan hovid-Valsartan Tablet

Valsartan ialah antagonis reseptor angiotensin II (perencat reseptor angiotensin).

Ubat ini digunakan untuk:

- merawat tekanan darah tinggi di kalangan orang dewasa.
- merawat pesakit yang mengalami kegagalan jantung sebagai otot jantung tidak boleh mengepam darah dengan cukup kuat untuk membekalkan kesemua darah yang diperlukan dalam seluruh badan.
- rawatan selepas serangan jantung (infarksi miokardium) bagi meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangkan masalah jantung selanjutnya.

Bagaimana hovid-Valsartan Tablet berfungsi

Angiotensin II adalah bahan dalam badan yang menyebabkan saluran darah menyempit, dengan demikian menyebabkan tekanan darah anda naik.

hovid-Valsartan bertindak dengan menyekat kesan angiotensin II. Hasilnya, saluran darah mengendur dan tekanan darah dikurangkan.

Sebelum menggunakan hovid-Valsartan Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah pada valsartan atau eksipiennya
- anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi
- anda menghadapi penyakit hati yang teruk
- anda mempunyai paras gula dalam darah yang tinggi dan anda menghidap diabetes jenis 2 (juga dinamakan diabetes melitus tidak bergantung pada insulin) semasa anda mengambil ubat menurunkan tekanan darah yang dinamakan aliskiren

- Sebelum menggunakan hovid-Valsartan Tablet

Beritahu doctor anda jika anda menghadapi keadaan medikal/penyakit di bawah:

- penyakit hati
- penyakit buah pinggang atau menjalani rawatan dialysis
- penyakit jantung lain (kecuali serangan jantung dan kegagalan jantung).
- mengambil dos diuretic (pil air yang bertindak meningkatkan aliran kencing)
- mengambil perencat ACE
- mengambil perencat ACE dengan penyekat beta
- mengambil makanan tambahan kalium
- hamil, terutamanya pada 3 bulan pertama.
- menyusukan bayi
- cirit-birit/muntah

Beritahu doktor jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain yang tidak dinyatakan di atas.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau pegawai farmasi jika anda sedang mengambil apa-apa

ubat lain, dalam apa-apa bentuk yang dibeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi valsartan.

Ia termasuk:

- perencat ACE yang untuk merawat tekanan darah tinggi dan kegagalan jantung
- penyekat beta yang untuk merawat kegagalan jantung dan penyakit jantung lain.
- diuretik yang untuk meningkatkan aliran kencing
- ubat antiradang bukan steroid (NSAIDs) yang sebagai ubat penahan sakit
- makanan tambahan kalium dan pengganti garam untuk meningkatkan kalium di dalam darah anda.

Cara menggunakan hovid-Valsartan Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Tekanan darah tinggi:

- Dos valsartan yang disyorkan ialah 80mg atau 160mg sekali sehari. Jika tekanan darah tidak dikawal secukupnya, dos seharian akan dinaikkan kepada 320mg.

Kegagalan jantung:

- Dos valsartan yang disyorkan ialah 40mg dua kali sehari. Dos akan dinaikkan kepada 80mg atau 160mg dua kali sehari.

Selepas serangan jantung:

- Dos awal ialah 20mg dua kali sehari. Doktor anda akan menaikkan dos anda kepada 160mg dua kali sehari.

hovid-Valsartan Tablet boleh diberikan bersama dengan rawatan lain untuk tekanan darah tinggi, kegagalan jantung dan selepas serangan jantung.

Telan tablet dengan meminum segelas air.

HOVID-VALSARTAN TABLET

Valsartan (80mg, 160mg)

- Bila perlu digunakan

Ubai ini boleh diambil dengan atau tanpa makanan dan pada masa yang sama setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan label dan arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas. Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat dan tunggu selama kira-kira 4 jam sebelum mengambil dos seterusnya.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan tekanan darah rendah. Anda mungkin rasa pening dan/atau pitam.

Semasa menggunakan hovid-Valsartan Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama dengan anda.

Jangan ambil ubat ini untuk merawat penyakit lain sebelum anda diberitahu oleh doktor.

Jangan berhenti menggunakan atau menukarkan dos ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Valsartan mungkin menyebabkan anda rasa pening.

Jangan memandu atau mengendalikan mesin jika anda rasa pening.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti yang berikut ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan biasa:

- rasa pening
- tekanan darah rendah dengan gejala seperti rasa pening
- kemerosotan fungsi buah pinggang (tanda kerosakan buah pinggang)

Kesan sampingan kurang biasa :

- tindak balas alahan dengan gejala seperti ruam, gatal-gatal, pening, muka atau bibir atau lidah atau tekak bengkak, sukar bernafas atau menelan (tanda angioedema)
- kehilangan kesedaran secara tiba-tiba
- sensasi berputar
- kemerosotan fungsi buah pinggang yang teruk (tanda kegagalan buah pinggang akut)
- kekejangan otot, ritma denyutan jantung tidak normal (tanda hiperkalemia)
- tercungap-cungap, sukar bernafas apabila baring, kaki bengkak (tanda kegagalan jantung)
- sakit kepala
- batuk
- sakit perut
- loya
- cirit-birit
- keletihan
- lemah

Kesan Sampingan yang Jarang Berlaku

- Demam, rasa tidak sihat, gatal-gatal, sakit sendi, ruam, atau kelenjar bengkak (tanda-tanda alahan serius).
- Tompok merah atau ungu pada kulit, demam, atau gatal (tanda keradangan salur darah).

- Pendarahan atau lebam yang luar biasa.
- Demam, sakit tekak, atau ulser di mulut akibat jangkitan (mungkin disebabkan kekurangan sel darah putih).
- Paras sel darah merah rendah (boleh menyebabkan letih atau pucat).
- Paras enzim hati dan bilirubin dalam darah meningkat (boleh menandakan masalah hati).
- Paras urea dan kreatinin meningkat (boleh menandakan masalah buah pinggang).

Jika anda mengalami mana-mana gejala ini dengan teruk, beritahu doktor anda.

Jika anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak dinyatakan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan hovid-Valsartan Tablet

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

hovid-Valsartan Film-coated Tablet 80 mg:

Bulat, diameter 8 mm, tablet merah pucat yang disaluti filem, dengan cembung dangkal; cetakan timbul "HD" dan goresan pada permukaan yang sama.

HOVID-VALSARTAN TABLET

Valsartan (80mg, 160mg)

hovid-Valsartan Film-coated Tablet 160 mg:

Bujur, tablet jingga muda yang disaluti filem, cembung dangkal, berpinggir serong, goresan pada satu permukaan dan cetakan timbul 'HOVID' pada permukaan lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap

- **hovid-Valsartan Film-coated Tablet 80 mg** mengandungi 80 mg Valsartan

- **hovid-Valsartan Film-coated Tablet 160 mg** mengandungi 160 mg Valsartan

- Bahan tidak aktif

hovid-Valsartan Film-coated

Tablet 80 mg:

Ferric oxide red

Ferric oxide yellow

Lactose monohydrate & microcrystalline cellulose mixture (75:25)

Crospovidone

Colloidal silicon dioxide

Sodium lauryl sulfate/Sodium lauryl sulphate

Talc

Magnesium aluminometasilicate

Titanium dioxide

Magnesium stearate

Propylene glycol

Hydroxypropyl methylcellulose E5

Hydroxypropyl methylcellulose E15

Purified water

hovid-Valsartan Film-coated

Tablet 160 mg:

Titanium dioxide

Ferric oxide red

Ferric oxide yellow

Lactose monohydrate & microcrystalline cellulose mixture (75:25)

Crospovidone

Colloidal silicon dioxide

Sodium lauryl sulfate/Sodium lauryl sulphate

Talc

Magnesium stearate

Magnesium aluminometasilicate

Propylene glycol

Talc

Hydroxypropyl methylcellulose E5

Hydroxypropyl methylcellulose E15

Purified water

Propylene glycol

Purified water

- Nombor MAL

hovid-Valsartan Film-coated Tablet

80 mg:

MAL16085027AZ

hovid-Valsartan Film-coated Tablet

160 mg:

MAL16085026AZ

Pengilang

HOVID Berhad

Lot 56442, 7 ½ Miles,

Jalan Ipoh / Chemor,

31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Berhad

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,

30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

27/08/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)250815/1521