

HOSOLVON DM ELIXIR (SUGAR FREE)

Bromhexine Hydrochloride / Dextromethorphan Hydrobromide (4mg/15 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)
2. Bagaimana Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)
4. Cara menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)
5. Semasa menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

Untuk melegakan batuk buat sementara waktu dan mengurangkan kelikatan kahak.

Bagaimana Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) berfungsi

Bahan aktif dalam ubat ini adalah *bromhexine hydrochloride* dan *dextromethorphan hydrobromide*. *Bromhexine hydrochloride* adalah sejenis mukolitik yang digunakan untuk mengurangkan kelikatan kahak. *Dextromethorphan hydrobromide* adalah ubat batuk. Ia merencat isyarat dalam otak yang menyebabkan batuk.

Sebelum menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika:

- anda alah kepada *bromhexine*, *dextromethorphan* atau sebarang bahan-bahan yang disenaraikan dalam muka surat terakhir risalah ini
- anda sedang mengandung atau menyusukan anak
- kanak-kanak anda berumur di bawah 2 tahun

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mengambil ubat ini, bincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula mengambil Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

Beritahu doktor/ahli farmasi anda jika:

- anda pernah mempunyai asma
- anda pernah mempunyai ulser gaster
- anda mempunyai masalah hati dan buah pinggang yang serius
- anda mempunyai masalah pernafasan
- kanak-kanak anda yang berumur antara 2 hingga 6 tahun akan menggunakannya
- anda sedang mengandung, mungkin mengandung atau rancang untuk mengandung
- anda sedang menyusukan anak atau rancang untuk menyusukan anak

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan yang anda ambil. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

- depresan sistem saraf pusat (untuk merawat kegelisahan dan masalah tidur)
- Perencat monoamina oksidase termasuk *furazolidone*, *phenelzine*, *procarbazine*, *selegiline* dan *tranylcypromine* (untuk mengurangkan kemurungan).
- perencat enzim lain seperti *amiodarone*, atau *fluoxetine* atau *quinidine* (untuk mengekalkan denyutan jantung yang teratur dan merawat masalah mental)
- menghisap tembakau.

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewesa dan kanak-kanak berumur > 12 tahun

Kegunaan oral, 10 ml (2 sudu teh), 3 kali sehari

Kanak-kanak berumur antara 6 – 12 tahun

Kegunaan oral, 5 ml (1 sudu teh), 3 kali sehari

Kanak-kanak berumur antara 2 hingga 6 tahun

Pengambilan dos mengikuti cadangan doktor

Kanak-kanak berumur < 2 tahun

Tidak sesuai untuk pengambilan ubat

- Bila perlu digunakan

Tiga kali sehari

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos

HOSOLVON DM ELIXIR (SUGAR FREE)

Bromhexine Hydrochloride / Dextromethorphan Hydrobromide (4mg/15 mg)

berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan atakxia (otot kurang terkawal), penglihatan kabur, koma, kebingungan, rasa mengantuk atau pening, susah bernafas, cirit-birit yang serius atau muntah, kegembiraan yang luar biasa, kegelisahan atau rasa senang marah dan susah kencing.

Semasa menggunakan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda:

- jika anda mengalami reaksi alahan/apa-apa kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat
- jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Hosolvon DM Elixir (Sugar Free).

Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan guna ubat anda untuk merawat pesakit lain kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan berkongsi Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) dengan orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hosolvon DM Elixir (Sugar Free) boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan ini boleh menjadi serius tetapi selalunya, adalah sederhana dan sementara.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan seperti yang berikut selepas mengambil ubat ini.

- masalah pencernaan
- peningkatan sementara nilai *aminotransferase* dalam serum (penunjuk masalah hati)
- sakit kepala
- keletihan
- pening
- berpeluh
- ruam kulit
- batuk
- kebingungan
- sembelit
- cirit-birit atau muntah
- sakit perut

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda dengan segera.

Hosolvon DM Elixir boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindakbalas pada kulit yang serius. Hentikan penggunaan Hosolvon DM Elixir dan dapatkan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- alahan teruk: sukar bernafas, pening kepala, bengkak pada kulit atau ruam

- tindakbalas kulit yang serius: kulit kemerahan, kulit melepuh, ruam, demam, sakit tekak atau mata.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hosolvon DM Elixir (Sugar Free)

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhkan dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Hijau, cecair berperisa vanilin dan pudina.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap 5 ml mengandungi

Bromhexine Hydrochloride 4 mg
Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg

- Bahan-bahan tidak aktif

Methyl hydroxybenzoate
Propyl hydroxybenzoate
Propylene glycol
Glycerol Polyethylene Glycol
Oxystearate
Sucralose
Vanillin
Peppermint Oil
Quinoline Yellow Extra
Sodium Copper Chlorophyllin
Sorbitol Solution 70%
Purified Water

HOSOLVON DM ELIXIR (SUGAR FREE)

Bromhexine Hydrochloride / Dextromethorphan Hydrobromide (4mg/15 mg)

- Reg. No.:

MAL16105038AZ

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/10/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230215/1015