

RICAM SYRUP 5MG/5ML

Cetirizine Hydrochloride (5mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Ricam
2. Bagaimana Ricam berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ricam
4. Cara menggunakan Ricam
5. Semasa menggunakan Ricam
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ricam
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ricam Tablet

Ia digunakan untuk merawat gejala keradangan membran mukus hidung (disebabkan oleh alergi yang bermusim atau jangka panjang) dan ruam yang berasal dari alahan, untuk orang dewasa dan kanak-kanak berusia 2 tahun ke atas.

Bagaimana Ricam Tablet berfungsi

Ubat ini tergolong dalam kumpulan antihistamin, yang bertindak untuk melegakan gejala-gejala alahan. Ia berfungsi dengan bersaing dengan histamin untuk mendapat tempat di H1-reseptor, dengan menghalang tindakan histamin pada sel.

Cetirizine juga boleh mempunyai kesan pengubahsuaian pada sel-sel radang dengan menghalang penghijrahan eosinophil atau pengantara chemotactic eosinophil dan sel inflamasi lain yang menyusup masuk ke dalam tisu, sel atau organ seperti neutrofil.

Sebelum menggunakan Ricam Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini sekiranya:

- anda alah terhadap antihistamin atau mana-mana bahan yang tersenarai pada akhir risalah ini.
- anda mempunyai kegagalan fungsi buah pinggang yang teruk
- anda mempunyai masalah sekatan kencing

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika:

- anda mempunyai penyakit buah pinggang.
- Anda hamil, berfikir anda hamil atau merancang untuk hamil
- Anda menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi
- anda mengalami epilepsi atau berisiko untuk kekejangan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum anda menagmbil Ricam jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Kesan beberapa ubat-ubatan mungkin terjejas jika ubat-ubatan lain digunakan pada masa yang sama.

Interaksi lain yang tidak dinyatakan mungkin berlaku. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan .

Cara menggunakan Ricam Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Dewasa

Oral, 5 hingga 10 ml, sekali sehari

Kanak-kanak antara 2-6 tahun

Oral, 2.5 ml, dua kali sehari

Kanak-kanak antara 6-12 tahun

Oral, 5 ml, dua kali sehari

Kanak-kanak 12 tahun ke atas
Oral, 10 ml, sekali sehari

Pesakit mempunyai masalah buah pinggang dan hati

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doctor atau ahli farmasi anda.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Patuhi arahan pada label dan seperti yang diarahkan oleh doctor atau ahli farmasi

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda terlupa untuk menggunakannya.

Jika anda terlupa untuk mengambil dos anda, ambil sebaik sahaja anda ingat.

Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja mengambil terlalu banyak ubat ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Mengambil terlalu banyak ubat ini boleh menyebabkan kekeliruan, mengantuk, cirit-birit, pening, kepenatan, peningkatan degupan

jantung, keletihan, sakit kepala, somnolens (rasa khayal), rasa tidak sihat, anak mata membesar, gatal-gatal, keresahan, rasa tenang, gementar dan kesukaran membuang air kecil.

Semasa menggunakan Ricam Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor:

- Jika anda mengalami apa-apa reaksi alahan / kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat.
- Jika anda hamil semasa mengambil ubat ini

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan pegawai farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Ricam.

Ambil ubat ini sepertimana yang telah diberitahu oleh doktor anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- berikan Ricam kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda.
- ambil ubat ini untuk merawat masalah lain kecuali telah diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.
- berhenti mengambil ubat ini sebelum bertanya pada doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu atau mengendalikan jentera kerana Ricam boleh menyebabkan rasa mengantuk. Elak dari mengambil alkohol atau ubat-ubatan lain yang akan menyekat aktiviti otak anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat lain, Ricam boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini, walaupun tidak semua orang akan mendapat kesan tersebut. Kesan ini boleh menjadi serius akan tetapi kebanyakan masa, ia bersifat ringan dan sementara.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda fikir anda sedang mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak diingini ketika mengambil ubat ini.

Kesan sampingan yang biasa

- mengantuk
- denyutan jantung cepat
- penglihatan kabur
- cirit-birit
- mulut kering
- kencing yang menyakitkan atau sukar
- kencing tidak terkawal
- gatal-gatal, ruam
- keletihan, lesu, lemah, tidak sihat
- edema / bengkak
- kebimbangan, kerengsaan
- sukar tidur
- ilusi,
- keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal
- pergerakan tidak terkawal anggota badan
- penambahan berat badan
- kejang
- pening

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku di sesetengah pesakit. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda rasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Ricam Tablet

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah 300C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana

untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair tidak berwarna dengan perisa Tutti-Frutti.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap 5 ml mengandungi:
Cetirizine Hydrochloride 5 mg

- Bahan Tidak Aktif

Sucrose

Propylene Glycol

Glycerin

Sodium Citrate

Citric Acid Monohydrate

Methyl Hydroxybenzoate

Propyl Hydroxybenzoate

Tutti-Frutti Flavour

- Nombor MAL

MAL18016054AZ

Pengilang

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.

121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/03/2023

Serial number

NPRA(R2/1)190220/52