

RITIVID TABLET 120 MG

Etoricoxib (120 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ritovid Tablet
2. Bagaimana Ritovid Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ritovid Tablet
4. Cara menggunakan Ritovid Tablet
5. Semasa menggunakan Ritovid Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ritovid Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ritovid Tablet

Ritovid Tablet digunakan untuk:

- sebagai rawatan akut dan kronik untuk tanda-tanda osteoarthritis (OA) dan arthritis reumatoid (RA)
- merawat *ankylosing spondylitis* (AS) (penyakit radang menyebabkan beberapa vertebra tulang belakang anda bergabung bersama-sama)
- merawat arthritis gout (serangan yang amat menyakitkan dengan keradangan sendi)
- merawat sakit akut, termasuk yang berkaitan dengan kesakitan haid dan prosedur pergigian kecil

Bagaimana Ritovid Tablet berfungsi

Ritovid Tablet mengandungi bahan aktif *etoricoxib*. Ritovid Tablet adalah salah satu ubat daripada kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil *selective COX-2 inhibitor*. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang dikenali sebagai *non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)*.

Sebelum menggunakan Ritovid Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika:

- anda alah kepada *etoricoxib* dan mana-mana bahan-bahan lain yang disenaraikan dalam risalah ini
- anda alah kepada *non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)* termasuk *aspirin* dan *COX-2 inhibitor*
- doktor anda telah disahkan anda menghidap masalah jantung

termasuk masalah jantung (sederhana atau jenis yang teruk)

- anda telah mengalami serangan strok.
- anda telah mengalami serangan jantung, pembedahan *bypass*, penyakit arteri perifer (peredaran miskin di kaki atau kaki akibat arteri sempit atau tersekat).
- anda berhamil atau sedang menyusukan bayi
- anda mempunyai tekanan darah tinggi yang tidak dikawal oleh rawatan
- anda mempunyai penyakit buah pinggang yang serius
- anda mempunyai ulser perut semasa atau pendarahan dalam perut atau usus
- anda mempunyai penyakit keradangan usus
- *etoricoxib* mungkin boleh meningkatkan risiko serangan jantung dan strok dan ini adalah sebab ia tidak boleh digunakan dalam orang-orang yang sudah mempunyai masalah jantung atau strok
- anda mempunyai masalah hati yang serius
- anda di bawah umur 16 tahun
- anda sedang mengambil aspirin atau NSAID (sbg cth: *Celecoxib*, *Diclofenac*, *Ibuprofen*, *Indomethacin* dll), merasa saluran udara di paru-paru menjadi sempit, simptom demam biasa (hidung berair, bersin atau sesak dada), bengkak di kawasan lapisan hidung yang berbentuk air mata kemerahan kulit dan bintik-bintik gatal atau reaksi alahan yang lain.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mengambil ubat ini, bincang dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum mula mengambil Ritovid Tablet

Beritahu doktor anda jika:

- anda mempunyai sejarah masalah jantung, atau penyakit jantung lain
- anda mempunyai sejarah tekanan darah tinggi, hiperlipidemia, kencing manis, merokok dan mempunyai penyakit pada arteri persisian.

- anda mengambil *acetylsalicylic acid*
- anda mengalami masalah hati atau penyakit buah pinggang
- anda mengalami dehidrasi
- anda telah bengkak akibat pengumpulan cecair
- anda mengalami tekanan darah tinggi. Ritovid Tablet boleh meningkatkan tekanan darah pada sesetengah orang terutamanya dalam dos yang tinggi. Ini boleh meningkatkan risiko penyakit jantung.
- anda mengalami pendarahan perut atau ulser
- anda sedang dirawat untuk jangkitan. Ritovid Tablet boleh menyembunyikan demam yang merupakan salah satu tanda jangkitan
- anda mempunyai tindak balas hipersensitif yang berkaitan mengambil *non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)*
- anda sedang mengandung atau ingin mengandung
- anda sedang menyusukan anak atau ingin menyusukan anak

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ritovid Tablet mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ubat-ubatan yang anda ambil. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

Mereka termasuklah:

- ubat-ubatan yang menipiskan darah (antikoagulan) seperti *warfarin*
- *rifampicin* (antibiotik)
- *methotrexate* (sejenis ubat yang digunakan untuk sistem imun, dan sering digunakan dalam arthritis reumatoid)
- ubat (Diuretics) yang menolong mengurangkan jumlah air dalam badan dan mengurangkan kesan-kesan pengumpulan air seperti *bumetanide*, *frusemide*, *hydrochlorothiazide*, *amiloride* dan *spironolactone*
- ubat yang digunakan untuk membantu mengawal tekanan darah tinggi dan masalah jantung

RITOID TABLET 120 MG

Etoricoxib (120 mg)

yang dipanggil *ACE inhibitor* dan penghalang reseptor angiotensin, termasuklah *captopril*, *enalapril*, *perindopril*, *losartan*, *telmisartan*, *vasartan*

- ubat yang digunakan untuk membantu mengawal tekanan darah tinggi dan masalah jantung seperti *atenolol*, *bisoprolol* dan *carvedilol*
- *litium* (ubat yang digunakan untuk merawat gangguan mental)
- *aspirin* (untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana)
- pil kawalan kelahiran (gabungan mungkin meningkatkan risiko kesan sampingan yang berkaitan dengan pil kontraseptif)
- terapi penggantian hormon (HRT) (kombinasi ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan yang berkaitan dengan HRT)
- *abciximab* (untuk pencegahan agregasi platelet), *dipyridamole* (ubat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah), *fondaparinux* (untuk pencegahan pembentukan bekuan darah), *heparin* (digunakan sebagai penipisan darah) dan *tirofiban* (untuk pencegahan pembentukan bekuan darah) kerana ini akan meningkatkan risiko pendarahan
- *citalopram* (untuk merawat kemurungan), *clopidogrel* (untuk pencegahan perkumpulan platelet), *dabigatran etexilate* (untuk pencegahan pembentukan bekuan darah), *duloxetine* (untuk rawatan penyakit psikiatri) , *enoxaparin* (untuk pencegahan pembekuan darah), *escitalopram* (antidepresan), *fluoxetine* (antidepresan), *ginkgo* (meningkatkan fungsi kognitif), *paroxetine* (untuk rawatan episod-episod kemurungan yang serius), *pentoxifylline* (antidepresan), *prasugrel* (mencegah pembekuan darah), *rivaroxaban* (mencegah pembekuan darah), *tinzaparin* (mencegah pembekuan darah), dan *venlafaxine* (antidepresan), yang boleh mengakibatkan peningkatan risiko pendarahan
- *diltiazem* (untuk rawatan tekanan darah tinggi dan mencegah angina), *felodipine*, (untuk rawatan

hipertensi), *flunarizine* (untuk pencegahan migrain), *nicardipine* (untuk rawatan tekanan darah tinggi dan mencegah angina), *nifedipine* (untuk rawatan tekanan darah tinggi dan mencegah angina), dan *nimodipine* (untuk rawatan tekanan darah tinggi dan mencegah angina) yang boleh mengakibatkan peningkatan risiko pendarahan gastrointestinal dan / atau menentang kesan hipotensi

- *levofloxacin* (untuk rawatan jangkitan bakteria), *ofloxacin* (untuk rawatan jangkitan bakteria) dan *norfloxacin* (untuk rawatan jangkitan bakteria) yang boleh mengakibatkan peningkatan risiko kejang
- *gliclazide* (untuk rawatan diabetes mellitus Type 2), *glimepiride* (untuk rawatan diabetes mellitus Type 2) dan *glipizide* (untuk mengawal paras gula darah) yang boleh menyebabkan peningkatan risiko hipoglisemia
- *cyclosporin* (untuk menindas sistem imun)
- *ketorolac* (mencegah dan melegakan keradangan)
- *minoxidil* (ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi)
- *tacrolimus* (untuk menindas sistem imun)

Interaksi lain yang tidak disenaraikan mungkin boleh berlaku. Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain.

Cara menggunakan Ritovid Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Arthritis

- *Osteoarthritis*
Dos yang disyorkan adalah 30 mg sekali sehari, meningkat sehingga maksimum 60 mg sekali sehari jika diperlukan.
- *Arthritis reumatoid*

Dos yang disyorkan ialah 60 mg sekali sehari, meningkat kepada maksimum 90 mg sekali sehari jika diperlukan

• *Ankylosing Spondylitis*

Dos yang disyorkan ialah 60 mg sekali sehari, meningkat kepada maksimum 90 mg sekali sehari jika diperlukan

• *Keadaan yang menyakitkan akut*

Ritovid Tablet harus digunakan hanya untuk tempoh menyakitkan akut.

Gout: Dos yang disyorkan ialah 120 mg sekali sehari yang hanya boleh digunakan untuk tempoh menyakitkan akut, terhad kepada maksimum 8 hari rawatan.

Kesakitan pembedahan pergigian selepas operasi: Dos yang disyorkan adalah 90 mg sekali sehari, terhad kepada maksimum 3 hari rawatan.

Orang dengan masalah hati

- Jika anda mempunyai penyakit hati ringan, anda tidak boleh mengambil lebih dari 60 mg sehari.
- Jika anda mempunyai penyakit hati yang sederhana, anda tidak boleh mengambil lebih dari 30 mg sehari.

Penggunaan pada kanak-kanak dan remaja

Ritovid Tablet tidak boleh diambil oleh kanak-kanak atau remaja di bawah umur 16 tahun.

Tua

Tiada penyesuaian dos diperlukan untuk pesakit yang berusia lanjut. Seperti ubat-ubatan lain, berhati-hati harus dilakukan pada pesakit tua.

- Bila hendak menggunakannya

Ritovid Tablet adalah untuk kegunaan lisan. Ambil tablet sekali sehari. Ritovid Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Ritovid Tablet pada masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakannya

RITOID TABLET 120 MG

Etoricoxib (120 mg)

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Kalau anda tertinggal dos, ambil dos yang seterusnya secara biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda tidak boleh mengambil tablet berlebihan daripada doktor mencadangkan.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Ritovid Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda:

- jika anda mengalami reaksi alahan/apa-apa kesan sampingan yang tidak diingini semasa mengambil ubat
- jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Ritovid Tablet.

Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan:

- berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda
- berkongsi Ritovid Tablet dengan orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda atau keadaan yang sama dengan anda.
- mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

- guna Ritovid Tablet selepas tarikh luput.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan Mengendalikan jentera

Pesakit yang mengalami pening kepala, vertigo atau perihai mengantuk semasa mengambil etoricoxib perlu elakkan diri daripada memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ritovid Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan seperti yang berikut selepas mengambil ubat ini.

Mereka termasuklah:

- tindak balas alahan yang boleh merangkumi masalah kulit seperti ulser atau kulit yang melepuh, atau kebengkakan muka, bibir, lidah atau tekak yang boleh mengakibatkan kesukaran bernafas
- kelemahan otot, kekebasan, kadar kalium yang tinggi dalam darah anda, perubahan pada ujian darah atau ujian air kencing yang berkaitan dengan buah binggang anda (hyperkalemia)
- masalah buah pinggang yang serius
- palpitasi (denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur), irama jantung tidak teratur (arrhythmia), sakit dada
- peningkatan tekanan darah yang teruk yang boleh mengakibatkan strok (krisis hipertensi)
- kesukaran bernafas, rasa sesak dalam dada (bronkospasme)
- sakit perut, ulser mulut, ulser perut, keradangan di kawasan lapisan perut yang boleh menjadi serius dan boleh menyebabkan pendarahan, muntah, cirit-birit.
- kulit dan mata menjadi kuning (penyakit kuning), keradangan hati (hepatitis)
- kebingangan, kesukaran untuk tidur, kekeliruan, melihat, merasa atau mendengar perkara yang tidak

ada (halusinasi), kekeliruan, kemurungan, kegelisahan

- ketidakupayaan untuk merasa, mengantuk
- kabur penglihatan
- pembengkakan muka, ruam kulit atau kegatalan kulit, kemerahan kulit

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ritovid Tablet

- Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Bulat, 10.0 mm dalam diameter, merah tablet bersalut filem, tepi serong, muka cembung cetek.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ritovid Tablet 120 mg mengandungi 120 mg etoricoxib.

- Bahan-bahan tidak aktif

- Dicalcium Phosphate Dihydrate
- Croscarmellose Sodium
- Polyvinylpyrrolidone
- Magnesium Stearate

RITOID TABLET 120 MG

Etoricoxib (120 mg)

- *Microcrystalline Cellulose*
- *Propylene glycol*
- *Talc*
- *Titanium dioxide*
- *Iron oxide red*
- *Hydroxypropyl methylcellulose E-5*
- *Hydroxypropyl methylcellulose E-15*
- *Purified water*

- Nombor MAL:
MAL18086136AZ

Pengilang

HOVID Bhd.
Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan Ipoh/
Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

HOVID Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/10/2024