

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY

Beclomethasone dipropionate

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan BECONASE
2. Bagaimana BECONASE berfungsi
3. Sebelum mengambil BECONASE
4. Cara menggunakan BECONASE
5. Semasa menggunakan BECONASE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan BECONASE
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan BECONASE

Beconase digunakan untuk mencegah dan merawat:

- Radang pada lapisan hidung (rhinitis) yang disebabkan oleh alahan musim, seperti Hayfever.
- Radang pada hidung (rhinitis) yang disebabkan oleh alahan sepanjang tahun, seperti alahan kepada binatang.

Bagaimana BECONASE berfungsi

Beconase Aqueous Nasal Spray

mengandungi ubat bernama beclomethasone dipropionate.

Ubat ini tergolong di dalam kumpulan ubat yang dipanggil steroid (juga dipanggil 'corticosteroids').

- steroid mengurangkan keradangan
- steroid mengurangkan kebengkakan dan kegatalan pada hidung anda
- ini membantu melegakan kegatalan, bersin, selesema dan hidung tersumbat.

Sebelum mengambil BECONASE

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Beconase jika anda alah kepada beclomethasone dipropionate atau mana-mana bahan di dalam ubat ini.

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

- Sebelum mula mengambil

Jika anda hamil atau menyusukan anak, berkemungkinan hamil atau merancang untuk hamil, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu sebelum mengambil ubat ini.

Jika anda mengalami gangguan penglihatan seperti kehilangan penglihatan, atau penglihatan kabur, hubungi doktor anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda sekiranya anda sedang mengambil atau telah mengambil ubat lain, termasuklah ubat yang telah didapatkan tanpa preskripsi. Ini termasuklah ubat herba. Sebelum mengambil ubat ini, berbincang terlebih dahulu dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya:

- anda telah mengambil steroid untuk jangka masa yang panjang, sama ada melalui suntikan atau secara pemakanan.
 - anda sedang mengalami jangkitan pada bahagian hidung anda.
- Jika anda kurang pasti terdapat mana-mana di atas berkaitan dengan anda, berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Beconase.

Cara menggunakan BECONASE

- Berapa banyak harus digunakan

Gunakan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Bertanyalah dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda kurang pasti.

Dewasa dan kanak-kanak (berumur 6 tahun ke atas)

- Dos permulaan yang biasa adalah 2 semburan ke dalam kedua-dua lubang hidung 2 kali sehari.
- Sebanyak 8 semburan dalam tempoh 24 jam (4 semburan setiap lubang hidung).


- Sebelum mula mengambil

- Sekiranya simptom berkurangan, anda boleh meminta doktor mengurangkan dos – satu semburan setiap lubang hidung dua kali sehari.
- Jika simptom anda menjadi teruk semula setelah mengurangkan dos, anda boleh menambah semula sehingga seperti dos permulaan.
- Jangan gunakan dos yang lebih tinggi atau menyembur lubang hidung anda lebih kerap daripada yang diarahkan oleh doktor anda.

Menggunakan semburan



Raj. 1 Sebelum menggunakan semburan, hembus hidung anda terlebih dahulu. Anda perlu ingat yang dos biasa adalah dua semburan ke dalam setiap lubang hidung, melainkan diarahkan oleh doktor.




Raj. 2 Guncang botol, kemudian tanggalkan penutup dan pegang seperti di dalam gambar. Jika anda menggunakan semburan ini untuk pertama kali atau telah tidak menggunakan semburan ini selama seminggu atau lebih, sembur terlebih dahulu ke udara untuk menguji alat semburan. Semburan sedia digunakan apabila ubat keluar seperti kabus halus.

dan jari tengah anda sambil ibu jari menyokong bahagian bawah botol.



Raj. 3 Tutup sebelah lubang hidung anda dengan ibu jari. Masukkan alat semburan ke dalam lubang hidung. Sambil menarik nafas dengan perlahan, tekan alat pemegang menggunakan jari telunjuk dan jari tengah anda sambil ibu jari menyokong bahagian bawah botol.



Raj. 4 Keluarkan nafas melalui mulut dan ulang sekali lagi untuk semburan kedua pada lubang hidung yang sama.



Raj. 5 Ulangi proses yang sama untuk lubang hidung satu lagi.



Raj. 6 Tutup semula botol setelah selesai.

Membersih

Untuk membersihkan alat semburan, tanggalkan penutup, tekan pemegang dan tarik ke atas dengan perlahan dan alat semburan akan tertanggal. Basuh alat semburan dan penutup menggunakan air paip yang mengalir. Keringkan dan pasang semula alat semburan pada botol dan tutup dengan penutup. Sekiranya alat semburan tersumbat, tanggalkan penutup, cabut seluruh sistem semburan dan rendam di dalam air suam untuk beberapa minit. Bilas menggunakan air paip yang mengalir, keringkan dan pasang semula pada botol.

- Bila perlu digunakan

Anda boleh menggunakan Beconase pada bila-bila masa, sebelum atau selepas makan. Anda boleh menggunakan semburan ini setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Ubat ini mengambil masa beberapa hari untuk berkesan. Teruskan penggunaan walaupun anda tidak merasakan apa-apa perubahan. Jangan hentikan rawatan walaupun anda berasa sihat, melainkan atas arahan doktor. Jika anda menghentikan rawatan terlalu awal, kemungkinan simptom akan kembali. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang ubat ini, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil ubat ini, teruskan dengan dos yang seterusnya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda jika anda telah menggunakan ubat ini lebih dari yang diarahkan.

Adalah amat penting yang anda menggunakan ubat ini sepertimana

yang diarahkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.

Anda seharusnya menggunakan ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor anda; mengambil ubat ini secara berkurangan atau berlebihan mungkin akan menyebabkan simptom anda menjadi lebih teruk.

Semasa menggunakan BECONASE

- Perkara yang perlu dilakukan

Bertanya dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini dan menggunakan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil dos yang berlebihan atau menggunakan semburan lebih dari yang diarahkan oleh doktor.

Ubat ini telah ditentukan untuk anda. Jangan berikannya kepada pesakit lain. Ianya boleh membahayakan mereka, walaupun simptom yang mereka alami adalah sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Beconase tidak mungkin akan mengganggu pemanduan atau penggunaan alat atau jentera.

Jika anda mengambil Beconase secara berlebihan

Mungkin ada ketika di mana doktor anda perlu mengubah dos pengambilan steroid atau cara pengambilan ubat ini. Sebagai contoh:

- sewaktu anda tertekan secara terlampau
 - sewaktu anda dimasukkan ke wad selepas kemalangan, kecederaan atau sakit yang teruk
 - sebelum dan selepas pembedahan.
- Jika anda merasakan mana-mana yang di atas berkaitan dengan anda semasa menggunakan Beconase, berbincanglah dengan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat lain, ubat ini boleh mendatangkan kesan sampingan walaupun tidak semua pesakit akan mengalaminya. Berikut adalah kesan sampingan yang mungkin terjadi disebabkan oleh pengambilan ubat ini:

Reaksi alahan: dapatkan perhatian doktor segera

Sejumlah kecil pesakit akan mengalami reaksi alahan dari penggunaan Beconase, yang mana boleh menjadi lebih teruk dan boleh membahayakan kesihatan jika tidak dirawat.

Simptom termasuk:

- nafas berbunyi atau mengalami kesukaran bernafas
 - bengkak di muka atau tekak
- Sekiranya ini berlaku, dapatkan perhatian doktor dengan segera – anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Sejurus selepas anda menggunakan semburan

- Anda mungkin bersin seketika, namun ini tidak akan berterusan.
- Kadang kala anda akan mendapat rasa atau bau yang kurang menyenangkan.

Hubungi doktor anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang berikut:

Kesan sampingan biasa berlaku (mungkin terjadi kepada 1 daripada 10 pesakit)

- Tekak yang kering atau pedih
- Perdarahan hidung yang teruk

Kesan sampingan yang jarang berlaku (boleh menjejaskan 1 dalam 10,000 orang)

- Masalah mata seperti sakit atau penglihatan kabur
- Kerosakan pada hidung anda, pengeluaran biasa steroid dalam badan anda akan terjejas tetapi ianya

sangat jarang berlaku. Ia mungkin berlaku jika anda menggunakan dos yang tinggi untuk maas yang lama. Doktor anda akan membantu menghentikannya dengan memastikan anda menggunakan dos steroid yang paling rendah untuk mengawal simptom anda. Kesan sampingan ini boleh merencat tumbesaran kanak-kanak tetapi ia jarang berlaku. Ketinggian kanak-kanak yang menerima rawatan ini dalam jangka masa yang panjang akan dipantau secara berkala oleh doktor mereka.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [(Consumers → Reporting of Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan BECONASE

- Penyimpanan

- Jauhkan ubat ini dari kanak-kanak.
- Lindungi dari fros dan cahaya.
- Simpan dalam suhu tidak melebihi 30°C.
- Jangan simpan di dalam peti sejuk.
- Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera di atas label dan kotak selepas perkataan 'EXP'. Tarikh luput adalah merujuk kepada hari akhir dalam bulan tersebut.
- Jangan gunakan ubat ini selepas tiga bulan botol dibuka.
- Jika anda diarahkan untuk berhenti menggunakan ubat ini, serahkan ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi anda untuk pelupusan.

- Pelupusan

Ubat ini tidak boleh dibuang secara air buangan atau buangan rumah. Tanya ahli farmasi anda tentang cara untuk membuang ubat apabila ianya tidak

lagi diperlukan. Cara ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Beconase Aqueous Nasal Spray adalah dalam bentuk cecair akueus beclomethasone dipropionate sangat halus yang disalurkan di dalam pam pengabus bermeter. Setiap 100 mg yang disemur mengandungi 50 mikrogram beclomethasone. Setiap botol mengandungi kira-kira 200 semburan mengikut kegunaan yang dicadangkan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Beclomethasone dipropionate

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, Carboxymethylcellulose sodium, Glucose anhydrous, Polysorbate 80, Purified water., Benzalkonium chloride., Phenylethylalcohol, Hydrochloric acid.

- Nombor MAL

MAL19971288ARZ

Pengilang

Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Spain.

Pemegang Pendaftaran Produk

GlaxoSmithKline Pharmaceutical Sdn. Bhd.
HZ.01, Horizon Penthouse,
1 Powerhouse,
1, Persiaran Bandar Utama,
Bandar Utama,
47800 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

01/09/2022

Nombor Siri

NPRA (R1/2) 9012019/007