

DEXATROL EYE DROPS

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Dexamethasone (1.0 mg), Neomycin (5.0 mg), Polymyxin B Sulphate (6000 IU)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dexatrol
2. Bagaimana Dexatrol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dexatrol
4. Cara menggunakan Dexatrol
5. Semasa menggunakan Dexatrol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dexatrol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dexatrol

Dexatrol adalah ubat titis mata. Ubat ini digunakan untuk merawat radang mata.

Bagaimana Dexatrol berfungsi

Dexatrol mengandungi *dexamethasone*, agen kortikosteroid atau anti-radang yang akan membantu melegakan keradangan dan kemerahan. Ia juga mengandungi 2 jenis antibiotik, *neomycin* dan *polymyxin B sulphate* untuk mencegah jangkitan mata.

Sebelum menggunakan Dexatrol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Dexatrol jika:

- Anda mempunyai sebarang jenis jangkitan pada mata yang tidak dirawat.
- Jika anda mempunyai mata merah yang belum dilihat oleh doktor.
- Jika anda alah kepada *neomycin* atau mana-mana ramuan Dexatrol lain.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Dexatrol jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Dexatrol jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan Dexatrol

Anda perlu merujuk kepada doktor anda:

- Jika anda mempunyai mata merah
- Jika anda mengalami gangguan menyebabkan penipisan tisu mata
- Jika anda alah terhadap apa-apa jenis antibiotik

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Mengambil Dexatrol dengan ubat lain boleh meningkatkan keseriusan kesan sampingan. Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat anti-radang bukan steroid (NSAID) topikal. Penggunaan serentak steroid topikal dan NSAID topikal boleh meningkatkan masalah penyembuhan di mata anda.

Cara menggunakan Dexatrol

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos biasa ialah 1 atau 2 titis ke dalam ruang antara kelopak mata dan mata anda, 4-6 kali sehari, atau lebih kerap jika diperlukan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan

hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Sekiranya anda meletakkan ubat ini terlalu banyak mata pada mata anda, anda mungkin mengalami sedikit kerengsaan kecil di mata anda dan mata anda mungkin berair dan menjadi merah. Hal ini akan berlalu tetapi jika anda bimbang, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan Dexatrol

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dexatrol.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Anda disyorkan untuk selalu menjalani pemeriksaan tekanan mata semasa menggunakan ubat ini.

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika mata anda sakit, kemerahan, bengkak, atau kerengsaan menjadi lebih teruk atau berterusan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Dexatrol dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Jangan menyuntik atau menelan ubat ini.

Jangan sentuh muncung bekas penitis untuk mengelakkan pencemaran ubat ini.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Anda mungkin mengalami penglihatan kabur selepas menggunakan Dexatrol. Jangan memandu atau menggunakan mana-mana mesin kecuali penglihatan anda adalah normal.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dexatrol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda mungkin mengalami beberapa atau semua kesan berikut di mata anda:

- Reaksi alahan
- Peningkatan tekanan mata
- Jangkitan sekunder

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://npra.gov.my> (Pengguna → Pelaporan Kesan Sampingan Ubat-ubatan(ConSERF) atau Kesan Advers Vaksin (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Dexatrol

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan gunakan Dexatrol 28 hari selepas pembukaan pertama.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan

lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Dexatrol adalah larutan berwarna putih di dalam botol penitis plastik yang fleksibel.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Dexamethasone 1.0mg
Neomycin 5.0 mg
Polymyxin B sulphate 6000 IU
- Bahan tidak aktif
Benzalkonium chloride, Disodium edetate, Polysorbate 80, Sodium chloride, Water for injection, Hydroxypropyl methylcellulose.

- Nombor MAL

MAL14050001AZ

Pengilang

Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. (EIPICO)
Tenth of Ramadhan City,
Industrial Area B1,
P. O. Box: 149 Tenth,
Egypt
Tel: +2015 499199
Fax: +2015 499306

Pemegang Pendaftaran Produk

Averroes Pharmaceutical Sdn. Bhd
03-08-01 & 03-09-01, Block 3, Presint Alami, Worldwide Business Centre II, Persiaran Akuatik, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/6/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)190307/72