

KALQUEST® Powder for Oral Suspension 5g/sachet

Calcium Polystyrene Sulphonate (5 g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Kalquest®
2. Bagaimana Kalquest® berfungsi
3. Sebelum menggunakan Kalquest®
Cara menggunakan Kalquest®
4. Semasa menggunakan Kalquest®
5. Kesan-kesan sampingan
6. Cara penyimpanan dan pelupusan Kalquest®
7. Maklumat lanjut
8. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
9. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Kalquest®

Kalquest® mengandungi ubat yang dipanggil *calcium polystyrene sulfonate*. Ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil 'resin pertukaran ion'. Kalquest® digunakan untuk merawat hiperkalemia, keadaan ketika terlalu banyak kalium dalam darah anda disebabkan oleh kegagalan buah pinggang.

Bagaimana Kalquest® berfungsi

Kalquest® berfungsi dengan mengeluarkan lebihan kalium ini untuk menstabilkan semula tahap kalium anda.

Sebelum menggunakan Kalquest®

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Kalquest® jika anda:

- Alah terhadap *calcium polystyrene sulfonate* atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Mempunyai tahap kalium yang rendah dalam darah anda
- Mempunyai masalah perubatan yang mengakibatkan kalsium tinggi seperti masalah kelenjar tiroid
- Mempunyai usus yang tersekat sebahagian atau sepenuhnya
- Sedang mengambil pemanis yang dipanggil sorbitol.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Kalquest® jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Kalquest® jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan Kalquest®

Semak dengan doktor, jururawat atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Kalquest®. Sekiranya ia untuk bayi anda, beritahu mereka jika bayi anda dilahirkan pramatang, mempunyai berat badan yang rendah atau mempunyai gerakan usus yang berkurangan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Khususnya, tidak disyorkan untuk mengambil Kalquest® bersama-sama dengan ubat-ubatan yang digunakan sebagai julap, sama ada melalui oral atau rektum kerana ia boleh menyebabkan kecederaan serius pada kolon.

Kalquest® harus digunakan dengan berhati-hati jika anda juga mengambil:

- Ubat yang mengandungi garam seperti magnesium, kalium atau kalsium. Tanya doktor anda jika anda tidak pasti
- Sesetengah ubat untuk sembelit (julap) yang mengandungi magnesium
- Sesetengah ubat untuk pencernaan (antacid) yang mengandungi magnesium atau aluminium
- Digoxin atau ubat-ubatan yang serupa dari digitalis - untuk masalah jantung
- Lithium - untuk penyakit mental
- Levothyroxine atau tiroksin - untuk tiroid yang kurang aktif

Cara menggunakan Kalquest®

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi. Dos ubat adalah bergantung kepada keputusan ujian darah.

Dos yang disyorkan:

15 - 30g sehari dibahagikan dalam 2 -3 dos. Setiap dos perlu dibancuh dalam 30 - 50ml air dan diberikan secara oral.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan Kalquest® yang berlebihan boleh menyebabkan kadar kalium rendah di dalam darah (hipokalaemia) dengan gejala kekejangan otot, ketidakselesaan kaki, rasa marah atau keliru, tidak dapat menumpukan perhatian dan denyutan jantung yang tidak normal. Overdos Kalquest® juga boleh menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah (hiperkalsemia), dengan gejala seperti keletihan, kelemahan otot, masalah buah pinggang dan sembelit.

Semasa menggunakan Kalquest®

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Kalquest®.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Kalquest® dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Kalquest® boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini seperti yang berikut:

- Merasakan penat, keliru, mengalami kelemahan otot, kekejangan atau perubahan pada kadar jantung. Ini mungkin disebabkan oleh tahap potassium yang rendah di dalam badan anda
- Rasa gelisah, sawan atau kekejangan otot. Ini mungkin disebabkan tahap rendah kalsium atau magnesium dalam badan anda
- Meningkatkan rasa dahaga atau perlu pergi ke tandas lebih kerap
- Tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang, masalah jantung atau

bengkak pada anggota badan anda. Ini mungkin disebabkan tahap tinggi natrium (garam) dalam badan anda

- Sakit perut, kesakitan di usus anda, usus sempit atau sumbat
- Mengurangkan aliran darah ke dinding usus menyebabkan kesakitan perut yang teruk, atau runtuh
- Hilang selera makan
- Mual, muntah, sembelit atau cirit-birit
- Merasakan sesak nafas atau batuk. Ini boleh menjadi tanda pertama jangkitan dada yang serius. Ini boleh disebabkan oleh penyedutan ubat ini secara tidak sengaja.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web <http://nprra.moh.gov.my> (Orang Awam → Lapor Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Kalquest®

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sebelum dibancuh: Kalquest® adalah serbuk halus, berwarna krim dengan aroma mocha dan sedikit manis.

Selepas dibancuh: Kalquest® adalah cecair, berwarna krim dengan aroma mocha dan sedikit manis.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Setiap sachet mengandungi 5 g
Calcium polystyrene sulfonate

- Bahan tidak aktif
Povidone, Mocca SD R0925118, dan ekstrak Stevia.

- Nombor MAL
MAL*****

Pengilang

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories
Jl. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik,
Gunung Putri, Bogor 16962
Indonesia

Pemegang Pendaftaran Produk

Averroes Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
03-08-01 & 03-09-01, Block 2,
Presint Alami, Worldwide Business
Center II, Persiaran Akuatik, Seksyen 13,
40100 Shah Alam, Selangor
Malaysia
Tel : +603 5511 1433
Fax: +603 5511 1431

Tarikh kemaskini RiMUP

11/07/2018

Nombor Siri