

BREACOL EXPECTORANT FOR CHILDREN

Guaifenesin (50mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Breacol Expectorant for Children
2. Bagaimana Breacol Expectorant for Children berfungsi
3. Sebelum menggunakan Breacol Expectorant for Children
4. Cara menggunakan Breacol Expectorant for Children
5. Semasa menggunakan Breacol Expectorant for Children
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Breacol Expectorant for Children
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Breacol Expectorant for Children

Breacol Expectorant for Children digunakan sebagai ekspektoran untuk melegakan batuk yang disebabkan oleh selsema atau jangkitan saluran pernafasan.

Bagaimana Breacol Expectorant for Children berfungsi

Breacol Expectorant for Children mengandungi Guaifenesin yang bertindak sebagai ekspektoran yang memudahkan penyingkiran mukus.

Sebelum menggunakan Breacol Expectorant for Children

- Bila tidak boleh menggunakan
Apabila anda hipersensitif kepada Guaifenesin atau sebarang bahan kandungan lain dalam rumusan
- Sebelum menggunakannya
Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini. Penggunaan semasa hamil dan menyusukan anak hendaklah dipertimbangkan berdasarkan manfaat risiko. Beritahu doctor atau ahli farmasi jika anda hamil atau sedang menyusukan anak.
- Jika mengambil ubat-ubat lain
Rujuk doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil ubat lain.

Cara menggunakan Breacol Expectorant for Children

- Berapa banyak harus digunakan
DOS:
Umur: 2 hingga 6 tahun: Ambil 1-2 sudu teh (5—10ml) setiap 4 jam seperti yang diperlukan.
Umur: 6-12 tahun: Ambil 2-4 sudu teh (10-20ml) setiap 4 jam seperti yang diperlukan.
- Jangan berikan kepada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun. Hubungi doktor anda sebelum memberikan ubat ini.
Ambil ubat ini dengan berhati-hati dan dapatkan nasihat doktor/ahli farmasi anda bagi kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun.

- Bila perlu digunakan
Ambil Breacol Expectorant for Children setiap 4 jam apabila perlu.
- Berapa lama perlu digunakan
Jika anda batuk lebih daripada seminggu, hubungi doktor anda.
- Jika anda terlupa menggunakan
Jika anda terlupa mengambil Breacol Expectorant for Children, ambil ubat ini pada dos berikutnya.
- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)
Pengambilan berlebihan boleh menyebabkan loya dan muntah. Guaifenesin juga boleh memberikan kesan pembuangan asid urik yang ringan, manakala dos tinggi boleh menyebabkan terbentuknya batu karang dalam buah pinggang, pundi atau salur kencing. Jika anda mengambil ubat ini lebih daripada yang sepatutnya, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Breacol Expectorant for Children

- Perkara yang perlu dilakukan
Jauhi ubat daripada kanak-kanak.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan ambil ubat melebihi dos yang disyorkan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Jika anda ingin mengambil ujian sindrom karsinoid, beritahu doktor yang anda sedang mengambil ubat ini kerana ia boleh mengubah keputusan ujian ini. Jika simptom berterusan, hubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Breacol Expectorant for Children jarang menyebabkan rasa tidak selesa pada gastrousus dan mengantuk.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Breacol Expectorant for Children

- Penyimpanan
 - Jangan ambil Breacol Expectorant for Children selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada pembungkus selepas 'Exp'.
 - Jangan simpan Breacol Expectorant for Children di atas suhu 30°C.
- Pelupusan
Buang botol sebaik sahaja ubat habis atau selepas tamat tempoh.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Cecair jernih berwarna merah, tiada benda asing dan hablur. Mempunyai bau dan rasa pudina dan ceri yang lembut.
- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif: Guaifenesin
 - Bahan tidak aktif: sodium benzoate, potassium sorbate, cherry flavour, peppermint oil, citric acid anhydrous, saccharin sodium, sucrose, sodium citrate, FD&C Red No.40, air tulen.

- Nombor MAL

MAL13115225X

Pengilang

PT Menarini Indria Laboratories
Jl. Akasia II Blok A-9 No.5,
Delta Silicon I Industrial Park Lippo
Cikarang, Bekasi 17550,
Jawa Barat, Indonesia

Pemegang Pendaftaran Produk

A. Menarini Singapore Pte. Ltd.
B-18-2, Level 18, The Ascent Paradigm,
No 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

23 Jul 2025

Nombor Siri

BPFK(R4/1)230517/00111