

COVERAM TABLET

Perindopril arginine / amlodipine (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg & 10mg/10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Coveram
2. Bagaimana Coveram berfungsi
3. Sebelum menggunakan Coveram
4. Cara menggunakan Coveram
5. Semasa menggunakan Coveram
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coveram
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Coveram

Coveram digunakan untuk rawatan tekanan darah tinggi dan / atau rawatan penyakit arteri koronari stabil (di mana bekalan darah ke jantung telah berkurangan atau terhalang). Pesakit yang sedang mengambil tablet *perindopril* dan *amlodipine* berasingan boleh mengambil sebiji tablet Coveram yang mengandungi dua bahan tersebut.

Bagaimana Coveram berfungsi

Coveram adalah kombinasi dua bahan aktif iaitu *perindopril* dan *amlodipine*. *Perindopril* adalah *angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor*. *Amlodipine* ialah *calcium antagonist* (yang tergolong dalam kelas ubat *dihydropyridines*). Kedua-dua bahan ini bertindak membesarkan saluran darah, seterusnya memudahkan jantung anda mengepam darah didalamnya.

Sebelum menggunakan Coveram

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Coveram

- jika anda alah (hipersensitif) terhadap *perindopril* atau *ACE inhibitor* yang lain atau *amlodipine* atau mana-mana *calcium antagonists* lain atau sebarang kandungan di dalam ubat ini (sila lihat Seksyen 8),
- Jika anda telah mengandungi lebih daripada 3 bulan. (Elak dari mengambil Coveram pada awal kehamilan – lihat seksyen Mengandung),
- jika anda telah mengalami simptom seperti kesukaran bernafas,

bengkak muka, lidah atau kerongkong, gatal yang teruk atau alahan kulit yang teruk dengan rawatan *ACE inhibitor* yang sebelumnya atau ahli keluarga anda mempunyai simptom tersebut (keadaan yang dipanggil '*angioedema*'),

- jika anda mempunyai diabetes atau kekurangan fungsi ginjal dan sedang dirawat dengan ubat tekanan darah tinggi yang mengandungi *aliskiren*,
- jika anda mempunyai pengecilan saluran darah (*stenosis aorta*) atau renjatan kardiogenik (*cardiogenic shock*) (apabila jantung tidak dapat membekalkan darah yang mencukupi dalam badan),
- jika anda mempunyai tekanan darah rendah yang sangat teruk (hipotensi),
- jika anda mengalami kegagalan jantung selepas serangan jantung.
- jika anda menjalani dialisis atau sebarang jenis penapisan darah yang lain. Bergantung pada mesin yang digunakan, Coveram mungkin tidak sesuai untuk anda,
- jika anda mempunyai masalah buah pinggang di mana bekalan darah ke buah pinggang anda berkurang (*renal artery stenosis*),
- sekiranya anda telah atau sedang mengambil *sacubitril/valsartan*, sejenis ubat untuk kegagalan jantung kerana risiko '*angioedema*' (bengkak yang mendadak di bawah kulit seperti tekak), akan meningkat. (lihat "Amaran dan langkah berjaga-jaga" dan "Ubat-ubat lain dan Coveram")

Sebelum mula menggunakan

Amaran dan langkah berjaga-jaga

Sila berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat sebelum mengambil Coveram jika anda mengalami:

- *hypertrophic cardiomyopathy* (penyakit otot jantung) atau *renal artery stenosis* (penguncupan salur darah yang menyalurkan darah ke ginjal),
- kegagalan jantung,
- peningkatan tekanan darah yang teruk (krisis hipertensif),

- mempunyai masalah jantung yang lain,
- masalah hati,
- masalah buah pinggang atau anda menerima dialisis,
- peningkatan tahap hormon yang dinamakan *aldosterone* dalam darah anda (*primary aldosteronism*),
- penyakit *collagen vascular* (penyakit pada *connective tissue*) seperti *systemic lupus erythematosus* atau *scleroderma*
- diabetes,
- sekiranya anda menjalani diet larangan garam atau menggunakan pengganti garam yang mengandungi kalium (paras darah kalium yang seimbang adalah penting)
- sekiranya anda tua dan dos anda perlu ditingkatkan,
- jika anda mengambil mana-mana ubat berikut yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi:
- satu '*angiotensin II receptor blocker*' (ARB) (juga dikenali sebagai *sartans* - contohnya *valsartan*, *telmisartan*, *irbesartan*), khususnya jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang berkaitan dengan diabetes.
- *aliskiren*.

Doktor anda boleh memeriksa fungsi buah pinggang anda, tekanan darah, dan jumlah elektrolit (misal. kalium) dalam darah anda pada selang masa yang ditetapkan.

Sila rujuk maklumat di "Jangan mengambil Coveram".

- mengambil ubat-ubat berikut, boleh meningkatkan risiko *angioedema*:
 - *racecadotril* (digunakan untuk merawat cirit-birit),
 - *sirolimus*, *everolimus*, *temsirolimus* dan ubat-ubatan lain yang tergolong dalam kelas yang dipanggil *mTor inhibitors* (digunakan untuk mengelakkan penolakan organ yang dipindahkan dan merawat kanser),
 - *sacubitril* (tersedia sebagai gabungan dos tetap dengan *valsartan*) yang digunakan untuk merawat kegagalan jantung jangka panjang,

COVERAM TABLET

Perindopril arginine / amlodipine (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg & 10mg/10mg)

- linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin dan lain-lain ubat di kelas sama bernama 'gliptin' (untuk merawat penyakit kencing manis).
- berasal dari kulit hitam kerana anda mungkin mempunyai risiko *angioedema* yang lebih tinggi dan ubat ini mungkin kurang berkesan dalam menurunkan tekanan darah anda daripada pesakit bukan hitam.

Angioedema

Angioedema (tindak balas alahan yang teruk dengan bengkak bahagian muka, bibir, lidah atau tekak dengan kesukaran menelan atau pernafasan) telah dilaporkan pada pesakit yang dirawat dengan 'ACE inhibitors', termasuk Coveram. Ini mungkin berlaku pada bila-bila masa semasa rawatan. Sekiranya anda mengalami gejala seperti ini, anda perlu berhenti menggunakan Coveram dan segera berjumpa doktor. Lihat juga seksyen 6.

Anda mesti memberitahu doktor jika anda menganggap anda (atau mungkin menjadi) mengandung. Coveram tidak disyorkan pada kehamilan awal, dan tidak boleh diambil jika anda hamil lebih dari 3 bulan, kerana ia boleh menyebabkan bahaya serius pada bayi anda jika digunakan pada tahap tersebut (lihat bahagian Mengandung).

Apabila anda mengambil Coveram, anda juga harus memaklumkan kepada doktor atau kakitangan perubatan jika anda:

- akan melalui pembedahan umum dan / atau pembedahan utama,
- baru-baru ini mengalami cirit-birit atau muntah (sakit)
- akan menjalani LDL *apheresis* (penyingkiran kolesterol dari darah anda oleh mesin),
- akan menjalani rawatan *desensitisation* untuk mengurangkan kesan alahan lebah atau tawon.

Kanak-kanak dan remaja

Coveram tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak dan remaja.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat-ubat lain dan Coveram

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang atau telah mengambil ubat-ubatan lain.

Anda harus mengelakkan Coveram dengan:

- *lithium* (digunakan untuk merawat mania atau kemurungan),
- *estramustine* (digunakan dalam terapi kanser),
- ubat-ubatan *potassium-sparing* (*triamterene*, *amiloride*), makanan tambahan kalium atau pengganti garam yang mengandungi kalium, ubat lain yang boleh meningkatkan kalium dalam badan anda (seperti *heparin*, sejenis ubat untuk menipiskan darah dan mencegah pembekuan darah; *trimethoprim* dan *co-trimoxazole* juga dikenali sebagai *trimethoprim/sulfamethoxazole* untuk jangkitan bakteria),
- ubat-ubatan *potassium-sparing* yang digunakan dalam rawatan kegagalan jantung: *eplerenone* dan *spironolactone* pada dos antara 12.5 mg hingga 50 mg mengikut hari.

Rawatan Coveram boleh diganggu oleh ubat-ubatan lain. Doktor anda mungkin perlu menukar dos anda dan / atau mengambil langkah berjaga-jaga lain jika mengambil:

- ubat-ubatan tekanan darah tinggi lain, termasuk 'angiotensin II receptor blocker' (ARB), *aliskiren* (sila rujuk maklumat di 'Jangan mengambil Coveram' atau diuretik (ubat untuk meningkatkan jumlah air kencing yang dihasilkan oleh buah pinggang),
- ubat-ubatan, yang paling sering digunakan untuk merawat cirit-birit (*racecadotril*) atau mengelakkan penolakan organ-organ yang dipindahkan (*sirolimus*, *everolimus*, *temsirolimus* dan ubat-ubatan lain yang tergolong dalam kelas yang dipanggil *mTOR inhibitors*). Lihat bahagian "Amaran dan langkah berjaga-jaga"

- *sacubitril/valsartan* (digunakan untuk merawat kegagalan jantung jangka panjang). Lihat bahagian "Jangan mengambil Coveram" dan "Amaran dan langkah berjaga-jaga",
- ubat anti-radang bukan steroid (mis. *ibuprofen*) untuk mengurangkan sakit atau *acetylsalicylic acid* (sejenis ubat untuk melegakan kesakitan, meredakan demam atau mencegah kebekuan darah) dalam dos yang tinggi,
- ubat-ubatan untuk merawat kencing manis (seperti insulin),
- ubat-ubatan untuk merawat gangguan mental seperti kemurungan, kecemasan, skizofrenia dan sebagainya (cth. antidepresan *tricyclic*, antipsikotik, antidepresan seperti *imipramine*, *neuroleptics*),
- imunosupresan (ubat-ubatan yang mengurangkan mekanisme pertahanan badan) yang digunakan untuk merawat gangguan autoimun atau menjalani pembedahan pemindahan (cth. *ciclosporine*, *tacrolimus*)
- *trimethoprim* dan *co-trimoxazole* (untuk rawatan jangkitan),
- *allopurinol* (untuk rawatan gout),
- *procainamide* (untuk rawatan denyutan jantung yang tidak teratur),
- *vasodilator* termasuk nitrat (produk yang melebarkan saluran darah),
- *ephedrine*, *noradrenaline* atau *adrenalin* (ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat tekanan darah rendah, kejutan atau asma),
- *baclofen* atau *dantrolene* (infusi) yang digunakan untuk mengubati kekejangan otot dalam penyakit seperti *multiple sclerosis*; *dantrolene* juga digunakan untuk mengubati *malignant hyperthermia* semasa anestesia (gejala termasuk demam yang sangat tinggi dan kekakuan otot),
- beberapa antibiotik seperti *rifampicin*, *erythromycin*, *clarithromycin* (untuk jangkitan yang disebabkan oleh bakteria),
- *Hypericum perforatum* (*St John's wort*, ubatan herba untuk merawat kemurungan),

COVERAM TABLET

Perindopril arginine / amlodipine (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg & 10mg/10mg)

- *simvastatin* (ubat penurun kolesterol),
- agen antiepileptik seperti *carbamazepine*, *phenobarbital*, *phenytoin*, *fosphenytoin*, *primidone*,
- *itraconazole*, *ketoconazole* (ubat-ubatan yang digunakan untuk rawatan jangkitan kulat),
- *alpha-blockers* yang digunakan untuk rawatan prostat yang membesar seperti *prazosin*, *alfuzosin*, *doxazosin*, *tamsulosin*, *terazosin*,
- *amifostine* (digunakan untuk mencegah atau mengurangkan kesan sampingan yang disebabkan oleh ubat lain atau terapi radiasi yang digunakan untuk merawat kanser),
- *corticosteroids* (digunakan untuk merawat pelbagai keadaan termasuk asma dan *rheumatoid arthritis* yang teruk),
- *gold salts*, terutamanya dengan rawatan melalui intravena (digunakan untuk merawat gejala *rheumatoid arthritis*),
- *ritonavir*, *indinavir*, *nelfinavir* (dipanggil *protease inhibitors* yang digunakan untuk merawat HIV).

Cara menggunakan Coveram

- *Berapa banyak harus digunakan*
Ambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Hubungi mereka jika anda tidak pasti. Doktor anda akan menentukan dos yang betul untuk anda. Ini biasanya satu tablet setiap hari.

Coveram biasanya akan ditetapkan untuk pesakit yang sudah mengambil *perindopril* dan *amlodipine* dari tablet berasingan.

Penggunaan pada kanak-kanak dan remaja

Penggunaan pada kanak-kanak dan remaja adalah tidak digalakkan.

- *Bila perlu digunakan*

Telan tablet dengan segelas air. Ambil tablet sebaik-baiknya pada masa yang sama setiap hari, pada waktu pagi, sebelum makan.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Oleh kerana rawatan dengan Coveram adalah sepanjang hayat, anda perlu berbincang dengan doktor sebelum berhenti mengambil ubat ini.

Hubungi doktor, ahli farmasi atau jururawat anda jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai penggunaan ubat ini.

- *Jika terlupa menggunakan*

Adalah penting anda mengambil ubat ini setiap hari seperti yang diarahkan untuk rawatan yang berkesan. Sekiranya anda terlupa, ambil dos yang berikutnya pada masa yang sama. Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa itu.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda mengambil terlalu banyak tablet, hubungi unit kecemasan terdekat atau beritahu doktor anda secepat mungkin. Kesan yang biasa dirasakan adalah tekanan darah rendah yang membuatkan anda berasa pening atau pengsan. Jika ini berlaku, baring dengan menaikkan kaki anda boleh membantu mengurangkan kesan.

Cecair yang berlebihan mungkin terkumpul di dalam paru-paru anda (*edema pulmonari*) dan boleh menyebabkan sesak nafas yang mungkin berpanjangan sehingga 24-48 jam selepas ubat dimakan.

Semasa menggunakan Coveram

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Mengandung dan menyusukan anak

Sekiranya anda mengandung atau menyusukan anak, fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk mempunyai bayi, dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Mengandung

Anda mesti beritahu doktor anda jika anda rasa anda (atau mungkin) mengandung.

Doktor biasanya akan menasihatkan anda supaya berhenti mengambil Coveram sebelum anda hamil atau sebaik sahaja anda tahu anda hamil.

Doktor akan menasihatkan anda supaya mengambil ubat lain dan bukannya Coveram. Coveram tidak digalakkan di awal kehamilan dan tidak boleh diambil apabila mengandung lebih daripada 3 bulan kerana ia boleh menyebabkan kesan mudarat kepada bayi anda jika digunakan selepas 3 bulan kehamilan.

Menyusukan anak

Amlodipine ditunjukkan boleh terkandung dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil. Sila beritahu doktor anda jika anda menyusukan bayi atau ingin mula menyusukan bayi. Coveram tidak disarankan untuk ibu yang menyusukan anak. Doktor anda akan memberi rawatan alternatif jika anda menyusukan anak terutamanya jika bayi anda baru dilahirkan atau pramatang.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Coveram kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan mengendalikan mesin

Coveram mungkin akan mengganggu keupayaan untuk memandu dan mengendalikan mesin. Jika anda mendapat kesan rasa sakit, pening, lemah atau penat atau sakit kepala, jangan memandu dan mengendalikan mesin. Hubungi doktor anda dengan segera.

Coveram dengan makanan dan minuman

Coveram perlu diambil sebelum makan.

Jus limau gedang dan buah limau gedang tidak boleh dimakan oleh orang yang mengambil Coveram. Ini kerana ia boleh menyebabkan peningkatan paras bahan aktif

COVERAM TABLET

Perindopril arginine / amlodipine (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg & 10mg/10mg)

amlodipine dalam darah menyebabkan tekanan darah meningkat yang tidak dapat diramal yang boleh mengurangkan kesan Coveram.

Coveram mengandungi *lactose monohydrate*

Sekiranya anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda tidak toleran terhadap beberapa jenis gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua pesakit akan mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius seperti dibawah, sila berhenti mengambil ubat dan maklumkan doktor anda dengan **segera**:

- berdehid dengan tiba-tiba, sakit dada, sesak nafas, atau kesukaran bernafas,
- bengkak kelopak mata, muka atau bibir,
- bengkak lidah dan tekak, yang menyebabkan kesukaran bernafas,
- reaksi kulit yang teruk termasuk ruam kulit yang sengit, gatal-gatal, kulit kemerahan di seluruh badan anda, gatal-gatal yang teruk, melepuh, kulit mengelupas dan bengkak, keradangan membran mukus (*Stevens Johnson Syndrome*, *Toxic Epidermal Necrolysis*) atau reaksi alahan yang lain
- pening yang teruk atau pingsan,
- serangan jantung, degupan jantung yang luar biasa atau tidak normal, atau sakit dada,
- pankreas yang meradang yang boleh menyebabkan sakit perut dan sakit belakang yang teruk disertai dengan rasa tidak sihat.

Kesan sampingan yang biasa berikut telah dilaporkan. Jika mana-mana kesan ini mengganggu atau **berlanjut lebih daripada satu minggu**, anda perlu **menghubungi doktor anda**.

- Kesan sampingan yang sangat biasa (mungkin memberi kesan lebih

daripada 1 dalam 10 orang): edema (bengkak air).

- Kesan sampingan biasa (boleh memberi kesan sehingga 1 dari 10 orang): sakit kepala, pening, ingin tidur (terutamanya pada permulaan rawatan), *vertigo*, rasa kebas atau sensasi kesemutan pada anggota badan anda, gangguan penglihatan (termasuk penglihatan berganda), *tinnitus* (sensasi bunyi bising di telinga), berdebar-debar (kesedaran degupan jantung anda), muka merah, kepala rasa ringan akibat tekanan darah rendah, batuk, tercungap-cungap, loya (rasa sakit), muntah (sakit), sakit perut, gangguan rasa, *dyspepsia* atau masalah pencernaan, perubahan tabiat usus, cirit-birit, sembelit, reaksi alahan (seperti ruam kulit, gatal-gatal), kekejangan otot, keletihan, kelemahan, pembengkakan pergelangan kaki (edema periferi).

Kesan sampingan lain yang dilaporkan termasuk senarai berikut. Jika mana-mana kesan ini menjadi serius, atau jika anda mendapat kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

- Kesan sampingan yang luar biasa (boleh memberi kesan kepada 1 dalam 100 orang): perubahan mood, keresahan, kemurungan, tidak dapat tidur, gangguan tidur, mengigil, pingsan, hilang rasa sakit, rasa jantung yang tidak teratur, disekat atau hidung berair (*rhinitis*), keguguran rambut, tompok merah pada kulit, perubahan warna kulit, sakit belakang, sakit sendi (*arthralgia*), sakit otot (*myalgia*), sakit dada, gangguan dalam membuang air kencing, peningkatan keperluan buang air kecil pada waktu malam, sakit, rasa tidak sihat, pengetatan dada, berdehid dan sesak nafas (*bronchospasm*), mulut kering, simptom seperti berdehid, bengkak muka atau lidah (*angioedema*), pembentukan kluster lepuh di atas kulit, masalah buah pinggang, mati pucuk, berpeluh, lebihan eosinofil

(sejenis sel darah putih), ketidakselesaian atau pembesaran payudara pada lelaki, peningkatan atau penurunan berat badan, *tachycardia*, keradangan pembuluh darah (*vasculitis*), tindak balas fotosensitif (peningkatan kepekaan kulit kepada matahari), demam, jatuh, perubahan dalam parameter makmal: paras kalium tinggi dalam darah boleh diturunkan selepas berhenti pengambilan ubat, tahap garam yang rendah, *hypoglycaemia* (paras gula darah yang sangat rendah) dalam kes pesakit kencing manis, meningkatkan urea darah, dan meningkatkan kreatinin darah.

- Kesan sampingan yang jarang berlaku (mungkin memberi kesan sehingga 1 dalam 1000 orang): kegagalan buah pinggang akut; simptom keadaan yang dipanggil SIADH (rembesan hormon antidiuretik yang tidak sesuai): air kencing berwarna gelap, rasa mual (loya) atau rasa sakit (muntah), kekejangan otot, kekeliruan dan sawan; keluaran air kencing berkurangan atau tiada; *psoriasis* semakin teruk, perubahan dalam parameter makmal: peningkatan tahap enzim hati, tahap *bilirubin* serum yang tinggi.
- Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku (boleh memberi kesan sehingga 1 dalam 10,000 orang): gangguan kardiovaskular (angina, serangan jantung dan strok), *eosinophilic pneumonia* (sejenis radang paru-paru yang jarang), bengkak kelopak mata, muka atau bibir, bengkak lidah dan tekak, yang menyebabkan kesukaran bernafas, reaksi kulit yang teruk termasuk ruam kulit yang sengit, gatal-gatal, kemerahan kulit di seluruh tubuh anda, gatal-gatal yang teruk, melepuh, kulit mengelupas dan bengkak, keradangan membran mukus (*Stevens Johnson Syndrome*) *erythema multiforme* (ruam kulit yang sering bermula dengan tompok gatal merah pada muka, lengan atau kaki), sensitiviti kepada cahaya, perubahan dalam nilai darah seperti bilangan darah putih

COVERAM TABLET

Perindopril arginine / amlodipine (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg & 10mg/10mg)

dan darah yang lebih rendah, hemoglobin yang lebih rendah, bilangan platelet darah yang lebih rendah, gangguan darah, pankreas yang meradang yang boleh menyebabkan sakit perut dan sakit belakang yang teruk disertai perasaan tidak sihat, kegagalan buah pinggang akut, fungsi hati yang tidak normal, keradangan hati (*hepatitis*), kekuningan kulit (*jaundice*), peningkatan enzim hati yang mungkin memberi kesan ke atas beberapa ujian perubatan, perut kembung (*gastritis*), gangguan saraf yang boleh menyebabkan kelemahan, kesemutan atau kekebasan, peningkatan ketegangan otot, pembengkakan gusi, kandungan gula berlebihan dalam darah (*hyperglycaemia*).

- Kekurangan tidak diketahui (kekurangan tidak dapat dianggarkan dari data yang ada): menggeletar, postur tegar, muka yang tiada ekspresi, pergerakan perlahan dan menyeret kaki, berjalan tidak seimbang, perubahan warna, kebas dan sakit jari atau jari kaki (*Raynaud's phenomenon*).

Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom ini, hubungi doktor anda secepat mungkin.

Jika sebarang kesan sampingan menjadi serius atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan seperti yang diatas, sila beritahu doktor anda atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Coveram

- Penyimpanan

Jauhi dari dicapai atau dilihat oleh kanak-kanak.

Jangan mengambil Coveram selepas tarikh luput yang tercetak pada kotak dan blister.

Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan di bawah 30°C.

- Pelupusan

Jangan buang ubat ini melalui sistem pembuangan air rumah atau bersama bahan buangan yang lain. Sila bertanya ahli farmasi anda cara-cara pembuangan ubat yang tidak diguna. Langkah ini dapat membantu menjaga persekitaran kita.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Coveram 5mg / 5mg ialah tablet yang berwarna putih, berbentuk rod yang diukir dengan 5 / 5 pada satu muka dan  di muka yang lain.

Coveram 10mg / 5mg ialah tablet yang berwarna putih, berbentuk tiga segi yang diukir dengan 10 / 5 pada satu muka dan  di muka yang lain.

Coveram 5mg / 10mg ialah tablet yang berwarna putih, berbentuk empat segi yang diukir dengan 5 / 10 di satu muka dan  di yang lain.

Coveram 10mg / 10mg ialah tablet yang berwarna putih, berbentuk bulat, yang diukir dengan 10 / 10 di satu muka dan  di yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

- Bahan aktif adalah *perindopril arginine* dan *amlodipine besilate*.

Coveram 5mg / 5mg: sebiji tablet mengandungi 3.395 mg *perindopril* bersamaan 5 mg *perindopril arginine* dan 6.935 mg *amlodipine besilate* bersamaan 5 mg *amlodipine*.

Coveram 5mg / 10mg: sebiji tablet mengandungi 3.395 mg *perindopril* bersamaan 5 mg *perindopril arginine* dan 13.870 mg *amlodipine besilate* bersamaan 10 mg *amlodipine*.

Coveram 10mg / 5mg: sebiji tablet mengandungi 6.790 mg *perindopril* bersamaan 10 mg *perindopril arginine* dan 6.935 mg *amlodipine besilate* bersamaan 5 mg *amlodipine*.

Coveram 10mg / 10mg: sebiji tablet mengandungi 6.790 mg *perindopril* bersamaan 10 mg *perindopril arginine* dan 13.870 mg *amlodipine besilate* bersamaan 10 mg *amlodipine*.

- Bahan tidak aktif:

lactose monohydrate, magnesium stearate (E470B), cellulose microcrystalline (E460), colloidal anhydrous silica (E551).

- Nombor MAL

COVERAM 5mg / 5mg:

MAL20091910AZ

COVERAM 5mg / 10mg:

MAL20091912AZ

COVERAM 10mg / 5mg:

MAL20091911AZ

COVERAM 10mg / 10mg:

MAL20091913AZ

Mengandungi 30 tablet sekotak.

Pengilang

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ireland

Pemegang pendaftaran produk

Servier Malaysia Sdn Bhd

Unit No.25-02, Level 25, Imazium

No.8, Jalan SS21/37,

Damansara Uptown

47400 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Tarikh kemaskini RiMUP

16.12.2022

Nombor siri

NPRA (R1/8) 26012023/030