

ARCALION 200 TABLET

Sulbutiamine (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ARCALION TABLET
2. Bagaimana ARCALION TABLET berfungsi
3. Sebelum mula menggunakan ARCALION TABLET
4. Cara menggunakan ARCALION TABLET
5. Semasa menggunakan ARCALION TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ARCALION TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ARCALION TABLET

Produk ini digunakan untuk rawatan simptom keletihan atau kelesuan.

Bagaimana ARCALION TABLET berfungsi

Produk ini menyerupai Vitamin B1. Produk ini membantu dalam proses pengubahan makanan kepada tenaga untuk menjamin sistem saraf yang sihat.

Sebelum mula menggunakan ARCALION TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ARCALION TABLET:

Jika anda alah (hipersensitif) kepada *sulbutiamine* atau mana-mana bahan lain dalam produk ini (di bahagian akhir risalah ini).

- Sebelum menggunakan

ARCALION TABLET

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan produk ini.

Kanak-kanak dan remaja

ARCALION TABLET tidak harus digunakan dalam golongan kanak-kanak dan remaja.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda sedang mengandung, fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk mengandung, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan produk ini.

Penggunaan ARCALION TABLET secara am patut dihindari semasa mengandung. Beritahu doktor anda jika anda fikir anda mengandung.

Anda tidak harus mengambil ARCALION TABLET semasa menyusukan anak. Beritahu doktor anda jika anda sedang menyusukan anak atau sedang merancang untuk menyusukan anak.

- Jika mengguna ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, telah baru-baru ini mengambil, atau akan mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang boleh diperolehi tanpa preskripsi.

ARCALION boleh berinteraksi dengan ubat-ubatan berikut:

- diuretik (digunakan untuk rawatan tekanan darah tinggi);
- *neuromuscular blocking agents* (digunakan dalam anestesia umum).

ARCALION TABLET mengandungi laktosa, glukosa dan sukrosa

Produk ini sepatutnya tidak digunakan oleh golongan dengan ketidaktoleransi terhadap gula atau masalah penyerapan gula.

ARCALION TABLET mengandungi bahan pewarna azo (E110)

Produk ini mengandungi bahan pewarna azo (E110) dan boleh menyebabkan reaksi alahan.

Jika simptom berterusan selama lebih dari 4 minggu, rujuk doktor anda.

Cara menggunakan ARCALION TABLET

Sentiasa gunakan ARCALION TABLET seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

UNTUK KEGUNAAN

GOLONGAN DEWASA SAHAJA
2-3 pil sehari

- Bila perlu digunakan

Seluruh tablet harus ditelan dengan satu gelas air, bahagikan dos antara sarapan dan makan tengahari.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangka masa rawatan dihadkan kepada 4 minggu.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika sudah hampir ke masa untuk mengambil dos seterusnya, tunggu sehingga masa seterusnya dan langkau dos yang terlepas itu. Jangan ambil dua dos untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengguna berlebihan

(terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih ARCALION TABLET dari yang diarahkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Symptom-symptom dos berlebihan yang mungkin dialami termasuk agitasi dengan kegembiraan yang melampau dan tangan dan kaki menggeletar.

Semasa menggunakan ARCALION TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan ARCALION TABLET.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Produk ini telah dipreskripsikan untuk anda. Jangan memberi produk ini kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka, walaupun simptom-symptom mereka adalah sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diperhatikan

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai penggunaan produk

ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti produk lain, ARCALION TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Ini termasuk kesan sampingan:

Jarang berlaku (mungkin menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang tetapi lebih daripada 1 dalam 1,000)

- ruam,
- loya, muntah,
- agitasi,
- sakit kepala,
- menggeletar,
- kelesuan dan ketidakselesaan.

Frekuensi tidak diketahui

- sakit perut, cirit-birit

Melaporkan kesan sampingan

Jika anda mendapat sebarang kesan sampingan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini. Dengan melaporkan kesan sampingan, anda boleh membantu memberi maklumat mengenai keselamatan produk ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ARCALION TABLET

- Penyimpanan

Jauhi produk ini dari penglihatan dan capaian kanak-kanak.

Jangan guna produk ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Jangan buang produk melalui sisa air atau bahan buangan isi rumah. Sila tanya ahli farmasi bagaimana untuk

membuang produk anda yang tidak lagi digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk:

ARCALION TABLET adalah pil dwicembung, bersalut gula berwarna oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Sulbutiamine200mg

- Bahan-bahan tidak aktif:

Maize starch, starch pregelatinised, anhydrous glucose, lactose monohydrate, magnesium stearate, talc, sodium hydrogen carbonate, carmellose sodium, white beeswax, titanium dioxide (E 171), ethylcellulose, sunset yellow FCF aluminium lake (E 110), glyceryl oleate, polysorbate 80, povidone, sucrose, colloidal anhydrous silica.

- Nombor MAL

MAL19911009X

Pengilang

Les Laboratoires Servier Industrie
45520 Gidy
France

Pemegang pendaftaran produk

Servier Malaysia Sdn Bhd
Unit No. 25-02, Level 25, Imazium
No.8, Jalan SS21/37, Damansara
Uptown
47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan

Tarikh kemaskini RiMUP

14.06.2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)130420/00065