

Acriflavine (0.2% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dyna Yellow Lotion
2. Bagaimana Dyna Yellow Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dyna Yellow Lotion
4. Cara menggunakan Dyna Yellow Lotion
5. Semasa menggunakan Dyna Yellow Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Yellow Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dyna Yellow Lotion

Digunakan sebagai antiseptik untuk luka kecil dan terbakar.

Bagaimana Dyna Yellow Lotion berfungsi

Acriflavine hydrochloride adalah disinfektan menghalang pertumbuhan atau pembiakan bakteria dan mempunyai aktiviti anti-kulat.

Sebelum menggunakan Dyna Yellow Lotion

- Bila tidak boleh menggunakan

Mengandung dan menyusukan anak
Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan Dyna Yellow Lotion.

- Sebelum mula menggunakan Dyna Yellow Lotion

Beritahu doktor jika anda hipersensitif kepada Acriflavine atau bahan lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Dyna Yellow Lotion

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada bahagian yang terjejas sebagaimana diperlukan.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan

pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Dyna Yellow Lotion untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Penyediaan ubat ini adalah mudah diterima mengikut arahan yang disyorkan.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Dyna Yellow Lotion

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dyna Yellow Lotion.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri Dyna Yellow Lotion kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan terkena mata atau pada membran mukus.
Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlebihan pada kulit berlaku.

Kesan-kesan sampingan

Dengan dos yang disyorkan dan mengikut arahan, kesan-kesan sampingan berkemungkinan besar tidak berlaku.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Dyna Yellow Lotion

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak untuk mengelakkan keracunan tidak sengaja. Lindungi daripada cahaya
Simpan di tempat kering di bawah 30°C
Pastikan bekas ditutup rapat
Untuk kegunaan luar sahaja

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Losyen berwarna kuning dengan wangian semulajadi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Acriflavine

- Bahan-bahan tidak aktif
Deionised Water, Sodium Benzoate

- Nombor MAL

MAL19910649XZ

DYNA YELLOW LOTION

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Acriflavine (0.2% w/v)

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/11/2024

Nombor siri:

NPRA(R4/1)251018/00302