

DYRITON SYRUP 4MG/5ML

Chlorpheniramine Maleate (4mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DYRITON SYRUP 4MG/5ML
2. Bagaimana DYRITON SYRUP 4MG/5ML berfungsi
3. Sebelum menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML
4. Cara menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML
5. Semasa menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DYRITON SYRUP 4MG/5ML
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

DYRITON SYRUP 4MG/5ML digunakan untuk:

- Melegakan
 - Rinitis (keradangan di dalam hidung) alahan dan bukan alahan
 - Alahan konjunktivitis (keradangan dan kemerahan pada lapisan nipis yang menutup depan mata).
 - Alahan kulit yang tidak teruk seperti gegata dan *angioneurotic oedema* (bengkak di bawah lapisan kulit atau membran mukus).
 - *Drug sensitisation reactions* (peningkatan kesan selepas dos berulang).
- Mengurangkan reaksi alahan kepada darah atau plasma, protein asing, gigitan dan sengatan serangga.
- Melegakan kesesakan saluran pernafasan akibat daripada selesema atau kerengsaan pada cuaca yang kering dan berdebu.

Bagaimana DYRITON SYRUP 4MG/5ML berfungsi

Chlorpheniramine Maleate merupakan antihistamina yang bertindak mengurangkan gejala-gejala alergi. Kesan *antimuscarinic* pula bertindak dengan mengeringkan hidung.

Sebelum menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

- Bila tidak boleh menggunakan
Ia tidak boleh diberikan kepada bayi pramatang atau bayi baru lahir.

Ia tidak boleh disyorkan semasa serangan asma yang akut.

Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan bayi. Penggunaan semasa trimester ketiga boleh menyebabkan reaksi pada bayi yang baru lahir. Chlorpheniramine maleate boleh menghalang penghasilan susu dan boleh dijumpai dalam susu ibu. Tanya doktor anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai mana-mana daripada keadaan berikut:

- Sudut glaukoma yang sempit (peningkatan tekanan dalam mata)
- Pengekalan kencing
- Pembesaran prostat

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Penggunaan serentak dengan alkohol boleh memberi kesan yang sama.

Chlorpheniramine menghalang metabolisme phenytoin dan boleh membawa kepada ketoksikan phenytoin. Phenytoin digunakan untuk sawan.

Kesan daripada Chlorpheniramine dipertingkatkan oleh Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs). MAOIs digunakan untuk kemurungan.

Chlorpheniramine boleh meningkatkan kesan sedatif pada sistem saraf pusat (CNS).

Ini termasuk:

- Hipnotik, barbiturate, analgesik narkotik (penahan sakit), sedatif, penenang atau anxiolytics

Cara menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa : 3 sudu teh (15 ml) setiap hari dalam dos yang berasingan.

Kanak-kanak:

2 - 6 tahun: 1 ½ sudu teh (7.5 ml) setiap hari dalam dos yang berasingan.

7 - 12 tahun: 1 ½ hingga 3 sudu teh (7.5 ml hingga 15 ml) setiap hari dalam dos yang berasingan.

AMARAN (apabila digunakan untuk rawatan batuk dan selesema): Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak kurang daripada 2 tahun.

Gunakan dengan berhati-hati pada kanak-kanak 2 hingga 6 tahun dan dapatkan nasihat daripada doktor.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan keterujaan, sawan.

Semasa menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

DYRITON SYRUP 4MG/5ML

Chlorpheniramine Maleate (4mg/5ml)

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan DYRITON SYRUP 4MG/5ML.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi DYRITON SYRUP 4MG/5ML kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Elakkan penggunaan alkohol.

Memandu dan menggunakan jentera

Ia boleh menyebabkan rasa mengantuk dan mengurangkan kewaspadaan mental. Jangan ambil gunaan kenderaan atau jentera jika anda mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, DYRITON SYRUP 4MG/5ML boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan adalah:

Rasa mengantuk, pening, lemah otot, gangguan koordinasi. Gangguan pada sistem gastrousus seperti loya, muntah, cirit-birit atau sembelit. Ia juga boleh menyebabkan sakit kepala, penglihatan kabur, *tinnitus* (bunyi deringan atau dengung dalam telinga), kegembiraan atau kemurungan, cepat marah, mimpi buruk, masalah pemakanan, kesukaran membuang air, mulut kering, sesak dada, kesemutan, rasa berat, lemah tangan, tekanan darah rendah, gemuruh, kadar degupan jantung yang cepat, masalah untuk tidur, menggeletar dan sawan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers Reporting Side Effects to Medicines ConSERF*] or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan DYRITON SYRUP 4MG/5ML

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat. Jangan Simpan pada suhu melebihi 30°C. Lindungi daripada cahaya. Goncang sebelum digunakan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

sirap berwarna kuning dengan perisa ros

- Bahan-bahan kandungan

▪ Bahan aktif

Chlorpheniramine maleate

▪ Bahan-bahan tidak aktif

- Purified Water, Citric Acid anhydrous, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Sodium Saccharin, Quinoline yellow, Sugar, Liquid Glucose, Rose Flavour.

- Nombor MAL

MAL19910170AZ

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

DYNAPHARM (M) SDN. BHD.

2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5, Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/03/2026

Nombor siri:

NPRA(R2/1)260303/00023