

MICORT CREAM

Miconazole Nitrate / Hydrocortisone Acetate (2% / 1%)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micort Cream
2. Bagaimana Micort Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Micort Cream
4. Cara menggunakan Micort Cream
5. Semasa menggunakan Micort Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Micort Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Micort Cream

Rawatan keadaan radang kulit yang mungkin disebabkan jangkitan dengan kulat dan bakteria.

Bagaimana Micort Cream berfungsi

Miconazole adalah agen antikulat dan boleh bertindak dengan terlibat dengan kebolehtelapan membran sel kulat. Ia mempunyai spektrum antikulat yang luas dan mempunyai beberapa aktiviti antibakteria.

Hydrocortisone apabila digunakan secara luaran akan menghasilkan tindakan anti-inflamasi dan anti-alahan pada kulit.

Sebelum menggunakan Micort Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Micort Cream jika anda mempunyai sejarah tindak balas sensitiviti kepada hydrocortisone atau lain-lain topikal kortikosteroid atau miconazole atau lain-lain agen anti kulat imidazole. Tuberkulosis kulit, dan penyakit-penyakit virus, seperti herpes simplex, varicella, vaccina, acne vulgaris.

Mengandung dan menyusukan anak

Ia tidak boleh digunakan pada perempuan mengandung dalam jumlah yang besar atau untuk tempoh masa yang lama.

- Sebelum mula menggunakan Micort Cream

Mesti beritahu doktor anda jika anda

- sedang mengandung atau menyusu.
- sedang dalam terapi Warfarin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Micort Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu krim dengan nipis di kawasan yang terjejas dua kali sehari sehingga luka telah hilang sepenuhnya.

Apabila simptom-simptom keradangan telah hilang (selepas kira-kira 7 hari), rawatan boleh diteruskan sekiranya perlu dengan anti-kulat sahaja.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan krim ini.

Gunakan krim ini sebaik sahaja anda teringat dan teruskan penggunaan seperti biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Penggunaan topikal kortikosteroid yang berpanjangan dan berlebihan boleh menyekat fungsi pituitari-adrenal menyebabkan kekurangan adrenal sekunder.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Micort Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Micort Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Micort Cream dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan perlu dihentikan jika berlaku iritasi atau rangsangan terbentuk dengan penggunaan krim dan terapi yang bersesuaian diberikan. Dengan kehadiran jangkitan, penggunaan agen anti-kulat atau antibakteria yang sesuai perlu diberikan. Jika tiada kesan positif berlaku, penggunaan kortikosteroid harus dihentikan sehingga jangkitan dikawal sepenuhnya.

Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah 2 tahun kecuali di bawah nasihat dan pengawasan doktor.

Jika iritasi berlaku atau jika tiada sebarang perubahan dalam masa 4 minggu, hentikan penggunaan dan rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Micort Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Tindak balas advers yang dilaporkan dengan penggunaan kortikosteroid topikal, terutamanya di bawah balutan luka, seperti terbakar, gatal-gatal, iritasi, kekeringan, keradangan pada folikel rambut, pertumbuhan rambut yang berlebihan, keradangan jerawat, kegatalan bahagian sekeliling mulut, kegatalan kulit akibat alergik, kelembutan dan kulit merekah, jangkitan sekunder, penipisan kulit, kesan regangan dan kegatalan peluh.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

MICORT CREAM

Miconazole Nitrate / Hydrocortisone Acetate (2% / 1%)

Cara penyimpanan dan pelupusan

Micort Cream

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

Pastikan bekas ditutup rapat.

Simpan di tempat yang kering di bawah 30°C.

Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dengan wangian natural.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Miconazole Nitrate, Hydrocortisone Acetate.

- Bahan tidak aktif

Liquid Paraffin, Deionised Water, Emulgate 1000NI, Chlorocresol, White Soft Paraffin, Glycerin.

- Nombor MAL

MAL19913383AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.

2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,

Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600

Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/02/2020

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)200205/349